

自然珍藏



图鉴丛书

北方药用植物

近600种中国北方药用植物的
彩色图鉴



南方日报出版社
NANFANG DAILY PRESS




北方药用植物

- 近600种常见北方药草之精美图鉴；
- 列出每一种药草的拉丁名、中文称谓及主要别名，确保植物认知的科学性；
- 对不同植物的外观形态、生长环境、药用部位的简洁介绍；
- 各种药草的性味功用、适用病症、服用宜忌指引；
- 详尽的目录、拉丁名索引和中文药名索引。



ISBN 978-7-80652-927-0



9 787806 529270 >

定价：49.00元

上架建议：科普 生活 植物



公元图书

北方药用植物

丁学欣 编著

郭卫东 郭宪 薛凯 彭博 姚一麟 姜良宝 张植玮 摄影
蒋虹 华玉龙 朱柏春 河源龙 丁学欣 等



南方日报出版社

NANFANG DAILY PRESS

中国·广州

数字资源

PDG

图书在版编目(CIP)数据

北方药用植物 / 丁学欣编著. —广州: 南方日报出版社, 2009.9

(自然珍藏图鉴丛书)

ISBN 978-7-80652-927-0

I. 北… II. 丁… III. 药用植物—图集 IV. Q949.95-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第164946号

Copyright © 2009 Anno Domini Media Co. Ltd., Guangzhou

广州公元传播有限公司

All rights reserved

所有权利保留

图片提供:  www.fototee.com

北方药用植物

编 著 / 丁学欣

责任编辑 / 阮清钰

特约编辑 / 区 蕾

装帧设计 / 唐 薇

责任技编 / 杨 扬

出版发行 / 南方日报出版社 (地址: 广州市广州大道中289号)

制 作 /  广州公元传播有限公司

印 刷 / 广州市一丰印刷有限公司

规 格 / 889mm × 1194mm 1/32 9.5印张

版 次 / 2009年10月第1版第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-80652-927-0

定 价 / 49.00元

(咨询电话: 020-38865309)

数字资源
PDG

前 言 PREFACE

我国北方大体指秦岭淮河以北的地区。地理环境多样，有山地、平原、湿地、沙漠、草原等，给各种植物创造了不同的生长环境，因此北方的植物种类繁多，其中有很多具有药用价值。为了更好地利用这些丰富的药用植物资源，继承和发扬传统的中医药文化，在《南方药用植物》的基础上，编写此书，作为补充和完善。

本书收录北方常见药用植物556种，按恩格勒系统的科属分类进行排列，采用图文对照的形式编排。文字部分包括植物名称、药名、植物特征、药用部位、性味归经、功能主治、用法用量等。受篇幅限制，对于同一植物不同的药用部位，只对常用部分进行描述。每一植物，均有准确的论述和精美彩图，便于研究人员、中药工作者、院校学生和爱好者参考和查阅，轻松辨认植物，并可学到相应的药学知识。

本书所收录的植物，大体分为野生、栽培两大类。收录地区以华北、华中地区为主，兼顾部分东北、西北地区常见野生或栽培的重要药用植物，同时也收录少量珍贵的民间草药。

本书收录的野生药用植物，出自编者的野外观察记录，以看到其野外生长形态为标准；栽培药用植物，则来源于植物园或药圃的种植记录，以能在北方自然生长的形态特性为标准；民间药材，则以通过国家检测标准，入册的药品为标准。栽培不超过一年、药典未收录、野外未见而仅见于文献的药用植物，本书暂不收录。

本书编者长期从事植物教学工作，有丰富的野外经验和丰厚的植物分类学功底。本书的出版，对普及药用植物知识将起到一定的辅助作用。由于时间仓促，以及编者自身知识所限，本书定会存在相当的缺点和错误，恳请读者批评指正。

丁学欣



目录

CONTENT

蕨类植物

中华卷柏·····	12
木贼·····	12
节节草·····	13
问荆·····	13
溪洞碗蕨·····	14
蕨·····	14
剑叶凤尾蕨·····	15
井栏边草·····	15
银粉背蕨·····	16
团羽铁线蕨·····	16
普通凤丫蕨·····	17
蛾眉蕨·····	17
虎尾铁角蕨·····	18
荚果蕨·····	18
中岩蕨·····	19
全缘贯众·····	19
金鸡脚·····	20
有柄石韦·····	20
瓦韦·····	21
乌苏里瓦韦·····	21
苹·····	22
槐叶苹·····	23
满江红·····	23



裸子植物

华北落叶松·····	26
金钱松·····	26
油松·····	27
红松·····	27
柳杉·····	28
沙地柏·····	28
刺柏·····	29
杜松·····	29
三尖杉·····	29
紫杉·····	30
东北红豆杉·····	30
草麻黄·····	31
木贼麻黄·····	31



被子植物

双子叶植物

银线草·····	34
山杨·····	34
旱柳·····	35
胡桃·····	35
胡桃楸·····	36
枫杨·····	36
白桦·····	37
棘皮桦·····	37
榛·····	38
栗·····	38
麻栎·····	39
榆·····	39
榔榆·····	40
小叶朴·····	40

蒙桑	41
柘树	42
枸棘	42
无花果	43
啤酒花	43
葎草	44
大麻	44
狭叶荨麻	45
宽叶荨麻	45
麻叶荨麻	46
大叶苕麻	46
蝎子草	47
透茎冷水花	47
墙草	48
北桑寄生	48
槲寄生	49
细辛	49
杜衡	50
马蹄香	50
北马兜铃	50
木通马兜铃	51
绵毛马兜铃	51
篇蓄	52
红蓼	52
支柱蓼	53
拳蓼	53
水蓼	54
刺蓼	54
杠板归	55
珠芽蓼	55
酸模叶蓼	56
苦荞麦	56
羊蹄	57
尼泊尔酸模	57
酸模	58
皱叶酸模	58
大黄	59
波叶大黄	59
河北大黄	60
短毛金线草	60

肾叶山蓼	61
中华山蓼	61
莢苣菜	62
灰绿藜	62
菊叶香藜	63
菠菜	63
翅碱蓬	64
地肤	64
皱果苋	65
反枝苋	65
苋	66
凹头苋	66
尾穗苋	67
垂序商陆	67
番杏	68
蚤缀	68
灯心草蚤缀	69
异花假繁缕	69
异叶假繁缕	70
牛繁缕	70

簇生卷耳	71
叉歧繁缕	71
异色繁缕	72
漆姑草	72
剪秋罗	73

大花剪秋罗	73
蝇子草	74
石生蝇子草	74
麦瓶草	75
狗筋蔓	75
瞿麦	76
旱麦瓶草	76
莲	77
芡实	78
睡莲	78
萍蓬草	79
金鱼藻	79
连香树	80
牡丹	80
芍药	81
金莲花	81
铁筷子	82
长果升麻	82
升麻	83
单穗升麻	83
黄连	84
天葵	84
华北耧斗菜	85
瓣蕊唐松草	85
贝加尔唐松草	86
高乌头	86
北乌头	87
黄花乌头	87
华北乌头	88
高山乌头	88
翠雀	89
还亮草	89
毛茛	90
石龙芮	90
茴茴蒜	91



侧金盏花·····	91	白花菜·····	106	合萌·····	126
林荫银莲花·····	92	大白菜·····	106	皂荚·····	126
草玉梅·····	92	菘蓝·····	107	槐树·····	127
小花草玉梅·····	93	荠菜·····	107	苦参·····	127
獐耳细辛·····	93	豆瓣菜·····	108	木蓝·····	128
白头翁·····	94	蔊菜·····	108	截叶铁扫帚·····	128
黄花铁线莲·····	94	播娘蒿·····	109	胡枝子·····	129
棉团铁线莲·····	95	二月兰·····	109	杭子稍·····	129
短尾铁线莲·····	95	瓦松·····	110	鸡眼草·····	130
		小丛红景天·····	110	补骨脂·····	130
		狭叶红景天·····	111	米口袋·····	131
		景天·····	111	膜荚黄芪·····	131
		景天三七·····	112	野葛·····	132
		华北景天·····	112	落花生·····	132
		佛甲草·····	113	歪头菜·····	133
		落新妇·····	113	广布野豌豆·····	133
		刺果茶藨子·····	114	红花锦鸡儿·····	134
		细叉梅花草·····	114	硬毛棘豆·····	134
		山楂·····	115	刺果甘草·····	135
		槲寄生·····	115	甘草·····	135
		木瓜·····	116	红花菜豆·····	136
		皱皮木瓜·····	116	五脉山黧豆·····	136
		山刺玫·····	117	牻牛儿苗·····	137
		地榆·····	117	蒺藜·····	137
		棣棠·····	118	白刺·····	138
		鸡麻·····	118	花椒·····	138
		石生悬钩子·····	119	白鲜·····	139
		山楂叶悬钩子·····	119	黄檗·····	139
		覆盆子·····	120	枸橘·····	139
		华北覆盆子·····	120	香橼·····	140
		东方草莓·····	121	臭椿·····	140
		委陵菜·····	121	苦木·····	141
		鹅绒委陵菜·····	122		
		银露梅·····	122		
		西伯利亚杏·····	123		
		郁李·····	123		
		欧李·····	124		
		樱桃·····	124		
		稠李·····	125		
		合欢·····	125		





远志	141
地锦草	142
续随子	142
大戟	143
甘遂	143
泽漆	144
野漆树	144
黄栌	145
冬青卫矛	145
卫矛	146
七叶树	146
水金凤	147
马甲子	147
酸枣	148
拐枣	148
鼠李	149
山葡萄	149
爬山虎	150
白蒺	150
野葵	151
蜀葵	151
药用蜀葵	152
苘麻	152
梧桐	153
软枣猕猴桃	153
猕猴桃	154
木天蓼	154
紫花地丁	155
鸡腿堇菜	155
中华秋海棠	156
结香	156
瑞香狼毒	157
草瑞香	157
河朔茺花	158

木半夏	158
翅果油树	159
千屈菜	159
瓜木	160
菱角	160
月见草	161
锁阳	161
刺五加	162
无梗五加	162
土当归	163
人参	163
峨参	164
北柴胡	164
黑柴胡	165
防风	165



茴香	166
窃衣	166
辽藁本	166
细叶藁本	167
葛缕子	167
当归	168
白芷	168
独活	169
短毛独活	169
石防风	170
山茱萸	170
鹿蹄草	171
照山白	171
迎红杜鹃	172
点地梅	172
七瓣莲	173

胭脂花	173
过路黄	174
轮叶排草	174
二色补血草	175
黑枣	175
小叶白蜡	176
连翘	176
流苏树	177
红丁香	177
密蒙花	178
秦艽	178
当药	179
红直当药	179
睡菜	180
罗布麻	180
萝藦	181
杠柳	181
白薇	182
牛皮消	182
白首乌	183
徐长卿	183
菟丝子	184
金灯藤	184
打碗花	185
田旋花	185
圆叶牵牛	186
紫草	186
鹤虱	187
附地菜	187
荆条	188
臭牡丹	188
海州常山	189
白苞筋骨草	189
黄芩	190
夏至草	190
藿香	191
荆芥	191
白透骨消	192
糙苏	192
独一味	193

野芝麻..... 193
丹参..... 193
牛至..... 194
野薄荷..... 194
甘露子..... 195
百里香..... 195
石香薷..... 196
岩青兰..... 196
假酸浆..... 197
宁夏枸杞..... 197
天仙子..... 198
小菝葜..... 198
酸浆..... 199
龙葵..... 199
白英..... 200
茄..... 200
辣椒..... 201
曼陀罗..... 201
地黄..... 202
洋地黄..... 202
玄参..... 203
胡黄连..... 203
细叶婆婆纳..... 204
草本威灵仙..... 204
反顾马先蒿..... 205
沟酸浆..... 205
阴行草..... 206
梓树..... 206
凌霄..... 207
角蒿..... 207
肉苁蓉..... 208
黄花列当..... 208
珊瑚苣苔..... 209
牛耳草..... 209
爵床..... 210
透骨草..... 210
大车前..... 211
平车前..... 211
猪殃殃..... 212
蓬子菜..... 212

盘叶忍冬..... 213
金银花..... 213
接骨木..... 214
败酱..... 214
缬草..... 215
续断..... 215
日本续断..... 216
假贝母..... 216
绞股蓝..... 217
赤雹..... 217
丝瓜..... 218
西瓜..... 218
香瓜..... 219
冬瓜..... 219
瓜蒌..... 220
王瓜..... 220
瓢瓜..... 221
苦瓜..... 221
南瓜..... 222
桔梗..... 222
党参..... 223
羊乳..... 223
芥苳..... 224
石沙参..... 224
紫沙参..... 225
展枝沙参..... 225
多歧沙参..... 226
山梗菜..... 226
兰花参..... 227
泽兰..... 227
白鼓钉..... 228
全缘马兰..... 228
东风菜..... 228
紫菀..... 229
铃铃香青..... 229
鼠麴草..... 230
旋复花..... 230
土木香..... 231
天名精..... 231
蒙古苍耳..... 232



狼把草..... 232
鬼针草..... 233
辣子草..... 233
高山蓍..... 234
菊花..... 234
甘野菊..... 235
茵陈蒿..... 235
南牡蒿..... 236
青蒿..... 236
野艾蒿..... 237
款冬..... 237
兔儿伞..... 237
北苍术..... 238
白术..... 238
牛蒡..... 239
狭苞橐吾..... 239
小蓟..... 240
大刺菜..... 240
毛大丁草..... 241
川木香..... 241
祁州漏芦..... 242
红花..... 242
鸦葱..... 243
桃叶鸦葱..... 243
蒲公英..... 244
山苦荬..... 244
苦荬菜..... 245
苦苣菜..... 245
毛连菜..... 246
三七草..... 246

单子叶植物

东方香蒲..... 247

慈姑.....	247
野慈姑.....	248
苦草.....	248
芦苇.....	249
荻.....	249
茭白.....	250
狗牙根.....	250
荇草.....	251
高粱.....	251
薏苡.....	252
玉米.....	252
小麦.....	253
蟋蟀草.....	253
马唐.....	254
光头稗子.....	254
早园竹.....	255
荆三棱.....	255
刚毛荸荠.....	256
香附子.....	256
宽叶苔草.....	257
蛇头草.....	257
独角莲.....	258
半夏.....	258
掌叶半夏.....	259
东北南星.....	259
天南星.....	260
大藻.....	260
浮萍.....	261
紫萍.....	261
谷精草.....	262
鸭舌草.....	262
雨久花.....	263

凤眼莲.....	263
百部.....	264
直立百部.....	264
黎芦.....	265
知母.....	265
黄花菜.....	266
小萱草.....	266
北黄花菜.....	266
大花萱草.....	267
玉簪.....	267
芦荟.....	268
老鸦瓣.....	268
郁金香.....	269
兰州百合.....	269
有斑百合.....	270
卷丹.....	270
山丹.....	271
大百合.....	271
川贝母.....	272
绵枣.....	272
小根蒜.....	273
茗葱.....	273
洋葱.....	274
铃兰.....	274
鹿药.....	275
兴安鹿药.....	275
热河黄精.....	276
小玉竹.....	276
黄精.....	277
北重楼.....	277
延龄草.....	278
龙须菜.....	278
曲枝天门冬.....	279
麦冬.....	279
粉条儿菜.....	280
牛尾菜.....	280
华东菝葜.....	281
忽地笑.....	281
石蒜.....	282
水仙.....	282

穿山龙.....	283
盾叶薯蓣.....	283
野薯蓣.....	284
番红花.....	284
马蔺.....	285
野鸢尾.....	285
美人蕉.....	286
二叶舌唇兰.....	286
白芨.....	287
天麻.....	287
绶草.....	288
手参.....	288
石斛.....	289
角盘兰.....	289



笔画索引.....	290
拉丁名索引.....	297
参考文献.....	303







蕨类植物

PTERIDOPHYTE

蕨类植物

PDG

科：卷柏科	种： <i>Selaginella sinensis</i> (Desv.) Spring	药名：中华卷柏	别名：地网子、地柏、翠云草、地柏枝
-------	---	---------	-------------------

中华卷柏

药用部位：全草。


植物特征：多年生草本。主茎圆柱形，坚硬。茎下部叶卵状椭圆形，全缘，贴伏于茎，疏生；上部叶二型，四列，侧叶长圆形或长卵形，钝尖或有短刺，基部圆楔形，边缘干后常反卷；中叶长卵形；叶草质，光滑。孢子囊穗单生枝顶；孢子叶卵形、三角形，先端锐尖；孢子囊圆肾形；大孢子囊通常少数，小孢子囊多数，孢子二型。

性味归经：淡、微苦，凉。归肝、胆、大肠经。

功能主治：清热利尿，化痰，止血，止泻。用于湿热、小便不利、淋症，咳嗽、咳痰，外伤出血、痢疾等症。

用法用量：4.5 ~ 9克，水煎服。

使用注意：孕妇慎用。



生境：山地岩石。

科：木贼科	种： <i>Equisetum hiemale</i> L.	药名：木贼	别名：木贼草、锉草、节骨草、无心草
-------	--------------------------------	-------	-------------------

木贼

药用部位：地上部分。


植物特征：一年或多年生草本。枝端产生孢子叶球，矩形，顶端尖，形如毛笔头。地上茎单一不分枝，中空，有纵列的脊，脊上有疣状突起。叶成鞘状，紧包节上，顶部及基部各有一黑圈，鞘上的齿极易脱落。

性味归经：甘、苦，平。归肺、肝经。

功能主治：散风热，退目翳。用于风热目赤，迎风流泪，目生云翳。

用法用量：3 ~ 9克，水煎服或入丸、散。外用研末撒于患处。

使用注意：气虚、血虚目疾者应慎用。



生境：坡林下阴湿处、河岸湿地、溪边，喜阴湿的环境，有时也生于杂草地。

科：木贼科	种： <i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	药名：节节草	别名：土木贼、锁眉草、笔杆草
-------	--	--------	----------------

茎细弱

叶轮生

基部多分枝

节节草

药用部位：地上部分。

植物特征：多年生草本。茎细弱，绿色，基部多分枝，上部少分枝或不分枝，粗糙具条棱，叶鳞片状，轮生。孢子囊长圆形，有小尖头；孢子叶六角形，中央凹入。

性味归经：甘、微苦，平。归肺、肝经。

功能主治：清热，利尿，明目退翳，祛痰止咳。用于目赤肿痛、角膜云翳、肝炎、咳嗽、支气管炎、泌尿系感染。

用法用量：10 ~ 15g，水煎服。

使用注意：有小毒，不可长期大量服用；孕妇慎用。



生境：河滩、路边潮湿处。

科：木贼科	种： <i>Equisetum arvense</i> L.	药名：接续草、公母草	别名：土麻黄、笔头草
-------	--------------------------------	------------	------------

营养茎具分枝，叶退化

孢子囊穗

肉质孢子囊茎

问荆

药用部位：地上部分。

植物特征：多年生草本。营养茎在孢子茎枯萎后生出，叶退化，下部联合成鞘；分枝轮生，中实。孢子茎常为紫褐色，肉质，不分枝。孢子叶六角形，盾状着生，螺旋排列，边缘着生长形孢子囊。孢子一型。

性味归经：苦，平。归肺、肝、肾经。

功能主治：清热，凉血，止咳，利尿。治吐血，鼻出血，便血，倒经，咳嗽气喘，淋病。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服。外用捣敷或研末调敷。

使用注意：有小毒，不可长期大量服用；孕妇慎用。



生境：田边沟旁。

科：凤尾蕨科	种： <i>Pteris ensiformis</i> Burm.	药名：凤尾蕨	别名：井边茜、三叉草
--------	-----------------------------------	--------	------------

剑叶凤尾蕨

药用部位：全草。


植物特征：多年生蕨类。根茎短而细，斜上或横生，不分歧或有少数侧芽，外被稀疏赤褐色鳞片；鳞片线形。蕨叶为1 ~ 2回羽状复叶，侧生羽片2 ~ 5对，簇生，绿色至深绿色，草质；两型：营养叶叶柄短，羽片与小羽片椭圆形至长椭圆形且边缘有锯齿；营养孢子叶羽片与小羽片为细长的剑形至线形，背面近叶缘处着生大量的孢子囊群。孢子囊群线形，并由反卷的叶缘所包被。孢子黄褐色。

性味归经：甘、淡、微涩，凉。归肝、肺、肾经。

功能主治：清热利湿，宁肺止咳，软坚消积。用于感冒发热、咳嗽、肺结核咯血、痢疾、急性肠炎、小儿疳积、中毒性消化不良、泌尿系感染；外用治乳腺炎、淋巴结炎。

用法用量：块茎或全草25 ~ 50克，煎汤内服；外用适量，捣敷患处。

生境：林下。



科：凤尾蕨科	种： <i>Pteris multifida</i> Poir	药名：井栏边草	别名：凤尾草、铁脚鸡
--------	---------------------------------	---------	------------

井栏边草

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。根状茎粗状，直立，密被钻形黑褐色鳞片。叶二型，丛生，无毛；生孢子囊的能育叶片卵形，1回羽状，上面绿色，下面淡绿色，下部羽片常2 ~ 3叉，羽片线形，对生或近对生，全缘，沿羽片下面边缘着生孢子囊群；孢子囊群线形，膜质。不生孢子囊群的羽片或小羽片均较宽，线形或卵圆形，边缘有不整齐的尖锯齿。

性味归经：微苦，凉。归肝、肺、肾经。

功能主治：清热利湿，凉血止血，消肿解毒。主治湿热痢、泄泻、黄疸、淋浊、带下、尿血、便血、崩漏、咽喉肿痛等病症。

用法用量：30克，水煎服。

生境：阴湿墙脚、井边、和石灰岩石上。



科：中国蕨科	种： <i>Aleuritopteris argentea</i> (Gmel.) Fee	药名：通经草	别名：金丝草、铜丝草、金牛草
--------	---	--------	----------------

银粉背蕨

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。根状茎直立或斜生，其上有亮黑色披针形鳞片，鳞片边缘红棕色。叶厚纸质，簇生，叶片五角形，由3片基部相连或分离的裂片组成，每一裂片2回羽状裂，顶生裂片近菱形，侧生的二个裂片为三角形。叶表暗绿色叶背有银白色或乳黄色的粉粒。

性味归经：淡、微涩，温。归肺、肾经。

功能主治：活血调经，补虚止咳。用于月经不调、闭经腹痛、肺结核咳嗽、咯血。

用法用量：15 ~ 25克，水煎服。



生境：山区岩石缝隙中。

科：铁线蕨科	种： <i>Adiantum capillus-junonis</i> Rupr.	药名：猪鬃七	别名：翅柄铁线蕨、乌脚芒、岩浮萍
--------	---	--------	------------------

团羽铁线蕨

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。根状茎短而直立，顶端被褐色狭披针形鳞片。叶簇生，薄草质，光滑无毛，叶柄纤细，亮栗色，有光泽，基部疏生鳞片；叶片狭披针形，1回羽状，叶轴顶端常延伸成鞭状，接地生根，行营养体繁殖；羽片5 ~ 10对，有小柄，通常互生，圆扇形或扇形，上缘半圆形，波状至浅裂，全缘。孢子囊群生于裂片边缘，线状长圆形或长圆形，稀为圆肾形；囊群盖同型，灰棕色，纸质，近全缘。

性味归经：微苦，凉。归肺、肾经。

功能主治：清热利尿，舒筋活络，补肾止咳。主治血淋、尿闭、乳腺炎、遗精、咳嗽。

用法用量：25 ~ 50克，水煎服。外用适量捣敷患处。



生境：石灰岩岩石缝中。

科：裸子蕨科	种： <i>Coniogramme intermedia</i> Hieron	药名：铁杆七	别名：中华凤丫蕨
--------	---	--------	----------

普通凤丫蕨

药用部位：根茎。

植物特征：多年生草本。根状茎横走，叶卵状三角形，长25～35厘米，宽20～25厘米，羽片4～6对，近对生；小羽片3～5片，披针形，顶端1片较大，长可达15厘米，宽约4厘米，边缘有向前弯曲的锯齿。孢子囊群线形，沿侧脉分布到达距叶边约3毫米处。

性味归经：甘、涩，温。归肝、肾、大肠经。

功能主治：舒筋活络，祛寒除湿。治跌打损伤、风湿痹症、寒湿内蕴。

用法用量：9～15克，水煎服。



生境：林下。

科：蹄盖蕨科	种： <i>Lunathyrium acrostichoides</i> (Sw.) Ching	药名：贯众	别名：峨眉贯众
--------	--	-------	---------

峨眉蕨

药用部位：根茎。

植物特征：多年生草本。根状茎粗短，直立或斜生，有较多坚硬的叶柄残基，先端有阔披针形鳞片。叶簇生；叶片革质，先端渐尖，沿叶轴、羽轴和主脉有棕色短毛，2回羽状全裂和深裂，裂片椭圆形，先端钝或浑圆，边缘有浅圆齿，有单一的侧脉5～7对。孢子囊群狭长圆形，囊群盖新月形，全缘，质厚。

性味归经：苦，微寒。归肝、脾经。

功能主治：清热解毒，止血，驱虫。治疮毒及血热出血等症。

用法用量：8～15克，研末吞服。

使用注意：孕妇忌服。



生境：山谷林下或灌丛中。

科：铁角蕨科	种： <i>Asplenium incisum</i> Thunb.	药名：地柏叶	别名：伤寒草、止血草、石蜈蚣
--------	------------------------------------	--------	----------------

虎尾铁角蕨

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。叶簇生，薄草质，线状披针形，2回羽裂；羽片约20对，下部羽片卵形，中部羽片三角状披针形，边缘有锯齿。孢子囊群生于小叶脉中部靠近主叶脉，囊群盖矩圆形。

性味归经：淡，凉。归肝、肺经。

功能主治：清热，利湿，镇惊，解毒。治肺热咳嗽、吐血、急性黄疸型传染性肝炎、小儿急惊风、指头炎。

用法用量：20 ~ 50克，水煎或捣汁内服。外用捣汁滴眼或捣敷患处。



生境：林下湿岩石上。

科：球子蕨科	种： <i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Todaro	药名：荚果蕨贯众	别名：野鸡膀子、小叶贯众、黄瓜香
--------	---	----------	------------------

荚果蕨

药用部位：带叶柄基的干燥根茎。

植物特征：草本。叶簇生，二型，有柄；营养叶叶片披针形至倒披针形，或为广长圆形，2回深羽裂；孢子叶较小，挺立，1回羽状，羽片向下反卷成有节的荚果状，包被囊群。孢子囊群圆形，生于侧脉分枝的中部，成熟时汇合成条形；囊群盖白色膜质，熟后破裂消失。

性味归经：苦、涩，微寒。归肝、胃经。

功能主治：清热解毒，凉血止血，驱虫。用于风热感冒、乙型脑炎、疟腮、血痢、肠风便血、血崩、带下、产后血气胀痛、驱蛔虫和蛲虫、热毒疮疡。

用法用量：5 ~ 10克，水煎服。

使用注意：驱虫、清热毒用生品；止血用制炭品。




生境：针阔混交林下，灌木丛中及浅山河边湿地上。

科：岩蕨科	种： <i>Woodsia intermedia</i> Tagawa	药名：蜈蚣旗
-------	-------------------------------------	--------

中岩蕨

药用部位：根茎。

植物特征：草本。植株高10 ~ 28厘米，根状茎短而斜升。叶簇生，叶片线状披针形至披针形，稀为长圆状披针形，短渐尖至钝头，1 ~ 2回羽状分裂；羽片长圆状披针形至卵状长圆形，下部羽片较小，中部羽片最大，近镰刀形，边缘浅裂；叶干后纸质，西面散生灰白色节状毛，沿叶轴及羽轴背面散生毛和小鳞片。孢子囊群近圆形，近叶边排列。



孢子囊群近圆形

性味归经：微苦，平。归肝、脾二经。

功能主治：化淤通络。治伤筋。

用法用量：9 ~ 12克，水煎服。外用捣敷患处。

生境：林下岩石缝。

科：鳞毛蕨科	种： <i>Cyrtomium falcatum</i> (L. f.) Presl	药名：贯众	别名：小贯众
--------	--	-------	--------

全缘贯众

药用部位：根茎及叶柄基部。

植物特征：草本。根状茎短粗而直立，密被鳞片。叶簇生，叶片长圆形或长圆状披针形，1回羽状，表面绿色；叶脉网状，不明显。孢子囊群圆形，成熟时中心黑褐色，边缘棕褐色。

性味归经：苦，微寒。归肝、脾经。

功能主治：清热解毒，止血，杀虫。用于感冒发热，痢疾，疮疡，便血、尿血，月经过多，刀伤出血，蛔虫、饶虫、绦虫病，产后出血。

用法用量：8 ~ 15克，研末吞服。

使用注意：孕妇忌服。



叶片长圆状披针形

孢子囊群

根状茎密被鳞片

生境：林下。

科：水龙骨科	种： <i>Phymatopsis hastate</i> (Thunb.) Kitag	药名：金鸡脚	别名：鹅掌金星草、三角风、鸭脚草
--------	---	--------	------------------

金鸡脚

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。根状茎细长，横走，密被红棕色鳞片。叶疏生，厚纸质，通常三裂，偶有不裂或二裂以至五裂的，基部圆形，稍下延；叶柄稻秆色，基部与根状茎之间有关节。孢子囊群圆形，主脉两侧各有1行，在稍近主脉处着生。

性味归经：苦、微辛，凉。归肝、肺、肾、大肠经。

功能主治：祛风清热，利湿解毒。用于小儿惊风、感冒咳嗽、小儿支气管肺炎、咽喉肿痛、扁桃体炎、中暑腹痛、痢疾、腹泻、泌尿系感染、筋骨疼痛；外用治痈疖、疔疮、毒蛇咬伤。

用法用量：25 ~ 50克，水煎服。外用适量捣敷患处。



生境：海拔200 ~ 2300米的林下。

科：水龙骨科	种： <i>Pyrrosia petiolosa</i> (Christ) Ching	药名：石韦	别名：石茶、独叶草、牛皮草、金瓢羹、金茶匙、小尖刀
--------	--	-------	---------------------------

有柄石韦



药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。植株被星状毛。根状茎细长，横走，密被棕褐色卵状披针形鳞片，边缘有锯齿；须根多数。叶远生，二型，叶片厚革质，干后边缘多反卷，营养叶片卵圆形至长卵形，全缘，基部下延至叶柄，上面绿色，无毛，有排列整齐的小凹点，下面密被灰色星状毛；孢子叶状椭圆形，通常卷曲成圆筒状，下面密生深褐色的孢子囊群，无囊群盖。

性味归经：苦、甘，寒。归肾、肺经。

功能主治：消炎利尿，清湿热。用于急、慢性肾炎，肾盂肾炎，膀胱炎，尿道炎，泌尿系结石，支气管哮喘，肺热咳嗽。

用法用量：3 ~ 9克，水煎服。

生境：山地裸露的岩石上或岩石缝内阴湿处。

科：水龙骨科	种： <i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching	药名：瓦韦	别名：七星草、小叶骨牌草、金星草
--------	--	-------	------------------

瓦韦

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。根茎粗而横生，密被黑色鳞片，下部卵形，向顶部长钻形，边缘有齿。叶片革质，条状披针形，短渐尖或锐尖头，基部渐变狭，楔形，通常无毛或下面偶有1 ~ 2鳞片；孢子囊群直径约3毫米，位于中脉与叶边之间，稍近叶边，彼此接近；幼时有盾状隔丝覆盖。

性味归经：苦，平。归肾、肺经。

功能主治：清热解毒，利尿消肿，止血，止咳。用于尿路感染、肾炎、痢疾、肝炎、眼结膜炎、口腔炎、咽炎、肺热咳嗽、百日咳、咯血、血尿、发背痈疮。

用法用量：15 ~ 25克，水煎服。

使用注意：凡中寒泄泻者忌用。



生境：海拔250 ~ 1400米的林中树干、石上或瓦缝中。

科：水龙骨科	种： <i>Lepisorus ussuriensis</i> (Regel et Maack) Ching	药名：瓦韦	别名：金星草
--------	--	-------	--------

乌苏里瓦韦

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。根状茎细弱，长而横走，疏被鳞片；鳞片紧覆，黑褐色，卵圆形，渐尖，有锯齿，网眼密。叶远生；叶片线状披针形，先端长渐尖，基部亦长渐狭，革质，绿色，中脉明显，细脉网状，网眼内有内藏细脉。孢子囊群中等大小，着生于中肋及边缘之间，稍疏生，幼时有盾状鳞片覆盖。

性味归经：苦，平。归肝、肾、肺、大肠经。

功能主治：清热解毒，利尿，消肿，止血，止咳。主治尿路感染、肾炎、痢疾、肝炎、眼结膜炎、口腔炎、咽炎、肺热咳嗽、百日咳、咯血、血尿、发背痈疮。

用法用量：5 ~ 19克，水煎服。



生境：树干上或石缝中。

科：苹科	种： <i>Marsilea quadrifolia</i> L.	药名：四叶苹	别名：四叶草、田字草
------	-----------------------------------	--------	------------



小叶4片



苹

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。根状茎匍匐泥中，细长而柔软，不实叶具长柄，叶柄顶端有小叶4片，十字形对生，薄纸质；小叶倒三角形，先端浑圆，全缘。孢子果斜卵形或圆形，被毛，于叶柄基部侧出，通常2 ~ 3个丛集；果内有孢子囊群约15个，每个孢子囊群具有少数大孢子囊，周围有数个小孢子囊。

性味归经：甘，寒。归肝、肺、肾经。

功能主治：清热，利水，解毒，止血。治风热目赤、肾炎、肝炎、疟疾、消渴、吐血、鼻出血、热淋、尿血、痈疮、瘰癧。

用法用量：50 ~ 100克（大剂量150 ~ 250克），水煎或捣汁内服；外用适量捣敷患处。

生境：静止浅水中。

科：槐叶苹科	种： <i>Salvinia natans</i> (L.) All.	药名：大浮萍	别名：蜈蚣萍
--------	-------------------------------------	--------	--------

槐叶苹

药用部位：全草。



植物特征：多年生根退化型浮水植物。三叶轮生，短柄，两型：水上叶两枚，卵状椭圆形，绿色，两面密被毛；水下叶一枚，淡褐色，演化成胡须状。孢子囊果球形，密被褐色毛，集结状排列水下叶的基部。

性味归经：辛，寒。归肝、肾经。

功能主治：清热解毒，活血止痛。用于痈肿疔毒、淤血肿痛、烧烫伤。

用法用量：适量，捣烂或焙干研粉外敷。

使用注意：外用药，一般不内服。

卵状椭圆形

生境：静水池塘中，喜温暖、光照充足的环境。

科：满江红科	种： <i>Azolla imbricata</i> (Roxb.) Nakai.	药名：满江红	别名：红萍、红浮萍、紫藻
--------	---	--------	--------------

满江红



药用部位：全草。

植物特征：小型浮水植物。幼时呈绿色，生长迅速，常在水面上长成一片。秋冬时节，叶内饱含花青素，群体呈现红色。个体很小，呈三角形、菱形或类圆形。根状茎细弱，横卧，羽状分枝，须根下垂到水中。叶细小如鳞片，肉质，在茎上排列成两行，互生；每一叶片都深裂成两瓣：

上瓣肉质，浮于水面，绿色，秋后转红，下瓣膜质，斜生在水中，无色素。孢子囊果成对生于分枝基部的沉水叶片上。

性味归经：辛，寒。归肝、肾经。

个体很小

功能主治：解表透疹，祛风利湿。用于麻疹不透、风湿关节痛、荨麻疹、皮肤瘙痒、水肿、小便不利。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服。外用适量，煎水洗患处。



生境：静水池塘中。





裸子植物

GYMNOSPERM

蘇子知
和聲

PDG

科：松科	种： <i>Larix principis-rupprechtii</i> Mayr	药名：落叶松皮	别名：红杉
------	--	---------	-------

华北落叶松

药用部位：树皮。

植物特征：常绿乔木。树冠圆锥形，树皮暗灰褐色，呈不规则鳞状裂开，大枝平展，小枝不下垂，叶窄条形。球果长卵形或卵圆形，长约2 ~ 4厘米，径约2厘米，种鳞26 ~ 45，背面光滑无毛，边缘不反曲，苞鳞短于种鳞，暗紫色；种子灰白色，有褐色斑纹，有长翅。

性味归经：苦，寒。有小毒。归大肠经。

功能主治：驱虫。

用法用量：5 ~ 10克研末冲服。

使用注意：不可过量。



生境：高山林带。

科：松科	种： <i>Pseudolarix amabilis</i> (Nelson) Rehd	药名：土槿皮	别名：金松、水树
------	--	--------	----------

金钱松

药用部位：根皮。

植物特征：落叶大乔木。树干通直，树皮深褐色，深裂成鳞状块片，枝条轮生而平展，小枝有长短之分。叶片条形，扁平柔软，在长枝上成螺旋状散生，在短枝上15 ~ 30枚簇生，向四周辐射平展，秋后变金黄色，圆如铜钱。花雌雄同株，雄花球数个簇生于短枝顶端，雌花球单个生于短枝顶端。种鳞会自动脱落，种子有翅。



性味归经：辛，温。有毒。归肝经。

功能主治：止痒杀虫。用于手脚癣、神经性皮炎、湿疹、癩痢头。

用法用量：外用根皮或近根树皮酒浸（土槿皮酊）外搽；或研细粉以醋调敷患处。

使用注意：不可内服。

生境：常见栽培。

科：松科	种： <i>Pinus tabulaeformis</i> Carr.	药名：松节	别名：红皮松、短叶松
------	-------------------------------------	-------	------------



油松

药用部位：松节、松叶、球果、花粉、树脂。

植物特征：乔木。树皮灰棕色，鳞片状开裂。冬芽圆形，端尖，红棕色，在顶芽旁常轮生有3～5个侧芽。

叶2针1束，罕3针1束，树脂道5～8或更多。雄球花橙黄色，雌球花绿紫色。球果卵形。种子卵形，淡褐色有斑纹。

性味归经：① 松节：苦，温。归肝经。② 松针：苦，温。归心、脾经。③ 松球：苦，温。无毒。归肺、大肠经。④ 松花粉：甘，温。归肝、脾经。⑤ 松香：苦、甘，温。归肝、脾经。

功能主治：① 松节：治风湿关节痛，腰腿痛，大骨节病，脚气痿软，鹤膝风，跌打肿痛。② 松针：治流行性感冒，风湿痿痹，跌打损伤，夜盲症，失眠，湿疹，疥癣，冻疮。③ 松球：治风痹，肠燥便秘，痔疮；外用治白癜风。④ 松花粉：治胃、十二指肠溃疡，咳血；外用治皮肤湿疹，黄水疮，皮肤糜烂，脓水淋漓，外伤出血。⑤ 松香：治疗疮肿毒，疥癣，痔瘻，湿疹，扭伤，风湿关节痛。

用法用量：① 松节、松叶、松球10～15克，水煎服，或酒浸服；外用适量，煎水洗患处。② 松花粉3～6克，水煎服；外用适量，撒敷患处。③ 松香外用适量，研末调敷或搽患处。



轮生侧芽

树皮鳞片状开裂



生境：海拔800～1500米山地阴坡和半阴坡。

科：松科	种： <i>Pinus koraiensis</i> Sieb. et Zucc	药名：海松子	别名：果松
------	--	--------	-------

红松

药用部位：种子。

植物特征：乔木。枝近平展，树冠圆锥形，冬芽淡红褐色，圆柱状卵形。针叶5针一束，粗硬，树脂道3个，叶鞘早落。球果圆锥状卵形，种子大，倒卵状三角形。

性味归经：甘。归肝、肺、大肠经。

功能主治：养液，熄风，润肺，滑肠。用于风痹、头眩、燥咳、吐血、便秘。

用法用量：5～15克，煎汤或研末内服。

使用注意：便溏精滑或湿痰者慎用。

生境：高山林中。



球果圆锥状卵形

针叶

科：杉科	种： <i>Cryptomeria fortunei</i> Hooibrenk ex Otto et Dietr.	药名：柳杉皮	别名：长叶柳杉、宝树
------	---	--------	------------

柳杉

药用部位：根皮。

植物特征：常绿乔木。干皮红棕色长条状脱落。叶钻形，螺旋状成5列覆盖于小枝上，叶先端尖，四面具白色气孔线，叶尖略向内弯。雌雄同株异花，雄花黄色，单生于小枝叶腋成短穗状花序，雌花球形，淡绿色，单生枝顶。球果近球形，深褐色；种子三角状长圆形。

性味归经：苦，寒。归胃、肝经。

功能主治：解毒杀虫。用于癣疮。

用法用量：外用柳杉鲜根皮（去栓皮）250克，捣烂，加食盐50克，开水冲泡，洗患处。

使用注意：不可内服。



生境：山地林带，北方见栽培。

科：柏科	种： <i>Sabina vulgaris</i> Ant.	药名：沙地柏	别名：新疆圆柏、叉子圆柏
------	--------------------------------	--------	--------------

沙地柏



药用部位：枝叶。


植物特征：匍匐灌木。枝密，斜上展，小枝细。鳞叶交叉对生相互紧贴，先端钝或稍尖，背面中部有明显的椭圆形腺体；刺形叶常生于幼龄树上，雌雄异株；球果熟时呈暗褐紫色，被白粉；种子1 ~ 4粒。


性味归经：苦，平。归肝经。

功能主治：祛风湿，活血止痛。主治风湿性关节炎、类风湿性关节炎、布氏杆菌病、皮肤瘙痒。

用法用量：配方煎汤洗浴。

生境：海拔1100 ~ 2800米地带多石山地及沙丘上。

科：柏科	种： <i>Juniperus formosana</i> Hayata	药名：刺柏	别名：山柏
刺柏  药用部位： 球果。 植物特征： 乔木。3叶轮生，披针形，先端尖锐，两侧有气孔带。球果近圆球形，肉质，淡红色或淡红褐色。 性味归经： 辛，温。归肾经。 功能主治： 发汗，利尿，镇痛。主治风湿性关节痛。 用法用量： 外用适量捣敷患处。 生境：干燥山地。			

科：柏科	种： <i>Juniperus rigida</i> Sieb et Zucc	药名：杜松子	别名：刺柏、杜松子、崩松、棒松
杜松  药用部位： 球果。 植物特征： 乔木。刺形叶条状、质坚硬、端尖，上面凹下成深槽，槽内有窄白粉带。球果熟时呈淡褐黄色或蓝黑色，被白粉。 性味归经： 辛，温。归肾经。 功能主治： 发汗，利尿，镇痛。主治风湿性关节痛。配方可用于治疗布氏杆菌病。 用法用量： 外用适量捣烂外敷。 生境：干燥山地。			

科：三尖杉科	种： <i>Cephalotaxus fortunei</i> Hook	药名：粗榧子	别名：粗榧、中国粗榧
三尖杉  药用部位： 种子。 植物特征： 灌木或小乔木。叶条形，先端渐尖、急尖或渐尖的短尖头，上面绿色，下面气孔带白色。种子椭圆状卵形。 性味归经： 甘、涩，平。归胃、大肠经。 功能主治： 驱虫，消积。用于蛔虫病、钩虫病、食积。 用法用量： 7.5 ~ 25克，水煎服。 生境：林中，常见栽培。			

科：红豆杉科	种： <i>Taxus mairei</i> S. Y. Hu	药名：红豆杉	别名：南方红豆杉
--------	---------------------------------	--------	----------

紫杉

药用部位：种子。

植物特征：常绿乔木。树皮淡灰色，纵裂成长条薄片；芽鳞顶端钝或稍尖，脱落或部分宿存于小枝基部。叶2列，近镰刀形，背面中脉带上无乳头角质突起，或有时有零星分布，或与气孔带邻近的中脉两边有1至数条乳头状角质突起，淡绿色，边带宽而明显。种子倒卵圆形或柱状长卵形，通常上部较宽，生于红色肉质杯状假种皮中。

性味归经：甘、涩，平。归胃、大肠经。

功能主治：驱虫，消积。用于蛔虫病、钩虫病、食积。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服。



生境：海拔1500米以下的山地。

科：红豆杉科	种： <i>Taxus cuspidate</i> Sieb eb Zucc	药名：红豆杉	别名：紫杉、赤柏松
--------	--	--------	-----------



东北红豆杉

药用部位：枝叶。

植物特征：常绿乔木。叶线形，半直或稍弯曲，表面深绿色，有光泽。雌雄异株，球花生于前年枝的叶腋，雄球花具9 ~ 14雄蕊，雌球花具一胚珠，胚珠卵形、淡红色，直生。种子卵形，成熟时紫褐色，有光泽。外覆上部开口的假种皮，成熟时倒卵圆形，成杯状，浓红色，肉质，富浆汁。

性味归经：苦、平。归肾经。

功能主治：利尿健脾。治肾炎浮肿，小便不利，糖尿病。

用法用量：5 ~ 15克，配合其他药品使用。

生境：高山林地。

科：麻黄科	种： <i>Ephedra sinica</i> (Chinese joint fir)	药名：麻黄、策敦木	别名：麻黄草
-------	--	-----------	--------

草麻黄

药用部位：草质茎。

植物特征：草本状灌木。叶对生，鞘状，裂片锐三角形，先端急尖。雄花穗多呈复穗状，常具总柄，雌花序单生。种子通常2粒，三角状卵形或广卵形，黑红或灰褐色。

性味归经：辛、微苦，温。归肺、膀胱经。

功能主治：发汗散寒，宣肺平喘，利水消肿。用于风寒感冒、胸闷喘咳、风水浮肿、支气管哮喘。蜜麻黄润肺止咳，多用于表症已解、气喘咳嗽。

用法用量：2 ~ 9克，宜先煎。解表生用，平喘炙用或生用。

使用注意：发汗力较强，表虚自汗及阴虚盗汗，肾不纳气所致的喘咳应忌用。



生境：沙滩、沙丘、荒漠草原。

科：麻黄科	种： <i>Ephedra equisetina</i> Bge.	药名：麻黄、策敦木	别名：树麻黄
-------	-----------------------------------	-----------	--------

木贼麻黄

药用部位：干燥的草质茎。

植物特征：直立或斜生小灌木。木质茎明显，小枝细，灰绿色或蓝绿色，节间短。叶膜质鞘状，裂片2。花序腋生，雄球花无梗，雌球花常2个对生节上，成熟时苞片变为红色，肉质，含1粒种子，罕1粒；种子圆形，不露出。

性味归经：辛、微苦，温。归肺、膀胱经。

功能主治：发汗散寒，宣肺平喘，利水消肿。用于风寒感冒、胸闷喘咳、风水浮肿、支气管哮喘。蜜麻黄润肺止咳，多用于表症已解、气喘咳嗽。

用法用量：4 ~ 10克，水煎服，宜先煎。

使用注意：表虚自汗、阴虚盗汗、肾不纳气之咳喘者均应忌用。



生境：干旱的山地及沟崖边。





被子植物

ANGIOSPERM

被子植物

PDG

双子叶植物

DICOTYLEDONEAE

科：金粟兰科	种： <i>Chloranthus japonicus</i> Sieb	药名：四块瓦	别名：四叶对、四叶细辛、四片瓦、四大金刚、四大天王
--------	--------------------------------------	--------	---------------------------

银线草

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。根茎多节，须根多，细长，具香气。茎直立，不分枝，有节，每节着生2枚鳞叶，膜质，阔椭圆形至三角形。茎顶常对生4叶，轮生，叶卵形或椭圆形，边缘有粗锯齿。花白色，顶生穗状花序，无花被。核果梨形。

性味归经：辛、苦，有毒，归肺、心、肝三经。

功能主治：散寒，祛风，行淤，解毒。主治风寒咳嗽、妇女经闭、瘙痒、跌打损伤、痈肿疮疖。

用法用量：5 ~ 10克，水煎服，或浸酒。外用适量捣敷患处。

使用注意：孕妇忌服。



生境：林下草地。

科：杨柳科	种： <i>Populus davidiana</i> Dode	药名：白杨树皮	别名：小叶杨
-------	----------------------------------	---------	--------

山杨

药用部位：树皮。

植物特征：落叶乔木。木材白色。叶子近圆形，具波状钝齿。先叶开花，雌雄异株，柔荑花序下垂，花药红色，苞片深裂，裂缘有毛。蒴果两裂。

树干



性味归经：苦、辛，平。归肺、大肠经。

功能主治：凉血解毒，清热止咳，驱虫。主治高血压、肺热咳嗽、蛔虫病、小便淋漓；外用治秃疮疥癣。

用法用量：2.5 ~ 5克，水煎服。外用适量，研末加香油调敷。

生境：山地林带。



科：杨柳科	种： <i>Salix matsudana</i> Koidz.	药名：柳叶	别名：柳树、河柳、江柳
-------	----------------------------------	-------	-------------



旱柳

药用部位：叶。

植物特征：落叶乔木。大枝斜展，嫩枝有毛后脱落，淡黄色或绿色。叶披针形或条状披针形，先端渐长尖，基部窄圆或楔形，无毛，下面略显白色，细锯齿，嫩叶有丝毛后脱落。雄蕊2，花丝分离，基部有长柔毛，腺体2。雌花腺体2。

性味归经：苦，寒。归肺、膀胱经。

功能主治：清热解毒，祛风利湿。治慢性气管炎、尿道炎、膀胱炎、高血压；外用治关节肿痛、痈疽肿毒。

用法用量：25 ~ 50克，水煎服。外用适量捣敷患处。

生境：常见栽培。



先端渐长尖

叶条状披针形

科：胡桃科	种： <i>Juglans regia</i> L.	药名：胡桃肉、核桃仁	别名：核桃
-------	----------------------------	------------	-------

胡桃

药用部位：种仁。

植物特征：乔木。树皮灰褐色，幼枝有密毛。单数羽状复叶，小叶5 ~ 13，椭圆状卵形至长椭圆形，全缘，背面沿侧脉腋内有1簇短柔毛。花单性，雌雄同株；雄柔荑花序下垂，雄蕊6 ~ 30；雌花单生或2 ~ 3聚生于枝端，花柱2，羽毛状，绿白色。果序短，下垂，有核果1 ~ 3。

性味归经：甘，温。归肝、肾、大肠经。

功能主治：补肾固精，温肺止咳，益气养血，补脑益智，润肠通便。

用法用量：作干果任意食用，或煎汤入粥食。

使用注意：阴虚火旺或痰火内热者忌用。

生境：杂木林中，多见栽培。



叶全缘

雌花序

柔荑花序下垂

科：胡桃科	种： <i>Juglans mandshurica</i> Maxim	药名：青龙衣	别名：核桃楸、山核桃
-------	-------------------------------------	--------	------------

胡桃楸

药用部位：未成熟果皮。

植物特征：落叶乔木。叶集于枝顶，羽状复叶，小叶9 ~ 17枚，长椭圆形，叶缘具细锯齿，叶顶端钝尖，叶基阔楔形或圆。雄花序长9 ~ 27厘米；雌花序穗状，具4 ~ 10朵花。核果卵状，果核具8条纵棱，坚硬。



核果卵状

性味归经：苦、涩，平。归肾、胃经。

功能主治：止痛，解毒消肿。用于胃腹疼痛、水痢、痈肿疮毒、顽癣。

用法用量：10 ~ 15克，水煎服。外用适量捣敷患处。



叶长椭圆形

生境：海拔1800米以下的山地、沟谷。

科：胡桃科	种： <i>Pterocarya stenoptera</i> C. DC.	药名：枫杨叶	别名：枰柳、麻柳树、水麻柳、小鸡树、枫柳、蜈蚣柳、平杨柳、燕子树、元宝树
-------	--	--------	--------------------------------------

枫杨

药用部位：叶。

植物特征：落叶大乔木。具柄裸芽，密被锈毛。小枝灰色，有明显的皮孔且髓心片隔状。奇数羽状复叶，但顶叶常缺而呈偶数状，叶轴具翅和柔毛，小叶5 ~ 8对，无柄，缘具细齿，叶背沿脉及脉腋有毛。雌雄同株异花，雄花柔荑花序状，雌花穗状。小坚果，两端具翅。

性味归经：苦，寒，有毒。归大肠经。

功能主治：驱虫、健胃。用于驱虫。

用法用量：5 ~ 10克，研末冲服。



翅果



羽状复叶

生境：河岸旁，常见栽培。

科：桦木科	种： <i>Betula platyphylla</i> Suk.	药名：桦木皮	别名：桦树、桦皮树
-------	-----------------------------------	--------	-----------

白桦

药用部位：树皮。

植物特征：落叶乔木。树皮白色。叶三角状卵形或菱状卵形，先端渐尖，基部广楔形，缘有不规则重锯齿，背面疏生油腺点，无毛或脉腋有毛。花单性，雌雄同株，柔荑花序。果序圆柱形，中裂片三角形，侧裂片平展或下垂，小坚果椭圆形，膜质翅与果等宽。

性味归经：苦，寒。归足阳明经。

功能主治：清热利湿，祛痰止咳，消肿解毒。治肺炎、痢疾、腹泻、黄疸、肾炎、尿路感染、



树皮白色

慢性气管炎、急性扁桃体炎、牙周炎、急性乳腺炎、疖肿、痒疹、烫伤。

用法用量：25 ~ 50克，制成糖浆或冲剂。外用煅存性研末撒患处。



叶菱状卵形

果序

生境：山坡杂木林中。

科：桦木科	种： <i>Betula dahurica</i> Pall.	药名：棘皮桦	别名：黑桦
-------	---------------------------------	--------	-------

棘皮桦

药用部位：树皮。

植物特征：落叶乔木。树皮暗灰褐色或黑褐色，鳞块状深沟裂。叶片卵形、卵状椭圆形或菱状卵形，先端渐尖，边缘具不整齐尖锯齿，表面绿色，稍具光泽。雌、雄花序均呈柱状椭圆形，雄花序下垂，雌花序直立。果穗椭圆状短筒形，具长梗，单生于短枝顶端，直立；小坚果先端有毛，顶端具宿存花柱，两侧具膜质翅。

树皮暗灰褐色



性味归经：苦，寒。归大肠经。

功能主治：驱虫、健胃。民间用于驱虫。

用法用量：5 ~ 10克，研末冲服。



边缘具不整齐锯齿

叶表面绿色

生境：低山向阳山坡、山麓较干燥处或杂木林内。

科：桦木科	种： <i>Corylus heterophylla</i> Fisch. ex Trautv.	药名：榛	别名：平榛、榛子
-------	--	------	----------

榛


药用部位：种子。

植物特征：落叶灌木。叶互生，倒卵形，有锯齿，叶面上有绒毛。花雌雄同株，雄花排列成黄色柔荑花序；雌花排列成短的穗状花序，中央红色。坚果棕色，圆形或长圆形，部分或全部包埋于总苞内。

性味归经：甘，平。归脾、胃经。

功能主治：调中，开胃，滋养气血，明目。主治饮食不佳、体倦乏力、形体消瘦、肢体疲软、病后体虚、视物不明等病症。

用法用量：10 ~ 30克，水煎服。



生境：沟谷、山坡灌木丛中或疏林中。

科：壳斗科	种： <i>Castanea mollissima</i> Blume	药名：栗肉	别名：栗子、毛栗
-------	-------------------------------------	-------	----------

栗

药用部位：种子。

植物特征：落叶乔木。树皮灰褐色，不规则深纵裂。叶长椭圆或宽楔形，侧脉伸出锯齿的先端，形成芒状锯齿，下面的灰白色，短柔毛。雄花序有绒毛。雌花序生雄花序基部，常3朵集生，外具总苞，苞片针刺状。坚果2 ~ 3枚，褐色。

性味归经：甘，温。归脾、胃、肾经。

功能主治：养胃健脾，壮腰补肾，活血止血。适用脾胃虚寒引起的慢性腹泻，肾虚所导致的腰膝酸软，腰肢不遂，小便频繁，折伤肿痛等症。

用法用量：25 ~ 50克，水煎服，或入粥食。外用适量捣敷患处。



生境：低山丘陵缓坡及河滩地带。

科：壳斗科	种： <i>Quercus acutissima</i> Carr	药名：橡果	别名：橡子
-------	-----------------------------------	-------	-------

麻栎

药用部位：果实。

植物特征：落叶乔木。树冠广卵形。幼枝有黄色柔毛，后渐脱落。叶长椭圆状披针形，先端渐尖，基部圆或宽楔形，侧脉排列整齐，芒状锯齿，下面绿色，无毛或脉腋有毛。坚果球形，壳斗碗状，鳞片粗刺状，木质反卷，有灰白色绒毛。

性味归经：苦、涩，微温。归肾、肺经。

功能主治：解毒消肿。用于乳腺炎和其他炎症。



生境：中低海拔山地。

科：榆科	种： <i>Ulmus pumila</i> L.	药名：榆树皮、榆钱	别名：家榆、白榆
------	---------------------------	-----------	----------

榆

药用部位：果实、树皮。

植物特征：落叶乔木。树干直立，枝多开展。树皮深灰色，粗糙，不规则纵裂。单叶互生，卵状椭圆形至椭圆状披针形，缘多重锯齿。花两性，早春先叶开花或花叶同放，紫褐色，聚伞花序簇生。翅果近圆形，顶端有凹缺。



性味归经：① 榆钱微辛，平。归肝、肾经。② 榆树皮甘，平。归肝、肾经。

功能主治：① 榆钱：安神健脾。用于神经衰弱、失眠、食欲不振。② 树皮：安神，利小便。用于神经衰弱、失眠、体虚浮肿。③ 内皮：外用治骨折，外伤出血。

用法用量：① 榆钱：5 ~ 15克，水煎服。② 树皮15 ~ 25克，水煎服。③ 接骨以内皮酒调包敷患处，止血用内皮研粉撒布患处。



生境：山区、平原，多见栽培。

科：榆科	种： <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	药名：榔榆	别名：裂皮榆
------	----------------------------------	-------	--------

榔榆

药用部位：茎叶。

植物特征：落叶乔木。树皮近光滑，小枝褐色。叶革质，稍厚，椭圆形、卵形或倒卵形，顶端尖或钝，基部圆形，两侧稍不相等，叶缘有锯齿，表面光滑，背面幼时有毛。花秋季开放，簇生于当年生枝的叶腋。翅果椭圆形，翅较狭而厚；种子位于果实中央。

性味归经：甘、苦，寒。归肝、肾经。

功能主治：补益肝肾、祛风湿止疼。治疮肿、腰背酸痛、牙痛。

用法用量：30 ~ 60克，水煎服。外用适量捣敷患处。



生境：海拔500米以下的山坡。

科：榆科	种： <i>Celtis bungeana</i> Maxim.	药名：朴树皮	别名：黑弹朴
------	----------------------------------	--------	--------

小叶朴

药用部位：树皮。

植物特征：落叶乔木。树皮灰色或暗灰色，平滑；当年生枝淡褐色或带绿色，无毛或微被短柔毛，老枝灰褐色。叶厚纸质，具柄，上面有沟，沟中被短柔毛，渐脱落；叶片卵形至卵状披针形，先端尖至渐尖，边缘中部以上具疏粗锯齿，或一侧具齿而另一侧全缘，稀两侧近全缘，表面绿色，网脉明显。花杂性或单性。核果球形，成熟后蓝黑色。种子近球形。

性味归经：辛，凉。归肝经。

功能主治：清热解毒。治肺痈。

用法用量：100 ~ 150克，水煎服。



生境：低山区林地。

科：桑科	种： <i>Morus mongolica</i> Schneid.	药名：桑白皮、桑葚、霜桑叶、桑枝	别名：野桑
------	------------------------------------	------------------	-------



蒙桑

药用部位：叶、树皮、果实。

植物特征：小乔木或灌木。树皮灰褐色，纵裂；小枝暗红色，常有白粉。叶卵形至椭圆形，边缘有粗齿，齿端有刺芒尖，两面均无毛。聚花果红色或近黑色。


性味归经：① 桑叶味苦、甘，寒，归肺、肝经；② 桑枝性味苦平，归肝经；③ 桑白皮性味甘寒，归肺脾经；④ 桑葚性味甘寒，归心、肝、肾经。

功能主治：① 桑叶：疏风清热，凉血止血，清肝明目，润肺止咳。治风热感冒、肺热咳嗽、肝阳头痛眩晕、目赤昏花、血热出血及盗汗等症。② 桑枝：祛风湿，通经络，利关节，行水气。治风湿痹痛、四肢拘挛、水肿、身痒等症。③ 桑白皮：泻肺平喘，行水消肿。治肺热咳喘、痰多、水肿、小便不利等症。④ 桑葚：补肝益肾，滋阴补血，生津润肠，熄风。治阴亏血虚之眩晕、目暗、耳鸣、失眠、须发早白及津伤口渴、肠燥便秘等。

用法用量：① 桑叶：10 ~ 15克，水煎服或入散剂。② 桑枝：5 ~ 15克，水煎服。③ 桑白皮：5 ~ 15克，水煎服或入散剂。④ 桑葚：10 ~ 30克，水煎服或入丸、散。

使用注意：蒙桑药用价值与家桑相同，但药效略差；叶不可饲蚕。

生境：低山区林中。

科：桑科	种： <i>Cudrania tricuspidata</i> (Carr.) Bur.	药名：柘实	别名：柘桑
 叶卵形或倒卵形 柘树 药用部位：果实。 植物特征：落叶小乔木。常呈灌木状。树皮薄片状剥落。叶卵形或倒卵形，全缘，有时3裂。聚花果橘红色或橙黄色，球形，表面皱缩，肉质。 性味归经：苦，平。归肝、心经。 功能主治：清热凉血，舒筋活络。治跌打损伤。 用法用量：9 ~ 15克，作羹服。  聚合果球形			
生境：山野路边。			

科：桑科	种： <i>Cudrania cochinchinensis</i> (Lour.) Kudo et Masam.	药名：穿破石	别名：蓂芝
 药材 构棘 药用部位：根。 植物特征：直立或攀缘状灌木。枝无毛，具粗壮弯曲无叶的腋生刺，叶椭圆状披针形或长圆形，全缘，两面无毛，侧脉7 ~ 10对。花雌雄异株，雌雄花序均为具苞片的球形头状花序。聚合果肉质，不规则球形，表面微被毛，初为粉绿色，成熟时橙红色，味甜可食。 性味归经：淡微苦，凉。归心、肝经。 功能主治：祛风利湿，活血通经。治晚期消化道癌肿、恶性葡萄胎、绒毛膜上皮癌、鼻咽癌、肺癌、晚期恶性肿瘤。 用法用量：6 ~ 20克，水煎服。外用适量捣敷患处。  叶全缘 聚合果			
生境：山坡、溪边灌丛中或山谷、林缘等处。			

科：桑科	种： <i>Ficus carica</i> L.	药名：天生子	别名：文先果、奶浆果
------	---------------------------	--------	------------

无花果




药用部位：果实。

植物特征：落叶灌木或小乔木。枝条粗壮，光滑无毛。叶片大而厚，3 ~ 5裂，叶面粗糙，叶背有粗毛。隐头花序，着生于新梢的叶腋间，新梢渐伸长，花序也渐渐肥大而形成果实。

性味归经：甘，平。归肝、脾、胃、大肠经。

功能主治：败毒抗癌、消肿疗疮。用于喉肿疮痔、咽喉肿痛、癌瘤积毒、肝癌。

用法用量：9 ~ 15克，鲜果榨汁服用，干品水煎。外用适量捣敷患处。



生境：常见栽培。

科：桑科	种： <i>Humulus lupulus</i> L.	药名：酒花	别名：忽布
------	------------------------------	-------	-------

啤酒花

药用部位：雌花序。

植物特征：多年生缠绕草本。茎枝、叶柄密生细毛，叶卵形或宽卵形，不裂或3 ~ 5裂，边缘具粗锯齿，上面密生小刺毛，下面疏生毛和黄色小油点。花雌雄异株；雄花细小，排成圆锥花序；雌花每两朵生于一苞片腋部，苞片复瓦状排列成近圆形的穗状花序。果穗呈球果状，气芳香。瘦果扁圆形，褐色。

性味归经：苦，平。归脾胃、肺经。

功能主治：健胃，化痰止咳，安神。用于消化不良、失眠、肺结核、胸膜炎、麻风。

用法用量：3 ~ 5克，水煎服。



生境：田野路边。

科：桑科	种： <i>Herba Humuli Scandentis</i>	药名：葎草	别名：拉拉藤、穿肠草、拉拉秧、拉拉蔓、过沟龙
------	-----------------------------------	-------	------------------------

葎草

药用部位：花、果穗。

植物特征：缠绕草本。叶对生，掌状5深裂。花单性，雌雄异株；雄花多数，淡黄绿色；雌花集成短穗，腋生。果穗绿色，鳞状苞花后成卵圆形，先端短尾尖，外侧有暗紫斑及长白毛。

性味归经：甘、苦、寒。归肺、肾、大肠经。

功能主治：清热，利尿，消淤，解毒。治淋病、小便不利、腹泻、痢疾、肺结核、肺脓疡、肺炎、癰疮、痔疮、痈毒、瘰癧。

用法用量：15 ~ 30（鲜品100 ~ 200）克，水煎或捣汁服。外用捣敷或煎水洗。

生境：沟边、路旁、荒地。



雄花

叶掌状5深裂

雌花

科：桑科	种： <i>Cannabis sativa</i> L.	药名：火麻仁	别名：麻子仁、麻仁、线麻子
------	------------------------------	--------	---------------

大麻

药用部位：种子。

植物特征：一年生草本。掌状复叶互生或下部对生，小叶片披针形或线状披针形，边缘具粗齿。花单性，雌雄异株。瘦果扁圆形，果皮坚硬，灰白色至灰褐色，表面平滑，具网纹。


性味归经：甘，平。归脾、胃、大肠经。

功能主治：润燥，滑肠，通淋，活血。治肠燥便秘、消渴、热淋、风痹、痢疾、月经不调、疥疮、癣癩。

用法用量：5 ~ 25克，水煎服或入丸、散。外用适量捣敷或榨油涂。

使用注意：本品含油脂过多，肠胃虚弱者慎服。孕妇忌服。

生境：田野路边。



花单性

小叶片边缘具粗齿

药材

科：荨麻科

种： *Urtica angustifolia* Fisch.

药名：螫麻子

别名：小荨麻

狭叶荨麻

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。茎四棱形，有螫毛。叶对生，叶片披针形或狭卵形，边缘具粗锯齿。花雌雄异株，花序圆锥状，有时分枝短而近穗状。瘦果卵形、扁，光滑，成熟后黄色。

性味归经：苦、辛，温。有小毒。归肝、胃经。

功能主治：祛风定惊，消食通便。用于风湿关节痛、产后抽风、小儿惊风、小儿麻痹后遗症、高血压、消化不良、大便不通；外用治荨麻疹初起、蛇咬伤。

用法用量：5 ~ 10克，水煎服。外用适量捣汁外搽或煎水洗患处。

生境：山地林缘、灌丛或沟旁。



科：荨麻科

种： *Urtica laetevirens* Maxim.

药名：宽叶荨麻

别名：螫麻

宽叶荨麻

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。茎四棱形，有螫毛。叶对生，叶片广卵形或卵形，基部广楔形或近心形，先端锐尖或渐尖成尾状，边缘具大而疏开的锐尖锯齿，有缘毛。花雌雄异株，雌花较雄花小。瘦果卵形、扁，光滑，成熟后黄色。

性味归经：苦、辛，温。有小毒。归肝、胃经。

功能主治：祛风定惊，消食通便。用于风湿关节痛、产后抽风、小儿惊风、小儿麻痹后遗症、高血压、消化不良、大便不通；外用治荨麻疹初起、蛇咬伤。

用法用量：5 ~ 10克，水煎服。外用适量捣汁外搽或煎水洗患处。

生境：山地林缘、灌丛或沟旁。



科：荨麻科	种： <i>Urtica cannabina</i> L.	药名：麻叶荨麻	别名：火麻草、螫麻子、蝎子草
-------	-------------------------------	---------	----------------

麻叶荨麻

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。茎四棱形，有螫毛。叶对生，叶片掌状3全裂，裂片再成缺刻状羽状深裂，表面深绿色。花单性，雌雄同株或异株，雌花较雄花小。瘦果卵形、扁，光滑，成熟后黄色。

性味归经：苦、辛，温。有小毒。归肝、胃经。

功能主治：祛风湿，凉血，定痉。用于高血压病。外用治荨麻疹初起、风湿关节炎、毒蛇咬伤、小儿惊风。

用法用量：25 ~ 50克，水煎服。外用适量，捣汁外搽或煎水洗患处。



生境：山地林缘、灌丛或沟旁。

科：荨麻科	种： <i>Boehmeria longispica</i> Steud.	药名：苕麻根	别名：野麻、白麻
-------	---------------------------------------	--------	----------

大叶苕麻

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。叶对生，叶片坚纸质，广卵形或近圆形，先端长渐尖或不明显3骤尖，边缘疏生不整齐的粗锯齿，上部常有重锯齿，托叶披针形。花单性，雌雄同株，穗状花序腋生，雌花簇位于雄花簇上方；花细小，绿色，雄花花萼4裂，雄蕊2 ~ 4。瘦果长倒卵形，有白毛，多数聚集成球状。

性味归经：甘、寒。归肝经。

功能主治：清热利尿，安胎止血，解毒。用于感冒发热、麻疹高烧、尿路感染、肾炎水肿、孕妇腹痛、胎动不安、先兆流产、跌打损伤、骨折、疮疡肿痛、出血性疾病。

用法用量：10 ~ 15克，水煎服。外用适量捣敷患处。



生境：荒地、山坡或栽培。

科：荨麻科	种： <i>Girardinia suborbiculata</i> C. J. Chen	药名：蝎子草	别名：红藿毛草、火麻草
-------	---	--------	-------------

蝎子草

药用部位：全草。

植物特征：一年生草本。茎直立，有棱，伏生硬毛及螫毛。叶互生，叶片圆卵形，先端渐尖或尾状尖，基部圆形或近平截，叶缘有粗锯齿，两面伏生粗硬毛和螫毛，主脉有时带红色。花单性雌雄同株。瘦果宽卵形。

性味归经：辛，温。有毒。归肝经。

功能主治：止痛。用于风湿麻痹。

用法用量：外用取鲜品适量在痛处刷打数次，至局部发红、发热。

使用注意：不可内服。



生境：海拔50 ~ 800米的林下或沟边阴处。

科：荨麻科	种： <i>Pilea mongolica</i> Wedd.	药名：透茎冷水花	别名：肥肉草、美豆
-------	---------------------------------	----------	-----------

透茎冷水花

药用部位：全草。

植物特征：一年生草本。叶卵形或宽卵形，顶端渐尖，基部楔形，边缘有三角状锯齿，两面疏生短毛和细密的线形钟乳体。花雌雄同株或异株，呈短而紧密的聚伞花序，雄花的花被片2，裂片顶端下有短角，雄蕊2；雌花花被片3，线状披针形，内有退化雄蕊3。瘦果扁卵形，表面散生有褐色斑点。

性味归经：甘，寒。归肾经。

功能主治：清热，利尿，解毒。治尿路感染、急性肾炎、子宫内膜炎、子宫脱垂、赤白带下、跌打损伤、痈肿初起、虫蛇咬伤。

用法用量：15 ~ 30克，水煎服。外用适量捣敷患处。



生境：山坡林下或沟谷旁阴湿处。

科：荨麻科	种： <i>Parietaria micrantha</i> Ledeb.	药名：墙草	别名：石薯、石茹菰、白石薯、 软骨石薯、白猪子果、袜子菜
-------	--	-------	---------------------------------

墙草

药用部位：块根、叶。

植物特征：一年生草本。茎肉质细弱，近直立或平卧，多分枝，稀不分枝，散生短柔毛或无毛。叶互生；花杂性同株，聚伞花序腋生，花白色，瘦果广卵形，稍扁，黑褐色，有光泽，包于宿存花被内，长于花被。种子椭圆形，两端尖。

性味归经：淡，平。归肝、肺经。

功能主治：拔脓消肿。主治脚底深部脓肿、痈疽、疔疖、多发性脓肿。

用法用量：外用鲜品捣烂敷患处。



生境：岩石裂缝间，岩石下阴湿地上。

科：桑寄生科	种： <i>Loranthus tanakae</i> Franch. et Sav.	药名：北寄生	别名：桑寄生
--------	---	--------	--------

北桑寄生

药用部位：干燥带叶茎枝。

植物特征：落叶小灌木。丛生于寄主枝上，幼时绿色至褐色，无毛，老时黑褐色至黑色，有腊质层，常二歧分枝。叶对生，叶片纸质，绿色，倒卵形长圆形，基部楔形，微下延至柄，先端圆钝，全缘，两面无毛。花两性或单性，雌雄同株或异株。果实球形，半透明，橙黄色，表面平滑。

性味归经：苦、甘，平。归肝、肾经。

功能主治：补肝肾，强筋骨，祛风湿，安胎元。用于风湿痹痛、腰膝酸软、筋骨无力、崩漏经多、妊娠漏血、胎动不安、高血压。

用法用量：9 ~ 15克，水煎服。



生境：寄生于栎、桦、苹果等属植物上。

科：桑寄生科	种： <i>Viscum coloratum</i> (Kom.) Nakai	药名：槲寄生	别名：北寄生、桑寄生、柳寄生、寄生子
--------	---	--------	--------------------



槲寄生

药用部位：带叶枝条。

植物特征：常绿半寄生小灌木。茎枝圆柱形、黄绿色或绿色，节明显，节上2~3叉状分枝。单叶对生，生于枝端，无柄，近肉质，有光泽，椭圆状披针形或倒披针形，全缘，两面无毛。花单性异株，生于枝端或分叉处。浆果球形，半透明，熟时橙红色。

性味归经：甘、苦，平。归肝、肾经。

功能主治：祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎。用于风湿痹痛、腰膝酸软、胎动不安。

用法用量：9~15克，水煎服。

生境：榆树、桦树、枫树、梨树、麻栎等树上。

科：马兜铃科	种： <i>Asarum sieboldii</i> Miq.	药名：细辛	别名：小辛、细草、独叶草
--------	---------------------------------	-------	--------------

细辛

药用部位：带根全草。

植物特征：多年生草本。根茎直立或横走。叶通常2枚，芽胞叶肾圆形，边缘疏被柔毛；叶片心形或卵状心形，先端渐尖或急尖，基部深心形。花紫黑色。蒴果近球形。


性味归经：辛，温。归肺、肾、心、肝、胆、脾经。

功能主治：散寒祛风，止痛，温肺化饮，通窍。治风寒表症、头痛、牙痛、风湿痹痛、痰饮咳喘、鼻塞、鼻渊、口疮。

用法用量：1.5~9克，水煎服；1~3克，研末吞服。外用适量，研末吹鼻、塞耳、敷脐。

使用注意：孕妇忌服。

生境：林下阴湿腐殖质土中。



科：马兜铃科	种： <i>Asarum forbesii</i> Maxim.	药名：马辛	别名：马蹄细辛
杜衡 药用部位：全草。 植物特征：多年生草本。叶宽心形至肾状心形，顶端钝或圆，基部心形，表面深绿色，杂有白色斑。单花顶生。蒴果肉质，有多数黑褐色种子。 性味归经：辛，温。归肺、肝、肾、膀胱经。 表面杂有白色斑 基部心形 功能主治：祛风散寒，止痛。治风寒感冒，痰饮喘咳、水肿、风湿、跌打损伤、头疼、龋齿痛、痧气腹痛。 用法用量：煎汤，2.5 ~ 5克，水煎服，浸酒或入散剂。外用研末吹鼻或捣敷。 使用注意：体虚多汗、咳嗽咯血者及孕妇忌服。 生境：阴湿有腐殖质的林下或草丛中。			

科：马兜铃科	种： <i>Saruma henryi</i> Oliv	药名：马蹄香	别名：冷水丹
马蹄香 药用部位：根状茎及根部。 植物特征：草本。根茎粗壮。叶互生，心形，基部两侧耳片圆。花单生于顶端。果熟时革质。 性味归经：辛、苦，温。有小毒。归肺、肾、心、肝、胆、脾经。 功能主治：温中散寒，理气止痛。 基部两侧耳片圆 先端短尖 治胃寒疼痛、心前区痛、关节疼痛；外用治疮疡。 用法用量：2.5 ~ 5克，水煎服，或研粉冲服。外用取鲜叶适量捣敷患处。 使用注意：本品较混乱，同名很多，应以拉丁学名为准。 生境：丘陵坡地、山野、荒坡、草丛、路边、沟边。			

科：马兜铃科	种： <i>Aristolochia contorta</i> Bunge.	药名：马兜铃	别名：烟管花
北马兜铃 药用部位：果实。 植物特征：缠绕草本。茎细长。叶互生，三角状心形、心形或卵状心形。花多朵，簇生于叶腋。蒴果球形。 性味归经：苦，微寒。归肺、大肠经。 功能主治：清肺降气，止咳平喘，清肠消痔。用于肺热喘咳、痰中带血、肠热痔血、痔疮肿痛。 叶三角状心形 叶互生 茎细长 花蕾 用法用量：3 ~ 9克，水煎服或入丸、散。 使用注意：有微毒，不可过量长期服用。 生境：山沟灌丛间、路旁、山坡。			

科：马兜铃科	种： <i>Aristolochia manshuriensis</i> Kom.	药名：关木通	别名：木通
--------	---	--------	-------



木通马兜铃

药用部位：干燥藤茎。

植物特征：缠绕藤本。叶互生，卵状心形，下面密生短柔毛。花单生，稀2朵，腋生于短枝上，花梗稍弯曲；花被筒马蹄形弯曲，上部膨大，淡黄色，具紫色条纹，先端3深裂，近平展。蒴果圆柱形，熟时自顶端裂开成6瓣。种子扁三角形。

性味归经：苦，寒。归心、小肠、膀胱经。

功能主治：清心火，利小便，通经下乳。用于口舌生疮、心烦尿赤、水肿、热淋涩痛、白带、经闭乳少、湿热痹痛。

用法用量：3 ~ 6克，水煎服或入丸、散。

使用注意：有小毒，孕妇慎用。

药材

生境：低山区林中。

科：马兜铃科	种： <i>Aristolochia mollissima</i> Hance.	药名：绵毛马兜铃	别名：寻骨风、黄木香、毛香、猴耳草
--------	--	----------	-------------------



绵毛马兜铃

药用部位：全草。

植物特征：多年生缠绕草本。全株密被黄白色绵毛。叶互生，卵状心形，先端短尖，全缘。花单生于叶腋，花梗近中部具1叶状苞片；花被弯曲成烟斗形，顶端3裂，带紫色；雄蕊6。蒴果圆柱形，沿背缝线具有宽翅，黑褐色。

性味归经：苦，平。归肝、肾经。

功能主治：祛风湿，通经络，止痛。用于风湿关节痛、腹痛、疟疾、痢肿。

用法用量：3 ~ 9克，水煎服。外用适量捣敷患处。

使用注意：孕妇忌服。

药材

生境：山坡草丛和沟旁路边。

科：蓼科	种： <i>Polygonum aviculare</i> L.	药名：篇蓄	别名：扁竹蓼、乌蓼
------	----------------------------------	-------	-----------

篇蓄

药用部位：植株的地上部分。

植物特征：一年生草本。常有白粉；茎绿色，有沟纹。叶茎生，线形至披针形，顶端钝或急尖，基部楔形，托叶鞘膜质，有明显脉纹。花1 ~ 5朵簇生叶腋，露出托叶鞘外，花梗短，基部有关节；花被5深裂，裂片椭圆形，暗绿色，边缘白色或淡红色；雄蕊8；花柱3裂。瘦果卵形，表面有棱，褐色或黑色，有不明显的小点。



干燥植株



性味归经：苦，微寒。归膀胱经。

功能主治：苦降下行，通利膀胱，苦燥又能杀虫除湿止痒。用于淋痛及湿疹。

用法用量：10 ~ 15克（鲜品加倍），水煎服。外用适量。

生境：生田野路边。

科：蓼科	种： <i>Polygonum orientale</i> L.	药名：水红花子	别名：荭草、东方蓼、大蓼子、天蓼、狗尾巴花
------	----------------------------------	---------	-----------------------

红蓼

药用部位：果实。

植物特征：一年生草本。全株被长软毛。茎直立，多分枝。叶互生，阔卵形或卵形，顶端渐尖，基部圆形或略心形，全缘，两面均被软毛。圆锥花序顶生，略下垂；花淡红色或白色；花被5深裂；雄蕊7，偶见8枚；花柱2。瘦果扁圆形。

性味归经：咸，微寒。归肝、胃经。

功能主治：散血消癥，消积止痛。用于癥瘕痞块，癭瘤肿痛，食积不消，胃脘胀痛。

用法用量：15 ~ 30克，水煎服。外用适量，熬膏敷患处。



生境：田间、路旁、湿地。

科：蓼科	种： <i>Polygonum suffultum</i> Maxim.	药名：红三七	别名：螺丝三七、算盘七
------	--------------------------------------	--------	-------------

支柱蓼



药用部位：根状茎。

植物特征：多年生草本。根茎肥厚，具节，紫褐色，须根甚多。茎丛生或单生，细长，绿色，不分枝。基生叶有长柄，茎生叶互生，下部的具柄，上部的渐至无柄；叶片卵形或广卵形，质薄，长先端尖锐，微弯，全缘，基部心形。穗状花序顶生或腋生，小花白色，花被5深裂，长椭圆形。瘦果卵形，有3锐棱，黄褐色，有光泽。

性味归经：苦、涩，凉。归肝、肾经。

功能主治：收敛止血，止痛生肌。用于跌打损伤、外伤出血、便血、崩漏、痢疾、脱肛。

用法用量：15 ~ 25克，水煎冲黄酒或红糖内服。



生境：山区的林下或潮湿地方，常见于黄沙泥地中。

科：蓼科	种： <i>Polygonum Bistorta</i> L.	药名：紫参	别名：紫参
------	---------------------------------	-------	-------

拳蓼


药用部位：地下茎。

植物特征：草本。根茎粗厚，黑褐色，里面紫色；茎单一。基生叶狭披针形或披针形；有长柄，叶柄有翅，棕色。穗状花序顶生，圆柱形，花小密集，花被5深裂，白色或粉红色。瘦果3棱形，红褐色。

性味归经：苦、涩，微寒。归肺、肝、大肠经。

功能主治：清热解毒，消肿，止血。用于赤痢、热泻、肺热咳嗽、痈肿、瘰癧、口舌生疮、吐血、鼻出血、痔疮出血、毒蛇咬伤。

用法用量：4.5 ~ 9克，水煎服。外用适量捣敷患处。



生境：1600 ~ 2000米以上的亚高山草甸中。

科：蓼科	种： <i>Polygonum hydropiper</i> L.	药名：水蓼	别名：蒿、蒿虞、虞蓼、泽蓼、辣蓼草、柳蓼
------	-----------------------------------	-------	----------------------

水蓼

药用部位：地上全草。

植物特征：一年生草本。单叶互生，叶片披针形，先端渐尖，基部楔形，两面有黑色腺点。总状花序穗状，苞片漏斗状，有褐色腺点，先端具短睫毛或近无毛；花被4 ~ 5深裂。瘦果卵形。

性味归经：辛、苦，平。归脾、胃、大肠经。

功能主治：行滞化湿，散瘀止血，祛风止痒，解毒。治湿滞内阻、脘闷腹痛、泄泻、痢疾、小儿疳积、崩漏、血滞经闭痛经、跌打损伤、风湿痹痛、便血、外伤出血、皮肤瘙痒、湿疹、风疹、足癣、痈肿、毒蛇咬伤。

用法用量：15 ~ 30克（鲜品加倍），水煎或捣汁服。外用适量，煎水浸洗或捣敷。



生境：水边、路旁湿地。

科：蓼科	种： <i>Polygonum senticosum</i> (Meisn.) Franch. et Sav.	药名：刺蓼	别名：廊茵、急解素、蛇不钻、猫舌草
------	---	-------	-------------------

刺蓼

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。茎蔓生或上升，有四棱，沿棱倒生刺。叶片三角形或三角状戟形，基部微心形或有深凹湾，边缘有细毛和钩刺，通常两面无毛或被疏细毛，背面沿脉疏生刺。花序头状，顶生或腋生，分枝，通常花序成对生。坚果近球形，黑色，包在宿存的花被内。

性味归经：酸、微辛，平。归肝、肾经。

功能主治：解毒消肿，利湿止痒。用于湿疹、黄水疮、疔疮、痈疖、蛇咬伤。

用法用量：不内服，外用煎水外洗或捣烂敷患处。



生境：山沟、林内。

科：蓼科	种： <i>Polygonum perfoliatum</i> L.	药名：杠板归	别名：河白草、蛇倒退
------	------------------------------------	--------	------------

杠板归

药用部位：地上全草。

植物特征：一年生攀缘草本。茎有棱，棱及叶柄有倒生钩刺。叶片近三角形，盾状着生，顶端尖，基部近心形或截形；托叶鞘叶状草质，近圆形，穿茎。花序短穗状，花淡红色或白色。瘦果球形，黑色，有光泽，包于花被内。

性味归经：酸，微寒。归肾经。

功能主治：利水消肿，清热解毒，止咳。治肾炎水肿、百日咳、泻痢、湿疹、疖肿、毒蛇咬伤。

用法用量：15 ~ 30克，水煎服。



生境：山谷灌木丛中和水沟边。

科：蓼科	种： <i>Polygonum viviparum</i> L.	药名：珠芽蓼	别名：山高粱
------	----------------------------------	--------	--------

珠芽蓼

药用部位：根茎。

植物特征：多年生草本。根状茎粗短，肥厚，拳头状，紫褐色，被残留老叶。茎直立，不分枝，常2 ~ 3自根状茎伸出。叶片革质，矩圆形、卵形或披针形，茎上部叶无柄，较细小；托叶鞘长筒状，无毛。花序穗状，顶生，圆柱形，花排列紧密，苞膜质，其中着生1 ~ 2朵花或1个珠芽，珠芽宽卵形，花白色或粉红色。小坚果卵形，具3棱。

性味归经：苦、涩、微甘，温。归胃、膀胱经。

功能主治：健胃，调经。治胃病、消化不良、腹泻、月经不调、崩漏等。

用法用量：9克，水煎服。



生境：高山草甸。

科：蓼科	种： <i>Polygonum lapathifolium</i> L.	药名：酸模叶蓼	别名：斑叶蓼
------	--------------------------------------	---------	--------

酸模叶蓼

药用部位：全草。

植物特征：一年生草本。茎直立，上部分枝，节部膨大。叶片宽披针形，大小变化很大，顶端渐尖或急尖，表面绿色，常有黑褐色新月形斑点。圆锥花序，花被粉红色或白色。瘦果卵形，扁平，两面微凹，黑褐色，光亮。

性味归经：苦、酸，寒。归肾、大肠经。

功能主治：
① 果实为利尿药，主治水肿和疮毒。
② 鲜茎叶混食盐后捣汁，治霍乱和日射病有效；外用可敷治疮肿和蛇毒。

用法用量：5 ~ 10克，水煎服。外用适量捣敷患处。

生境：路边草丛。



科：蓼科	种： <i>Fagopyrum cymosum</i> (Trev.) Meisn.	药名：金苦荞	别名：野荞麦
------	--	--------	--------

苦荞麦

药用部位：根茎。


植物特征：一年生草本植物。茎直立，具分枝。下部叶具长柄，叶片宽三角状戟形，全缘或微波状；下部叶较小。总状花序腋生或顶生，花白色或淡粉红色。小坚果圆锥状卵形，具3棱，灰褐色。

性味归经：涩、微辛，凉。归肝、肺经。

功能主治：清热解毒，清肺排痰，排脓消肿，祛风化湿。用于肺脓疡、咽喉肿痛、痢疾、无名肿毒、跌打损伤、风湿关节痛。

用法用量：15 ~ 25克。水煎服。

生境：山坡、旷野、路边及溪沟较阴湿处。



科：蓼科	种： <i>Rumex japonicus</i> Houtt.	药名：羊蹄	别名：牛舌头、土大黄、野大黄
------	----------------------------------	-------	----------------

羊蹄

药用部位：根、叶。

植物特征：多年生草本。基生叶长椭圆形，茎生叶小，基部楔形。狭长圆锥花序，花两性。瘦果宽卵形。

性味归经：① 根苦，寒。归肝、大肠经。
② 叶甘，寒。归心、脾、大肠经。

功能主治：① 根清热解毒，杀虫止痒，通便。治皮肤病、疥癣、各种出血、炎症。② 叶杀虫，凉血止血，滑肠通便。治肠风痔漏出血、便秘、小儿疳积、目赤、口疮、疥癣。

用法用量：15 ~ 25克，水煎服。外用适量捣敷或煎水含漱。

使用注意：不可长期大量服用。

生境：山野、路旁或湿地。



叶长椭圆形



狭长圆锥花序

科：蓼科	种： <i>Rumex nepalensis</i> Spreng.	药名：土大黄	别名：羊蹄、鬼目
------	------------------------------------	--------	----------

尼泊尔酸模

药用部位：根和全草。

植物特征：多年生草本。根粗大。单叶互生；茎生叶长椭圆形、卵状长椭圆形至三角状卵形，边缘具不整齐之波状起伏。总状花序，花被6，内轮3枚扩大为果被，卵圆形，边缘有针状齿。瘦果三角形，有光泽。

性味归经：苦，寒，有小毒。归肝、大肠、膀胱经。

功能主治：清热，通便，利水，止血，杀虫。治大便燥结、淋浊、黄疸、吐血、肠风、功能性子宫出血、秃疮、疥癣、痈肿、跌打损伤。

用法用量：15 ~ 25克，水煎服，或捣汁、熬膏。外用捣敷，磨汁涂或煎水洗患处。

使用注意：脾胃虚寒，泄泻不食者忌服。

生境：低山温暖地区的路旁及沟边。



总状花序

茎生叶互生

科：蓼科	种： <i>Rumex acetosa</i> L.	药名：酸模	别名：山菠菜、野菠菜、酸溜溜
------	----------------------------	-------	----------------

酸模

药用部位：根或全草。

植物特征：多年生草本。根状茎粗短，须根多数，并可发出多条地上茎。单叶互生，叶片质薄，椭圆形或披针状长圆形，全缘或微波状。花单性异株，圆锥花序顶生。瘦果椭圆形，3锐棱，两端尖，黑褐色，有光泽。

性味归经：酸、苦，寒。归肾、大肠经。

功能主治：凉血，解毒，通便，杀虫。治内出血、痢疾、便秘、内痔出血；外用治疥癣、疔疮、神经性皮炎、湿疹。

用法用量：15 ~ 25克，水煎服。外用适量捣汁或干根用醋磨汁涂患处。



生境：山坡、路边、荒地或沟谷溪边湿处。

科：蓼科	种： <i>Rumex crispus</i> L.	药名：土大黄	别名：羊蹄草
------	----------------------------	--------	--------

皱叶酸模

药用部位：根和全草。

植物特征：多年生草本。直根粗壮。根生叶有长柄，叶片披针形或长圆状披针形；茎

花序顶生狭长

上部叶小。花序由数个腋生的总状花序组成圆锥状，顶生狭长，花两性，多数。瘦果椭圆形，褐色，有光泽。

性味归经：辛、苦，凉。归肝、大肠、肾经。

功能主治：清热解毒，止血，通便，杀虫。治鼻出血、子宫出血、血小板减少性紫癜、大便秘结等；外用治外痔、急性乳腺炎、黄大疮、疖肿、皮癣等。

用法用量：15 ~ 25克，水煎服。外用适量捣敷或磨汁涂。



生境：田边、路旁、湿地或水边。

科：蓼科	种： <i>Rheum palmatum</i> L.	药名：大黄	别名：掌叶大黄
------	-----------------------------	-------	---------

大黄

药用部位：根和根状茎。

植物特征：多年生草本。根及根状茎粗壮，肥厚，稍木质。基生叶叶片宽卵形或近圆形，掌状浅裂；茎生叶较小。圆锥花序，花小。

性味归经：苦，寒。归脾、胃、大肠、肝、心包经。

功能主治：酒大黄清上焦血分热毒，治目赤咽肿，齿龈肿；熟大黄泻下力缓，泻火解毒，治火毒疮疡；大黄炭凉血化淤止血，用于血热有淤出血症。

用法用量：3 ~ 30克，水煎服，泻下不宜久煎。外用适量研末调敷。

使用注意：孕妇慎用。



生境：山地林缘潮湿处。

科：蓼科	种： <i>Rheum undulatum</i> L.	药名：大黄	别名：苦大黄
------	------------------------------	-------	--------

波叶大黄

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。根茎肥厚，表面黄褐色。基生叶叶片卵形至卵状圆形，边缘波状，茎生叶较小。圆锥花序顶生，花白绿色。瘦果具3棱，有翅。

性味归经：苦，寒。归胃、大肠、肝经。

功能主治：泻热毒，破积滞，行淤血。治实热便秘、食积痞满、痢疾初起、闭经、吐血、鼻出血、水肿、淋浊、痈疡肿毒、疔疮。

用法用量：5 ~ 20克，水煎服（用于泻下不宜久煎），或入丸、散。外用研末，水或醋调敷。

使用注意：孕妇忌服。本品为大黄中品质较次者，尽量以其他大黄品种代替。



生境：山坡、石隙、草原。

科：蓼科	种： <i>Rheum franzenbachii</i> Munt.	药名：土大黄	别名：华北大黄
------	-------------------------------------	--------	---------

河北大黄

药用部位：根茎、叶。


植物特征：多年生草本。根茎肥厚，表面黄褐色。基生叶有长柄；叶片卵形至卵状圆形，边缘波状。圆锥花序顶生，花小，多数。瘦果。

性味归经：苦、辛，凉。归胃、大肠经。

功能主治：清热解毒，止血，祛淤，通便，杀虫。治肺脓疡、肺结核咯血、鼻出血、流行性乙型脑炎、肝炎、便秘；外用治跌打损伤、烧烫伤、痈疖肿毒等、疥疮、湿疹、皮炎。

用法用量：15 ~ 25克（鲜品加倍），水煎服。外用适量研末敷。

生境：山地。



科：蓼科	种： <i>Antenoron neofiliforme</i> (Nakai) Hara	药名：金线草	别名：野蓼、一串红
------	---	--------	-----------

短毛金线草

药用部位：全草。

植物特征：多年生直立草本。根茎横走，粗壮，扭曲。茎节膨大。叶互生；有短柄；托叶鞘筒状，抱茎，膜质；叶片椭圆形或长圆形，全缘，两面有长糙伏毛，散布棕色斑点。穗状花序顶生或腋生；花小，红色。瘦果卵圆形，棕色，表面光滑。

性味归经：辛，温。归肺、肝、脾、胃经。

功能主治：祛风除湿，理气止痛，止血，散淤。治风湿骨痛、胃痛、咳血、吐血、便血、血崩、经期腹痛、产后血淤腹痛、跌打损伤。

用法用量：15 ~ 50克，水煎服。外用适量煎水洗。

生境：山地林缘、路旁阴湿地。



科：蓼科	种： <i>Oxyria digyna</i> (L.) Hill	药名：山蓼	别名：酸浆菜
------	-----------------------------------	-------	--------

肾叶山蓼

药用部位：全草

植物特征：多年生草本。茎直立。叶常簇生于基部，具长柄；叶片肾形，顶端圆钝，基部宽心形，全缘或微波状。圆锥花序顶生，花小，两性，淡绿色。瘦果扁圆形，边缘有膜质翅，顶端凹陷，翅淡红色。

性味归经：酸，凉。归肝经。

功能主治：清热利湿。治肝气不舒、肝炎、坏血病。

用法用量：15 ~ 20克，水煎服。

生境：高山地区的山坡或山谷。



科：蓼科	种： <i>Oxyria sinensis</i> Hemsl.	药名：山蓼	别名：园叶山蓼
------	----------------------------------	-------	---------

中华山蓼

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。茎直立，通常数条，自根状茎发出，具深纵沟，密生短硬毛。无基生叶，茎生叶叶片圆心形或肾形，近肉质，顶端圆钝，基部宽心形，边缘呈波状。花序圆锥状，苞片膜质，褐色，每苞内具5 ~ 8花，花单性，雌雄异株。

瘦果宽卵形，双凸镜状，两侧边缘具翅，连翅外形呈圆形。

性味归经：酸，凉。归肝经。

功能主治：清热利湿。治肝气不舒、肝炎、坏血病。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服。

生境：山地。



科：藜科	种： <i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>cicla</i> L.	药名：莙苳菜	别名：忝菜、叶用甜菜
------	---	--------	------------



莙苳菜

药用部位：叶。

植物特征：二年生草本。植株矮生或直立。叶片淡绿、浓绿或紫红色，肥厚，卵圆形，有光泽。花淡绿略带红色。果实聚生。种子小，肾形，褐色。

性味归经：甘、苦，大寒。归肝、脾、肾经。

功能主治：清火，祛风，杀虫、解毒，通淋治痢，止带调经。主治时行风热外感、虫蚊叮咬、疖疮肿毒、小便淋沥、下痢腹泻、白浊带下、月经不调。

用法用量：25 ~ 100克，水煎服。外用适量捣敷患处。

使用注意：多食有腹痛腹泻反应。脾胃虚寒者不宜多食。

生境：常见栽培。

科：藜科	种： <i>Chenopodium glaucum</i> L.	药名：小灰菜	别名：黄瓜菜、山芥菜、山苘菠、山根龙
------	----------------------------------	--------	--------------------

灰绿藜

药用部位：叶。

植物特征：一年生草本。茎通常由基部分枝，斜上或平卧，有沟槽与条纹。叶片厚，带肉质，椭圆状卵形至卵状披针形，边缘有波状齿，中脉明显。花簇短穗状，腋生或顶生；花被裂片3 ~ 4，少为5。胞果伸出花被片，果皮薄，黄白色；种子扁圆，暗褐色。

性味归经：甘，平。归肺、大肠经。

功能主治：清热利湿，枝叶透疹。用于风热感冒、痢疾、腹泻、龋齿痛；外用治皮肤瘙痒、麻疹不透。

用法用量：50 ~ 100克，水煎服。外用适量，水煎洗患处；或捣烂蒸热用布包，外用滚胸背手脚心，以透疹。

生境：540 ~ 1400米的农田边、水渠沟旁、平原荒地、山间谷地等。



科：藜科	种： <i>Chenopodium foetidum</i> Schrad.	药名：菊叶香藜	别名：香藜
------	--	---------	-------

菊叶香藜

药用部位：全草。

植物特征：一年生草本。全株具腺体及腺毛，有强烈气味。茎直立，分枝。单叶互生，具柄，叶片矩圆形，羽状浅裂至深裂，先端钝，基部楔形，两面被短柔毛和棕黄色腺点。花单生于小枝腋内或末端，组成二歧聚伞花序，再集成塔形的大圆锥花序；花两性。胞果扁球形；种子横生，扁球形，黑或红褐色。

性味归经：辛、苦，温。归肺、肾经。

功能主治：清热解毒。蒙古族民间入药治疗感冒、头痛、麻疹不透、金伤、皮肤瘙痒。

用法用量：15 ~ 30克，水煎服。外用水煎洗。



生境：农田、渠边及路旁。

科：藜科	种： <i>Spinacia oleracea</i> Mill.	药名：菠菜	别名：菠陵、菠陵菜、红根菜
------	-----------------------------------	-------	---------------

菠菜

药用部位：带根全草。

植物特征：一年生或二年生栽培蔬菜作物。茎直立，中空。叶互生，戟形或三角状卵形，基部戟形或箭形。花雌雄异株；雄花序穗状；雄花花被片4，黄绿色，雄蕊4；雌花簇生叶腋，无花被，子房生于2枚合生小苞片内，1室，1胚珠。胞果扁圆形，苞片在果时变成刺状。

性味归经：甘、辛，凉。归肠、胃经。

功能主治：补血止血，利五脏，通血脉，止渴润肠，滋阴平肝，助消化。主治高血压、头痛、目眩、风火赤眼、糖尿病、便秘。

用法用量：50 ~ 250克，水煎服。



生境：常见栽培。

科：藜科	种： <i>Suaeda heteroptera</i> Kitag.	药名：碱蓬	别名：盐蓬、黄蓍菜、黄须菜
------	-------------------------------------	-------	---------------

翅碱蓬

药用部位：全草。

植物特征：一年生草本。绿色，晚秋变红紫色。叶条形，半圆柱形，肉质，先端尖或钝，无柄。花两性或兼有雌性，3 ~ 5朵簇生于叶腋。胞果包于花被内，成熟时果皮开裂；种子横生，卵形或近圆形，两面稍压扁，黑色，表面有光，几无点纹。

性味归经：酸，寒。归肾经。

功能主治：清热，消积。治瘰疬、腹胀。

用法用量：6 ~ 9克，水煎服。

生境：盐碱荒地。



科：藜科	种： <i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad.	药名：地肤子	别名：地麦、落帚、扫帚苗、扫帚菜
------	--	--------	------------------

地肤

药用部位：种子。


植物特征：一年生草本。茎直立，多分枝；分枝与小枝散射或斜升，淡绿色或浅红色，幼时有软毛，后变光滑。叶片线形或披针形，两端均渐狭细，全缘，无毛或有短柔毛；无柄。花1 ~ 2朵生于叶腋；花被5裂，下部联合，结果后，背部各生一横翅。胞果扁球形，包于草质花被内。

性味归经：辛、苦，寒。归肾、膀胱经。

功能主治：清热利湿，祛风止痒。用于小便涩痛、阴痒带下、风疹、湿疹、皮肤瘙痒。

用法用量：10 ~ 25克，水煎服，或入丸、散。外用适量煎水洗。

生境：荒野、宅边、路旁，也有栽培。



科：苋科

种： *Amaranthus viridis* L.

药名：皱果苋

别名：野苋菜、白苋

皱果苋

圆锥花序
有分枝**药用部位：**全草。

植物特征：一年生草本。全体无毛。茎直立，有不显明棱角，稍有分枝，绿色或带紫色。叶卵形、卵状长圆形或卵状椭圆形，先端常凹缺，少数圆钝，有1短尖头。圆锥花序顶生，有分枝，顶生花穗比侧生者长。胞果扁球形，绿色。

性味归经：甘、淡，凉。归肾、肺经。

功能主治：清热，解毒。治疮肿、牙疳、虫咬。

用法用量：25 ~ 100克，水煎服。外用适量捣敷患处。

生境：旷野、荒地、河岸、山坡，或为田园杂草。

科：苋科

种： *Amaranthus retroflexus* L.

药名：西风谷

别名：苋菜、野苋菜

反枝苋

多数穗状花序
组成圆锥花序**药用部位：**全草。

植物特征：一年生草本。茎直立，粗壮，淡绿色，有时具紫色条纹，稍具钝棱，密生短柔毛。叶片菱状卵形或椭圆状卵形，先端锐尖或尖凹，有小凸尖，基部楔形，有柔毛。圆锥花序顶生及腋生，直立，由多数穗状花序形成，苞片及小苞片钻形，白色；花被片白色。胞果扁卵形，环状横裂，包裹在宿存花被片内。种子近球形，棕色或黑色。

性味归经：甘，平。归肺、大肠经。

功能主治：清热，利湿，解毒，消肿。治痢疾、便血、白带、瘰癧、痔疮、喉痛。

用法用量：10 ~ 15克，水煎服。

先端锐尖

叶片菱
状卵形

生境：山坡、路旁、旷野、荒地、田边、沟旁、河岸等处。

科：苋科	种： <i>Amaranthus tricolor</i> L.	药名：苋菜	别名：雁来红、老来少
------	----------------------------------	-------	------------

苋

药用部位：全草。

植物特征：一年生草本。茎直立，常分枝。叶互生，菱状卵形，或披针形，先端圆或凹，具凸尖，基部楔形；全缘或微波状。花密集成球形花簇，腋生或顶生成断续状穗状花序。花被片3，长圆形，有芒尖；雄蕊3，柱头3。胞果卵状长圆形，盖裂；种子圆形。

性味归经：甘，平。归肝、大肠经。

功能主治：清热，利湿，解毒，消肿。用于肠炎、痢疾、咽炎、乳腺炎、痔疮肿痛出血。

用法用量：20 ~ 50克。水煎服。



生境：常见栽培。

科：苋科	种： <i>Amaranthus ascendens</i> Loisel	药名：绿苋	别名：野苋菜
------	---------------------------------------	-------	--------

凹头苋

药用部位：全草。

植物特征：一年生草本。全株无毛，茎自基部分枝，平卧而上升。叶互生，具长柄；叶片卵形或菱状卵形，顶端钝圆而有凹缺。花簇腋生于枝之上部，穗状花序或圆锥花序；苞片干膜质；花被片3，膜质。胞果卵形，略扁，略皱缩近平滑。种子倒卵形至圆形，黑褐色，有光泽。

性味归经：甘、淡，凉。归肝、大肠经。

功能主治：清热利湿。治肠炎、痢疾、咽炎、乳腺炎、痔疮肿痛出血、毒蛇咬伤。

用法用量：6 ~ 12克，水煎服。外用适量捣敷患处。



生境：田野路旁。

科：苋科	种： <i>Amaranthus caudatus</i> L.	药名：尾穗苋	别名：老枪谷、老仓谷、仙人谷
------	----------------------------------	--------	----------------

尾穗苋

药用部位：种子。

植物特征：一年生草本。叶片卵形或菱状披针形，顶端短渐尖或圆钝，具芒尖，基部楔形，稍不对称，全缘或波状缘，两面无毛，具长柄。圆锥花序顶生或腋生，常下垂，由多数穗状花序形成。花密集成团。胞果近球形，种子近球形，具光泽。

性味归经：甘、淡，平。归脾、肺经。

功能主治：清热、利湿、解毒、消积。民间多用于治疗小儿疳积。

用法用量：10 ~ 20克，水煎服。



生境：田野路边。

科：商陆科	种： <i>Phytolacca Americana</i> L.	药名：商陆	别名：美洲商陆
-------	-----------------------------------	-------	---------

垂序商陆

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。叶互生，卵圆形或椭圆形。总状花序顶生或与叶对生；花被片5，卵形。果穗直立，分果浆果状，扁球形，紫黑色，具宿存花被。

性味归经：苦，寒，有毒。归脾、膀胱、小肠经。

功能主治：通二便，泻水，散结。治水肿、胀满、脚气、喉痹、痈肿、恶疮。



用法用量：5 ~ 15克，水煎服，或入散剂。外用适量捣敷患处。

使用注意：脾虚水肿及孕妇忌服。

生境：水边、林下、路旁、田野。

科：番杏科	种： <i>Tetragonia expansa</i> Murr	药名：番杏	别名：法国菠菜
-------	-----------------------------------	-------	---------



番杏

药用部位：地上部分全草。

植物特征：多年生草本。茎叶多带肉质，茎为圆形、半蔓生，初期直立型生长，后期匍匐生长，分枝力强，每个叶腋中都能长出侧枝。叶有柄，质厚而软，叶片互生，形状略似三角形，全缘，叶片肥厚，深绿色。种子黑褐色，表面有棱，在棱的顶端长有细刺。


性味归经：甘、涩，平。归肾经。

功能主治：凉血解毒，利尿，消肿止痛。主治皮肤红肿、小便不利。

用法用量：鲜品50 ~ 100克，水煎服。外用鲜全草取汁外涂，或捣烂外敷。

生境：海边沙地， 常见栽培。

科：石竹科	种： <i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	药名：蚤缀	别名：无心菜
-------	-------------------------------------	-------	--------



蚤缀

药用部位：全草。

植物特征：一年或二年生小草本。全株有白色短柔毛。茎丛生。叶小，圆卵形，两面疏生柔毛，无柄。聚伞花序疏生枝端；苞片和小苞片叶质，卵形，密生柔毛；花瓣倒卵形，白色，全缘；雄蕊10；花柱3。果卵形，6瓣裂；种子肾形，淡褐色，密生小疣状突起。

性味归经：苦，寒。归肺经。

功能主治：退热，止咳。治肺炎及各种肺病。

用法用量：3 ~ 6克，水煎服。

生境：路旁、荒地及田野中。

科：石竹科	种： <i>Arenaria juncea</i> M.Bieb.	药名：山银柴胡	别名：小无心菜
-------	-----------------------------------	---------	---------

灯心草蚤缀

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。茎直立丛生，基生叶线形，较硬。圆锥状聚伞花序疏散，花小，白色，有浓香；花梗柔细，为萼长的2 ~ 3倍。

性味归经：甘，微寒。归肺、肝、胆、肾、胃经。

功能主治：凉血，清虚热。治阴虚肺劳、骨蒸潮热、盗汗、小儿疳热、久疟不止。

用法用量：3 ~ 9克，水煎服。

使用注意：气虚泄泻、血虚发热者忌用。



生境：1600米以上的高山草甸。

科：石竹科	种： <i>Pseudostellaria heterantha</i> (Maxim.) Pax.	药名：小太子参	别名：异花太子参
-------	--	---------	----------

异花假繁缕

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。块根单生，纺锤形，有分枝细根。近基部的叶倒披针形，中部以上的叶卵状矩圆形。花二型：普通花在枝端或二分枝叉间单生，花瓣5，矩圆状倒披针形；闭锁花小，生于近茎基部叶腋，有较短花梗；萼片4，无花瓣。蒴果4瓣裂，种子肾形，稍扁，有瘤状突起。

性味归经：甘、微苦，微温。归心、脾、肺经。

功能主治：补益脾肺，益气生津。治肺虚咳嗽、脾虚食少、心悸、怔忡、水肿、消渴、精神疲乏。

用法用量：3 ~ 9克，水煎服。



生境：林下草地。

科：石竹科	种： <i>Pseudostellaria heterophylla</i> (Miq) Pax ex Pax et Hoffm	药名：太子参	别名：童参、四叶参、 四叶菜、米参
-------	---	--------	----------------------

异叶假繁缕

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。块根长纺锤形。叶对生，下部叶匙形或倒披针形。上部叶卵状披针形至长卵形，茎端的叶常4枚相集较大，边缘略呈波状。花二型：闭锁花生茎下部叶腋，小形，无花瓣。普通花1 ~ 3朵顶生，白色，花瓣5，倒卵形。蒴果。

性味归经：甘、微苦，微温。归心、脾、肺经。

功能主治：补益脾肺，益气生津。治肺虚咳嗽、脾虚食少、心悸、怔忡、水肿、消渴、精神疲乏。

用法用量：10 ~ 30克，水煎服。

使用注意：表实邪盛者不宜用。



生境：林下草地。

科：石竹科	种： <i>Malachium aquaticum</i> (L.) Fries.	药名：牛繁缕	别名：鹅儿肠、鹅肠菜
-------	---	--------	------------

牛繁缕

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。茎多分枝。单叶对生，膜质，卵形或宽卵形。花顶生枝端或单生叶腋；花梗细长，有毛；花瓣5，白色，顶端2深裂达基部。蒴果5瓣裂，每瓣顶端再2裂。种子近圆形，褐色，有显著突起。

性味归经：甘、淡，平。归肺、肾经。

功能主治：清热解毒，活血消肿。治肺炎、痢疾、高血压、月经不调、痈疽痔疮。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服。



生境：田间、路旁草地、山野或阴湿处。

科：石竹科	种： <i>Cerastium caespitosum</i> Gilib.	药名：卷耳	别名：鼠耳草
-------	--	-------	--------

簇生卷耳

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。全体具灰黄色短柔毛。茎直立，带紫红色。叶对生，基部叶匙形；中上部叶狭卵形至披针形，全缘。二歧聚伞花序顶生，花两性，萼片5，披针形，绿色；花瓣5，白色。蒴果长管形，种子褐色，有瘤状突起。

性味归经：苦，微寒。归肝、肺经。

功能主治：清热解毒，消肿止痛。
主治感冒、乳痈初起、疔疽肿痛。

用法用量：25 ~ 50克，水煎服。外用适量，鲜全草捣烂敷患处。



生境：山地林缘、田野路边及山坡草丛中。

科：石竹科	种： <i>Stellaria dichotoma</i> L.	药名：叉歧繁缕	别名：银柴胡
-------	----------------------------------	---------	--------

叉歧繁缕

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。主根粗壮，圆柱形，有许多分枝细根。茎簇生，数回羽状分枝，有腺毛。叶卵形、卵状矩圆形或卵状披针形，两面密被腺状毛，叶片灰绿色。聚伞花序有多数花，花瓣5，白色，矩圆形。种子卵形，微扁。



性味归经：甘，微寒，归肝、肾、心包经。

功能主治：清热凉血。治结核发热、久疟发热、盗汗骨蒸。

用法用量：10 ~ 20克，水煎服。



生境：干草原或石缝中。

科：石竹科	种： <i>Stellaria discolor</i> Turcz.	药名：繁缕	别名：翻白繁缕
-------	-------------------------------------	-------	---------

异色繁缕

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。全株无毛。根茎细弱，分枝，节上具鳞叶。茎上升，分枝，无毛，四棱形。叶片披针形。聚伞花序顶生或腋生，花瓣5，白色，2深裂几达基部。蒴果稍短于或近等长于宿存萼，6齿裂。种子卵形，稍扁，褐色，具成行的瘤状凸起。



性味归经：甘、酸，凉。归肝、肾、肺经。

功能主治：清热解毒，化淤止痛，催乳。用于肠炎、痢疾、肝炎、阑尾炎、产后淤血腹痛、子宫收缩痛、牙痛、头发早白、乳汁不下、乳腺炎、跌打损伤、疮疡肿毒。

用法用量：25 ~ 50克，水煎服。外用适量，鲜草捣烂敷患处。

生境：林地草地。

科：石竹科	种： <i>Sagina japonica</i> (Sweet) Ohwi	药名：漆姑草	别名：羊儿草、地松、星秀草、珍珠草
-------	--	--------	-------------------

漆姑草

药用部位：全草。

植物特征：一年生或二年生小草本。茎丛生，自基部分枝，枝下端平卧。叶对生，线形，先端锐尖，基部膜质，联合而成短鞘。花白色，单生枝顶或叶腋，萼片与花瓣均为5片，雄蕊5枚，子房上位，5室。蒴果广卵形。



性味归经：苦、辛，凉。归肺、肾经。

功能主治：散结消肿，解毒止痒。用于白血病、漆疮、痈肿、淋巴结结核、龋齿痛。

用法用量：25 ~ 50克，水煎服。外用适量，鲜草捣烂敷患处。

生境：山坡草丛、荒山草地、溪边湿地，村落、城镇庭园中也有生长。

科：石竹科

种： *Lychnis cognata* Maxim.

药名：剪秋罗

剪秋罗

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。全株密生细毛，茎直立。叶对生，卵状披针形或卵状椭圆形，基部叶有短柄，两面有细毛，边缘有密齿。花1~3朵，花瓣5，深红色，顶端不整齐深裂。蒴果长棒形，5齿裂；种子细小，肾形，黑褐色。

性味归经：甘，寒。归肺经。

功能主治：清热，止痛，止泻。用于感冒、风湿性关节炎、腹泻；外用治带状疱疹。

用法用量：根15~25克，全草25~50克，水煎服。外用取根适量研末敷患处。

花瓣深红色

叶卵状披针形

叶对生

花序

生境：山坡林下。

科：石竹科

种： *Lychnis fulgens* Maxim.

药名：剪秋罗

别名：剪秋罗

大花剪秋罗

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。全株被较长柔毛。茎直立，单一或上端稍分枝。全株被较长的柔毛。叶对生，无柄，叶卵状长圆形或卵状披针形。花瓣5，深鲜红色，先端2深裂。顶端略具细齿。蒴果长卵形，顶端5齿裂。

性味归经：甘，寒。归肺、大肠经。

功能主治：清热，止痛，止泻。用于感冒初期。

用法用量：25~50克，水煎服。

生境：400~2000米的林下、林缘灌丛间及阴湿沟边。

花瓣深裂

科：石竹科	种： <i>Silene fortunei</i> Vis.	药名： 蝇子草	别名： 土桔梗、脱力草
-------	--------------------------------	---------	-------------



蝇子草

药用部位：全草。

植物特征：一年生或多年生草本。基生叶匙状披针形，茎上部叶披针形，先端尖或锐尖。花单生或排成聚伞花序，白色、红色或粉红色；花瓣5，全缘、2裂或丝裂，有狭柄。蒴果顶部3或6齿裂；种子肾形，具小疣突。

性味归经：辛、涩，凉。归肝、大肠经。

功能主治：清热利湿，解毒消肿。用于痢疾、肠炎；外用治蝮蛇咬伤、扭挫伤、关节肌肉酸痛。

用法用量：25 ~ 50克，水煎服。外用适量，鲜品捣烂敷患处或浸酒搽患处。

生境：林下草地。



科：石竹科	种： <i>Silene tatarinowii</i> Regel	药名： 石生蝇子草	别名： 鹅耳七、山女娄菜
-------	------------------------------------	-----------	--------------



石生蝇子草

药用部位：根。

植物特征：草本。茎有分枝，匍匐或斜向上。叶对生，卵状长圆形至长圆状披针形，淡绿色，具3脉。二歧聚伞花序顶生，具3 ~ 7花，花瓣粉红色或白色，长圆形，先端4裂，二侧裂片较小。蒴果长卵形，熟时3瓣裂，裂瓣又2裂；种子少数。

性味归经：甘，凉。归心、肺、脾经。

功能主治：清热凉血，补虚安神。用于温热病热入营血、身热口干、舌绛或红等症，心神不安、失眠多梦、惊悸健忘者。

用法用量：6 ~ 9克，水煎服。

生境：山坡、山坡草地。



科：石竹科

种： *Silene conoidea* L.

药名：麦瓶草

别名：净瓶、米瓦罐、香炉草、梅花瓶

麦瓶草

药用部位：全草或嫩茎叶。

植物特征：一年生草本。全株有腺毛，节部膨大，株高30 ~ 60厘米。叶对生，披针形，基部联合。聚伞花序顶生，花两性，萼片合生成圆锥形，绿色，花瓣5。蒴果。

性味归经：淡、微苦，凉。归心、肺、肝经。

功能主治：清热凉血、止血调经。用于鼻出血、吐血、尿血、肺脓疡、月经不调。

用法用量：20 ~ 25克，水煎服。



生境：田野、路旁。

科：石竹科

种： *Cucubalus baccifer* L.

药名：狗筋蔓

别名：大种鹅儿肠、白牛膝

狗筋蔓

药用部位：根。


植物特征：多年生草本。叶卵状披针形。花1 ~ 3朵聚生或单生于分枝的叉上；萼阔钟形，5齿裂，10脉；花瓣5。果球形。

性味归经：甘、淡，温。归肾、肺经。

功能主治：接骨生肌，散瘀止痛，

祛风除湿，利尿消肿。用于骨折、跌打损伤、风湿关节痛、小儿疳积、肾炎水肿、泌尿系感染、肺结核；外用治疮疡疔肿、淋巴结结核。

用法用量：15 ~ 25克，水煎服。外用适量，鲜品捣烂敷患处。



生境：山坡林下。

科：石竹科	种： <i>Dianthus superbus</i> L.	药名：瞿麦	别名：棍茶
-------	--------------------------------	-------	-------

瞿麦

药用部位：地上部分。

植物特征：多年生草本。茎圆柱形，上部有分枝，表面淡绿色或黄绿色，光滑无毛，节明显，略膨大，断面中空。叶对生，多皱缩，展平叶片呈条形至条状披针形。枝端具花及果实，花萼筒状，宽卵形，花瓣卷曲，先端深裂成丝状。蒴果长筒形，种子细小，多数。

性味归经：苦，寒。归心、小肠经。

功能主治：利尿通淋，破血通经。用于热淋、血淋、石淋、小便不通、淋沥涩痛、月经闭止。

用法用量：9 ~ 15克，水煎服。



生境：高山草地。

科：石竹科	种： <i>Silene jensisensis</i> Willd.	药名：女娄	别名：山蚂蚱
-------	-------------------------------------	-------	--------

旱麦瓶草

药用部位：地上部分。

植物特征：多年生草本。直根粗长，黄褐色。茎直立或斜升，无毛或基部被短糙毛。基生叶多数，叶片披针状条形，两面无毛或疏被短毛；茎生叶与基生叶相似而较小。聚伞圆锥花序顶生或腋生，花瓣5，白色，瓣片2中裂。蒴果宽卵形，包于萼内；种子圆肾形，表面具条状细微突起。

性味归经：甘、苦，凉。归肝、肾、肺经。

功能主治：清热凉血。治阴虚血热、虚劳骨蒸、阴虚久疟、小儿疳热、盗汗、羸瘦。

用法用量：9 ~ 15克，水煎服。



生境：高山草地中。

科：睡莲科	种： <i>Nelumbo nucifera</i> L.	药名：荷叶、藕节、莲心	别名：荷
-------	-------------------------------	-------------	------

莲


药用部位：叶、根茎、莲心。

植物特征：多年生水生草本。根茎（藕）肥大多节。叶盾状圆形，表面深绿色，被蜡质白粉背面灰绿色，全缘并呈波状。叶柄圆柱形，密生倒刺。花单生于花梗顶端、高托水面之上，有单瓣、复瓣、重瓣及重台等花型；花色有白、粉、深红、淡紫色或间色等变化；雄蕊多数；雌蕊离生，埋藏于倒圆锥状海绵质花托内，花托表面具多数散生蜂窝状孔洞，受精后逐渐膨大称为莲蓬，每一孔洞内生一小坚果（莲子）。

性味归经：① 荷叶：苦涩，平。归心、肝、肺经。
② 藕节：甘、涩，平。归肝、肺、胃经。 莲心：苦，寒。归心、肾经。


功能主治：① 荷叶：清热解暑，升发清阳，凉血止血。用于暑热烦渴、暑湿泄泻、脾虚泄泻、血热吐血衄血崩漏。荷叶炭收涩化淤止血。用于多种出血症及产后血晕。② 藕节：止血，散瘀。治咳血、吐血、衄血、尿血、便血、血痢、血崩。 莲心：清心火，平肝火，止血，固精。用于心经火盛诸症。

用法用量：① 荷叶：3 ~ 9克（鲜品15 ~ 30克），水煎服。② 藕节：15 ~ 25克，捣汁或入散剂。③ 莲心：3 ~ 15克，水煎服。



生境：静水池沼中。

科：睡莲科	种： <i>Euryale ferox</i> Salisb.	药名：芡实	别名：鸡头米、鸡头苞、鸡头莲、刺莲藕
-------	---------------------------------	-------	--------------------



芡实

药用部位：种子。

植物特征：水生草本。根须壮，白色。根状茎短缩，叶从短缩茎上抽出，初生叶箭形，过度叶盾状，定形叶圆形，叶面绿色，皱缩，光亮，网状叶脉隆起，形似蜂巢。花单生，蓝紫色，萼4片，披针形，绿色，刺密聚。雄蕊多数，花药内向，外层雄蕊逐渐变瓣。浆果球形。




性味归经：甘、涩，平。归脾、肾经。

功能主治：益肾固精，健脾止泻，除湿止带。用于梦遗滑精、遗尿尿频、脾虚久泻、白浊、带下。

用法用量：15 ~ 30克，水煎服，或入丸、散，亦可适量煮粥食。

使用注意：食滞不化者慎服，大小便不利者禁服。



生境：静水池沼中。

科：睡莲科	种： <i>Nymphaea tetragona</i> George.	药名：睡莲	别名：子午莲、水芹花
-------	--------------------------------------	-------	------------

睡莲


药用部位：根状茎。

植物特征：多年生水生花卉。根状茎粗短。叶丛生，具细长叶柄，浮于水面，纸质或近革质，近圆形或卵状椭圆形，全缘，无毛，上面浓绿，幼叶有褐色斑纹，下面暗紫色。花单生于细长的花柄顶端，漂浮于水。萼片4枚，宽披针形或窄卵形。聚合果球形，内含多数椭圆形黑色小坚果。

性味归经：甘、平，无毒。归肺、心经。

功能主治：消暑，清肺，安心神，解酒毒。主治肺热咳嗽、心绪烦乱、酒精中毒。

用法用量：9 ~ 15克（鲜品加倍），水煎服。



生境：静水池沼中，多见栽培。

科：睡莲科	种： <i>Nuphar pumilum</i> (Timm.) DC.	药名：萍蓬子	别名：水栗包
-------	--------------------------------------	--------	--------

萍蓬草

药用部位：种子。

植物特征：多年生水生草本。叶漂浮，阔卵状，基部深心形，上面亮绿色，下面紫红色，密生细毛，侧脉羽状；叶柄有细毛；生于水中的叶，质略柔薄。花单生于花梗顶端，漂浮水面，大而色黄，花瓣小，多数，楔状矩圆形，顶端截形或微凹。浆果卵形，基部窄狭；具宿存萼片和柱头。种子多数，粟米状，革质，假种皮肉质。

性味归经：甘、涩，平。归脾、胃、肾经。

功能主治：滋养强壮，健胃，调经。治体虚衰弱、消化不良、月经不调。

用法用量：
15 ~ 25 克，
水煎服。



生境：池沼、河流等浅水中。

科：金鱼藻科	种： <i>Ceratophyllum demersum</i> L.	药名：金鱼藻	别名：松藻
--------	-------------------------------------	--------	-------

金鱼藻

药用部位：全草。

植物特征：沉水性多年生水草。全株深绿色。茎细长，平滑，疏生短枝。叶轮生，开展，通常为1回二叉状分歧，有时为2回二叉状分歧，裂片丝状线形或线形，稍脆硬，先端具2个短刺尖，边缘散生刺伏细齿。花小，单性，1 ~ 3朵单生于节部叶腋。坚果椭圆状卵形或椭圆形，略扁平。

性味归经：淡，凉。归肝、肾经。

功能主治：止血。用于吐血。

用法用量：5 ~ 10克，研粉吞服。



生境：淡水池塘、水沟、稳水小河、温泉流水及水库中。

科：连香树科	种： <i>Cercidiphyllum japonicum</i> Sieb. Et Zucc.	药名：连香树果	别名：五君树、山白果
--------	---	---------	------------

连香树

药用部位：果实。

植物特征：落叶乔木。树皮灰色，纵裂，小枝无毛，有长枝和锯状短枝。叶在长枝上对生，在短枝上单生，近圆形或宽卵形，先端圆或锐尖，边缘具圆钝锯齿，齿端具腺体。花雌雄异株，先叶开放或与叶同放，腋生，无花瓣；雄花常4朵簇生，雌花具梗，心皮2 ~ 6，分离，胚珠多数，排成2列。蓇葖果熟时紫褐色，种子卵圆形，顶端有长圆形透明翅。

性味归经：苦、平。归肝经。

功能主治：熄风止惊。治惊风抽搐。

用法用量：30克，水煎服。



生境：避风、空气湿润的山谷、山麓林缘。

科：毛茛科	种： <i>Paeonia suffruticosa</i> Sndr	药名：牡丹皮	别名：丹皮、粉丹皮、木芍药、洛阳花
-------	-------------------------------------	--------	-------------------

牡丹

药用部位：根皮。

植物特征：落叶灌木。2回3出复叶，侧生小叶较小，斜卵形。花单生枝顶，花瓣5，或重瓣，白色、红紫色或黄色。蓇葖果卵形。

性味归经：苦、辛，寒。归心、肝、肾经。

功能主治：清热凉血，活血行瘀。用于温毒发斑、便血、骨蒸劳热、经闭痛经、痈肿疮毒、跌扑伤痛。

用法用量：10 ~ 30克，水煎服。

使用注意：血虚有寒，月经过多者及孕妇不宜用。



生境：常见栽培。

科：毛茛科	种： <i>Paeonia Lactiflora</i> (<i>P. albiflora</i>)	药名：白芍	别名：将离、离草、婪尾春、余容、犁食、没骨花、黑牵夷、红药
-------	---	-------	-------------------------------



花大

芍药

药用部位：根皮。

植物特征：多年生宿根草本。具纺锤形的块根。初出叶红色，茎基部常有鳞片状变形叶，中部复叶2回3出，小叶矩形或披针形，枝梢的渐小或成单叶。花大，芳香，单生枝顶；花瓣白、粉、红、紫或红色。

性味归经：苦、酸，凉。归肝、脾经。

功能主治：养血柔肝，缓中止痛，敛阴收汗。治胸腹胁肋疼痛、泻痢腹痛、自汗盗汗、阴虚发热、月经不调、崩漏、带下。

用法用量：10 ~ 20克，水煎服，或入丸、散。

使用注意：虚寒腹痛泄泻者慎服。



生境：常见栽培。

科：毛茛科	种： <i>Trollius chinenses Maxim</i>	药名：金莲花	别名：旱金莲、金梅草
-------	------------------------------------	--------	------------

金莲花

药用部位：花。

植物特征：多年生草本。基生叶具长柄，叶片五角形，3全裂，2回裂片有少数小裂片和锐齿。花单生或2朵或3朵成聚伞花序，萼片8枚~ 19枚，黄色，椭圆状倒卵形或倒卵形，花瓣与萼片等长，狭条形。

性味归经：苦，寒，无毒。归心经。

功能主治：清热解毒。用于咽喉肿痛、口疮、疗毒、淋巴炎。

用法用量：5 ~ 10克，水煎服，或入丸、散。外用煎水含漱。



生境：高山草甸中。

科：毛茛科	种： <i>Helleborus thibetanus</i> Franch.	药名：铁筷子	别名：黑毛七、 小山桃儿七
-------	---	--------	------------------

铁筷子

药用部位：块根。

植物特征：多年生草本。根茎有多数暗褐色须根。基生叶1 ~ 2枚，叶片鸟足状分裂，裂片长圆形或宽披针形，上部边缘有齿；茎生叶较小，3全裂。花单生，粉红色。蓇葖果扁，开裂，有多数种子。

性味归经：苦，凉，有小毒。归肝、肺、胃经。

功能主治：祛风理气，活血解毒。治

哮喘、劳伤咳嗽、胃痛、腹痛、风湿痹痛、疔疮、跌打创伤。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服，或浸酒、入散剂。外用研末撒。

使用注意：孕妇忌服。



生境：山坡林下。

科：毛茛科	种： <i>Souliea vaginata</i> (Maxim.) franch	药名：黄三七	别名：土黄连、太白黄连
-------	--	--------	-------------

长果升麻

药用部位：根茎或全草。

植物特征：多年生草本。根状茎粗壮，分枝，须根多数。叶通常为2回3出复叶；叶片三角形，指片具长柄，3回裂片近羽状细裂，小裂片卵形至披针形，疏生锯齿。总状花序具4 ~ 6花，花先叶开放，白色，倒卵形；花瓣5，小，宽卵形或扇形。蓇葖果条形。

性味归经：苦，凉。归心、脾、胃、肝、胆、大肠经。

功能主治：泻火燥湿，清心除烦，抗菌消炎，健胃。治咽炎、结膜炎、口腔炎、骨蒸潮热。

用法用量：10 ~ 15克，水煎服。



生境：高山坡地。

科：毛茛科

种： *Cimicifuga goetida* L.

药名：升麻

别名：龙眼根、窟窿牙根

升麻

药用部位：块茎。

植物特征：多年生草本。下部叶具有长柄，叶片三角形或菱形，2 ~ 3回3出羽状全裂；茎上部叶较小，常1 ~ 2回3出或羽状全裂。圆锥花序，花两性，白色或绿白色。蓇葖果长圆形。

性味归经：辛、微甘，微寒。归肺、脾、胃、大肠经。

功能主治：发表透疹，清热解毒，升阳气。治风热头痛、齿痛、口疮、咽喉肿痛、麻疹不透、脱肛、子宫脱垂。

用法用量：3 ~ 9克，水煎或入丸、散。

生境：山地林缘、林中或路旁草丛中。

科：毛茛科

种： *Cimicifuga simplex* Wormsk.

药名：野升麻

别名：野菜升麻、大叶毛狼

单穗升麻

药用部位：根状茎。

植物特征：多年生草本。根状茎横走，粗壮。茎直立。2至3回3出羽状复叶互生，下部叶较大。茎上部叶柄较短；小叶片椭圆状卵形或狭卵形、披针形，边缘2 ~ 3深裂，裂片有缺刻和不整齐的锐锯齿。花序顶生和腋生，通常单穗，花杂性，白色。蓇葖果。

性味归经：甘、辛、微苦，微寒。归肺、脾、大肠经。

功能主治：发表透疹，清热解毒，升举清阳。治风热感冒、小儿麻疹、热毒斑疹、咽喉肿痛、痈肿疮疡、阳明头痛、久泄脱肛、崩漏。

用法用量：3 ~ 9克，水煎服。

生境：高山林下、阴湿草丛中或林缘溪沟旁。

羽状复叶

花序顶生

科：毛茛科	种： <i>Coptis chinensis</i> Franch.	药名：黄连	别名：黄莲
-------	------------------------------------	-------	-------

黄连

药用部位：根茎。

植物特征：多年生草本。叶基生，坚纸质，卵状三角形，3全裂。聚伞花序顶生，花瓣倒披针形，中央有蜜槽。

性味归经：苦，寒。归心、脾、胃、肝、胆、大肠经。

功能主治：清热燥湿，泻水解毒。用于湿热痞满、呕吐、泻痢、黄疸、高热神昏、心烦不寐、血热吐衄、牙痛、痈肿疮疔。

用法用量：2 ~ 5克，水煎服。

使用注意：本品大苦大寒，过服久服易伤脾胃，脾胃虚寒者忌用。



生境：海拔1000 ~ 1900米的山谷凉湿荫蔽密林中。

科：毛茛科	种： <i>Semianguilegia adoxoides</i> (DC.) Makino	药名：天葵	别名：夏无踪、小乌头
-------	---	-------	------------

天葵

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。茎细弱，疏生短柔毛，有分枝。基生叶为3出复叶；小叶片扇状菱形或倒卵状菱形，常深3裂或近全裂，裂片顶端有缺刻状的齿。花小，萼片白色，带淡紫色，狭椭圆形，花瓣淡黄色，比萼片短，下部管状，基部有距。蓇葖果长5 ~ 7毫米。

性味归经：甘，寒。归肾经。

功能主治：消肿，解毒，利水。治癰痈、疝气、小便不利、肿毒、蛇咬伤、尿路结石。

用法用量：15 ~ 25克，水煎服。外用适量捣敷患处。



生境：山坡林下阴湿处。

科：毛茛科 种： *Aquilegia yabeana* Kitag. 药名：华北耧斗菜 别名：五铃花、紫霞耧斗

华北耧斗菜


药用部位：根。

植物特征：多年生草本。疏被短柔毛。基生叶具长柄，1 ~ 2回3出复叶，叶宽大，菱状倒卵形或宽卵形，茎生叶较小。花下垂，萼片紫色，狭卵形。花瓣和萼片同色，顶端圆截形，花药黄色，内轮雄蕊退化，白色，膜质。

性味归经：甘，平。归肝、肺经。

功能主治：平肝降燥，清肺润肠。主治肺热咳嗽、大便燥结。

用法用量：10 ~ 15克，水煎服。



生境：山地草坡、林边，或山沟湿润处。

科：毛茛科 种： *Thalictrum petaloideum* L. 药名：马尾连 别名：马尾黄连、肾叶唐松草

瓣蕊唐松草

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。无毛。3 ~ 4回3出复叶，互生；小叶倒卵形、近圆形或菱形，3浅裂至深裂，裂片卵形或

倒卵形，全缘。伞房状聚伞花序，萼片4，白色，无花瓣。瘦果卵球形。

性味归经：苦，寒。归大肠、心经。

功能主治：清热解毒，燥湿。治痢疾、痈肿疮疖、渗出性皮炎。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服。外用研末撒或调敷。



生境：海拔300 ~ 2500米的山地草坡向阳处。

科：毛茛科	种： <i>Thalictrum baicalense</i> Turcz.	药名：马尾莲	别名：马尾黄连
-------	--	--------	---------

贝加尔唐松草

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。无毛，根茎短，须根丛生。3回3出复叶；小叶宽倒卵形、宽菱形，有时宽心形，3浅裂，裂片具粗牙齿，脉下面隆起；叶轴基部扩大呈耳状，抱茎，膜质，边缘分裂呈罐状。复单歧聚伞花序近圆锥状，萼片椭圆形或卵形，无花瓣；雄蕊10 ~ 20，花丝倒披针状条形。瘦果圆球状倒卵形。

性味归经：苦，寒。归心、脾、胃、肝、胆、大肠经。

功能主治：清热燥湿，泻火解毒。用于肠炎、痢疾、黄疸、目赤肿痛。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服。外用适量，煎水洗患处。



生境：山区林下。

科：毛茛科	种： <i>Aconitum sinomontanum</i> Nakai	药名：麻布七	别名：麻布芪、穿心莲
-------	---------------------------------------	--------	------------

高乌头

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。根粗壮，圆柱形，黑褐色。基生叶1，茎生叶3 ~ 4，外廓肾形、肾状半圆形。总状花序着生于茎端及上部叶腋，小苞片线形，着生于花梗中部；花蓝紫色或淡紫色。蓇葖果无毛。



性味归经：苦、辛、咸，温。有毒。归心、肾、脾经。

功能主治：祛风除湿，散瘀止痛。用于风湿腰腿痛，胃气痛，跌打损伤。

用法用量：5 ~ 10克，水煎或泡酒服。外用适量，捣烂敷患处。

使用注意：本品有毒，孕妇忌服。



生境：高山草地中。

科：毛茛科	种： <i>Aconitum kusnezoffii</i> Reichb.	药名：附子	别名：草乌
-------	--	-------	-------



北乌头

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。块根圆锥形或胡萝卜形。叶片纸质或近革质，五角形，3全裂。顶生总状花序具9 ~ 22朵花，萼片紫蓝色；花瓣向后弯曲或近拳卷。蓇葖果直。

性味归经：辛、甘，大热，有毒。归心、肾、脾经。

功能主治：回阳救逆，补火助阳，散寒止痛。用于亡阳虚脱、肢冷脉微、阳痿、宫冷、心腹冷痛、虚寒吐泻、阴寒水肿、阳虚外感、寒湿痹痛、阴疽疮疡。

用法用量：内服3 ~ 15克，入丸、散或水煎服。

使用注意：孕妇禁用。

生境：山坡、草甸或疏林中。

科：毛茛科	种： <i>Aconitum coreanum</i> (Levl.) Rapaics	药名：关白附	别名：关附子、白附子、牛扁
-------	---	--------	---------------

黄花乌头

药用部位：块根。

植物特征：多年生草本。块根通常倒卵形或纺锤形，常两个连生。叶互生，叶片近五角形，掌状3全裂达基部，全裂片再一至二回羽状深裂成线形或线状披针形的小裂片。总状花序单一或分枝，花左右对称。

性味归经：辛、甘，大温，有毒。归心、肾、脾经。

功能主治：祛风痰，逐寒湿。用于偏正头痛、寒湿痹痛、口眼歪斜。

用法用量：2.5 ~ 5克，研末吞服。

使用注意：孕妇忌服。



生境：山地林下或山顶草甸。

科：毛茛科	种： <i>Aconitum jeholense</i> Nakai et Kitag.	药名：乌头	别名：附子
-------	--	-------	-------

华北乌头

药用部位：根茎。

植物特征：多年生草本。块根椭圆形，具黄褐色须根。基生叶花期枯萎，叶互生，叶片近圆形，掌状3 ~ 5全裂，全缘，表面绿色。顶生总状花序，花蓝色，盔瓣浅盔帽状，无毛，侧瓣圆状倒卵形，下瓣近长圆形，外面无毛，里面与边缘疏被长毛。蓇葖果椭圆形，种子长圆形。

性味归经：苦、辛，温。归心、肾、脾经。

功能主治：舒筋活血，主治跌打损伤。

用法用量：外用捣敷患处。

使用注意：有毒，多不内服。



生境：高山草地上。

科：毛茛科	种： <i>Aconitum monanthum</i> Nakai	药名：乌头	别名：朝鲜乌头
-------	------------------------------------	-------	---------

高山乌头



药用部位：根。

植物特征：多年生草本。茎单一或分枝，稍具细棱，无毛。茎生叶数枚，叶片五角状圆形或近圆形，3 ~ 5全裂至基部，叶两面无毛。花单生或数朵集生于茎顶形成聚伞状总状花序；花梗无毛，基部或中下部具2枚苞片，苞片披针形，花紫色，盔瓣高帽状，嘴向前伸长成鸭嘴状，侧瓣斜卵形，下瓣不等形、长圆形或狭卵形；雄蕊多数。蓇葖果，种子长圆形，具膜质的鳞片状翅。

性味归经：辛、苦，热。归心、肾、脾经。

功能主治：祛风除湿，温经止痛。用于风寒湿痹、关节疼痛、心腹冷痛、寒疝作痛、麻醉止痛。

用法用量：1~5克，研末，入丸、散。

使用注意：有毒，服用谨慎。

生境：山区林下。

科：毛茛科

种： *Delphinium grandiflorum* L.

药名：鸡爪连

别名：大花飞燕草



花瓣蓝色

翠雀

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。茎生叶和下部叶圆五角形，3全裂。总状花序，萼片蓝紫色，花瓣蓝色。蓇葖果直立。

性味归经：苦、寒。归肝、脾、肾经。

功能主治：凉血解毒，杀虫止痒。治各种瘟疫病发热，出斑等以及毒蛇咬伤等。治疥疮、疥癣、皮肤瘙痒症等。

用法用量：6 ~ 15克，水煎服。外用煎水涂洗皮肤。

使用注意：根有毒，内服谨慎。



叶片圆五角形，3全裂

生境：山坡草地上。

科：毛茛科

种： *Delphinium anthriscifolium* Hance

药名：还亮草

别名：还魂草、对叉草、蝴蝶菊、鱼灯苏

叶片三角状卵形

还亮草

药用部位：全草。

植物特征：一年生草本。近基部叶在开花时常枯萎，叶片菱状卵形或三角状卵形。总状花序有2 ~ 15朵花，花两性，两侧对称，花瓣2，紫色。蓇葖果。

性味归经：辛、苦，温，有毒。归心、肝、肾经。

功能主治：祛风除湿，通络止痛，化食，解毒。主治风湿骨痛、半身不遂、外用涂痈疮癰癤。

用法用量：3 ~ 6克，水煎服。外用适量敷或煎汤洗。

花瓣紫色



生境：200 ~ 1200米的丘陵、低山山坡草地或溪边草地。

科：毛茛科	种： <i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.	药名：毛茛	别名：鱼疗草、鸭脚板、野芹菜、山辣椒、老虎脚爪草、毛芹菜、起泡菜
-------	---------------------------------------	-------	----------------------------------



花瓣圆状宽卵形

花黄色

毛茛

药用部位：全草。

植物特征：草本。基生叶和茎下部叶五角形。深裂，中间裂片宽菱形或倒卵形，浅裂，茎中部叶有短柄，上部叶无柄，深裂，裂片线状披针形，上端有时浅裂成数齿。花黄色，花瓣5，圆状宽倒卵形。聚合果近球形。

性味归经：辛、微苦，温，有毒。归心、肾、脾经。

功能主治：利湿，消肿，止痛，退翳，截疟，杀虫。用于胃痛、黄疸、疟疾、淋巴结结核、角膜云翳等。

用法用量：外用适量捣敷患处。

使用注意：有毒，一般不内服。皮肤破损、过敏者禁用，孕妇慎用。



叶深裂

生境：田野、路边、沟边、山坡杂草丛中。

科：毛茛科	种： <i>Ranunculus sceleratus</i> L.	药名：石龙芮	别名：地槿、天豆
-------	------------------------------------	--------	----------

石龙芮

药用部位：全草。

植物特征：二年生草本。叶有光泽，浅或深3裂，裂片常再分2 ~ 3裂，接近花的叶狭细而不裂。花黄色有光泽，生于枝梢。果密集呈长椭圆形。

性味归经：苦、辛，平，有毒。归心、肾、脾经。

功能主治：消肿，拔毒散结，截疟。用于淋巴结结核、疟疾、痈肿、蛇咬伤、慢性下肢溃疡。

用法用量：外用适量捣敷患处。

使用注意：有毒，不能内服。



接近花的叶狭细

花黄色

生境：水边潮湿环境。

科：毛茛科	种： <i>Ranunculus chinensis</i> Bunge	药名：茴茴蒜	别名：小虎掌草、野桑椹、 鸭脚板、山辣椒
-------	---	--------	-------------------------

茴茴蒜

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。3出复叶，基生叶和下部叶具长柄；叶片宽卵形，中央小叶具长柄，3深裂，裂片狭长，上部生少数不规则锯齿，侧生小叶具短柄，茎上部叶渐变小。花序具疏花；萼片5，淡绿色，船形，花瓣5，黄色。

性味归经：辛、温，有毒。归心、肾、脾经。

功能主治：消炎，退肿，平喘。治哮喘、黄疸肝炎、肝硬化腹水、牛皮癣、疮毒。

用法用量：3 ~ 10克，水煎服。

使用注意：外用慎，有发泡作用。



叶3深裂



花序具疏花

生境：沟溪边或湿草地。

科：毛茛科	种： <i>Adonis amurensis</i> (Amur adonis)	药名：侧金盏花	别名：红蜡花、冰凌花
-------	---	---------	------------

侧金盏花

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。叶互生，二回羽状复叶，小叶深分裂，裂片更细裂，呈线状披针形。早春新叶和花一并展开，花后长大，一茎一花；花瓣多数，金黄色。花后结短小的绿色瘦果。

性味归经：辛、苦，温。归肺、心、肾经。

功能主治：利尿消肿，补心阳。治疗阳虚水泛浮肿、心气不足引起的气喘、心悸、疲乏无力。

用法用量：9 ~ 15克，水煎内服。

使用注意：有毒，不可超剂量服用；孕妇忌服。



花瓣多数

花苞

生境：高山草地中。

科：毛茛科	种： <i>Anemone flaccida</i> Fr. Schmidt	药名：地乌	别名：蜈蚣三七、鹅掌草
-------	--	-------	-------------

林荫银莲花

药用部位：根。


植物特征：多年生草本。根茎粗，近圆柱状。基生叶1 ~ 2片，有长叶柄，五角形，表面疏生短伏毛，背面无毛或几无毛，3全裂。花1 ~ 3朵，白色，微带粉红色，萼片5 ~ 6，倒卵形或椭圆形，背面有短伏毛；心皮数个至10多个，子房密生短柔毛。

性味归经：辛、微苦，温。归肝经。

功能主治：解毒，祛风除湿。治风湿关节疼痛。

用法用量：5克，水煎服。

使用注意：孕妇忌服。



生境：林下。

科：毛茛科	种： <i>Anemone dichotoma</i> L.	药名：草玉梅	别名：二歧银莲花、土黄芩
-------	--------------------------------	--------	--------------

草玉梅




药用部位：根状茎。

植物特征：多年生草本。根茎横走，细长，暗褐色。茎直立，通常上部2叉状分枝。基生叶早枯，茎生叶位于茎上部分枝处，叶对生，近无柄，叶片3深裂，裂片长圆形至长圆状披针形。总苞与茎生叶同形，但较小，萼片形状不一，椭圆形、广椭圆形或倒卵形，外面稍带淡紫红色，被短伏毛，里面白色，无毛。聚合果近球形，瘦果狭卵形。

性味归经：苦，凉。归肝、胃经。

功能主治：解毒止痢，舒筋活血。用于痢疾、疮疖痈毒、跌打损伤。

用法用量：5 ~ 15克，水煎内服。外用适量捣敷患处。



生境：草甸、密林内。

科：毛茛科	种： <i>Anemone rivularis</i> Buch.-Ham. ex DC. var. <i>flore-minore</i> Maxim	药名：小花草玉梅	别名：河岸银莲花
-------	---	----------	----------

小花草玉梅

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。直根粗壮，圆锥形，棕褐色。茎直立，粗壮。基生叶有长柄，叶片3全裂再3裂，小裂片边缘有锐锯齿。总苞3个，轮生，有柄，总苞片3～5深裂，边缘有疏或密锯齿。花较小，两性，白色。瘦果有长尾。

性味归经：苦、微辛，平，有毒。归肝、胃、肺经。

功能主治：清热利湿，消肿止痛。治咽喉肿痛、扁桃体炎、牙痛、胃痛、急慢性肝炎、风湿疼痛、跌打损伤。

用法用量：10～15克，水煎服。

生境：沟旁、湿润草地。



科：毛茛科	种： <i>Hepatica nobilis</i> var. <i>asiatica</i>	药名：獐耳细辛	别名：幼肺三七
-------	---	---------	---------

獐耳细辛

药用部位：根状茎。

植物特征：多年生草本。根状茎斜上，多节，密生暗褐色须根。叶均基生，3～6片，丛生。叶片正三角状宽卵形，3裂至中部，表面暗绿色，有稀疏的白色柔毛，背面淡绿色，散生白色长柔毛。花葶1～6，自老叶丛中抽出，密被白色长柔毛；苞片3，卵形或椭圆状卵形，顶端急尖或稍钝，全缘，背面密被白柔毛；萼片6～11，白色、粉红色或堇色，狭长圆形，顶端钝；雄蕊多数，黄色，花药椭圆形；子房密被长柔毛，具1胚珠。瘦果卵球形，被长柔毛和宿存花柱。



性味归经：苦，温。归肝经。

功能主治：祛风除湿，止痛。主治各种风湿病痛。

用法用量：6～9克，内服，加黄酒、白糖，盛碗内，加盖蒸服，早晚饭前各一次。

生境：海拔1000米的杂木林中、阴湿草坡和路旁。

科：毛茛科	种： <i>Pulsatilla chinensis</i> (Bunge) Regel.	药名：白头翁	别名：老公花、毛姑朵花
白头翁 药用部位：根。 植物特征：宿根草本。根圆锥形，有纵纹，全株密被白色长柔毛。基生叶4 ~ 5片，3全裂，有时为3出复叶。花单朵顶生，径约3 ~ 4厘米，萼片花瓣状，6片排成2轮，蓝紫色，外被白色柔毛；雄蕊多数，鲜黄色。瘦果，密集成头状，花柱宿存，银丝状。 性味归经：苦，寒。归胃、大肠经。 功能主治：清热解毒。治疗菌痢和阿米巴痢疾。 用法用量：9 ~ 15克，水煎服。 使用注意：虚寒泻痢者忌服。  生境：干燥山坡。			

科：毛茛科	种： <i>Clematis intricate</i> Bunge.	药名：透骨草	别名：狗断肠
黄花铁线莲 药用部位：全草。 植物特征：多年生草质藤本。茎攀缘。叶对生，2回羽状复叶。聚伞花序，通常2 ~ 3花，花萼黄色，4枚。瘦果。 性味归经：辛，温。归肝经。 功能主治：祛风除湿，解毒，止痛。用于风湿疼痛、疮疖肿毒。 用法用量：5 ~ 15克，水煎服。外用适量煎水洗，或捣烂敷患处。 使用注意：微毒，内服谨慎。  生境：山地、丘陵、低湿地、沙地及田边。			

科：毛茛科	种： <i>Clematis hexapetala</i> Pall.	药名：威灵仙	别名：山蓼、棉花团
-------	-------------------------------------	--------	-----------

棉团铁线莲

药用部位：根和根茎。

植物特征：直立草本。有纵棱，疏生短毛。羽状复叶对生，中部及下部的小叶常羽状全裂，小叶或全裂片革质，通常条形。聚伞花序腋生或顶生，通常具3朵花，萼片6，白色，外面有白色柔毛，无花瓣。果倒卵形、扁，有紧贴的柔毛。



性味归经：辛、咸，温。归膀胱经。

功能主治：祛风除湿，通络止痛。用于风湿痹痛，肢体麻木，筋脉拘挛，屈伸不利，骨哽咽喉。

用法用量：6 ~ 9克，水煎服。



生境：山地林边或草坡上。

科：毛茛科	种： <i>Clematis brevicaudata</i> DC.	药名：山木通	别名：林地铁线莲、红钉耙藤
-------	-------------------------------------	--------	---------------

短尾铁线莲

药用部位：茎。

植物特征：藤本。枝条褐紫色，疏生短毛。叶对生，为2回3出或羽状复叶，小叶卵形至披针形，先端渐尖或长渐尖，基部圆形，边缘疏生粗锯齿，有时3裂，近无毛；叶柄长有微柔毛。圆锥花序顶生或腋生，花萼片4，白色，狭倒卵形，两面均有短绢状柔毛；无花瓣；雄蕊和心皮均多数。瘦果卵形。

性味归经：微苦，凉，有小毒。归肾经。

功能主治：利尿，消肿。治浮肿、小便不利、尿血。

用法用量：5 ~ 10克，水煎服，或入丸、散。



生境：山地林下、林缘及灌丛中。

科：毛茛科	种： <i>Clematis aethusifolia</i> Turcz. var. <i>latisecta</i> Maxim	药名：芹叶铁线莲	别名：细叶铁线莲、断肠草
-------	---	----------	--------------

花丝疏被毛



芹叶铁线莲

药用部位：全草。

植物特征：草质藤本。叶对生，三至四回羽状细裂，两面稍有毛；叶柄疏被柔毛。聚伞花序腋生，具1~3花；花萼钟状，淡黄色，萼片4，矩圆形，无花瓣；雄蕊多数，花丝疏被毛。瘦果倒卵形，扁，红棕色。

性味归经：辛、苦，温，有毒。归肝经。

功能主治：祛风除湿，活血止痛。治风湿性关节痛，筋骨拘挛，寒湿脚气，疮癣肿毒。

用法用量：3~9克，水煎服，或入丸、散。外用适量捣敷或煎水熏洗患处。

叶羽状细裂



花萼钟状



生境：石质山坡 及沙地柳丛中，也见于河谷草甸。

科：毛茛科	种： <i>Clematis heracleifolia</i> DC.	药名：牡丹藤	别名：草本女娄
-------	--------------------------------------	--------	---------

大叶铁线莲

药用部位：全草。

植物特征：落叶直立灌木。茎粗壮，具明显的纵条纹，密生白色绒毛。3出复叶对生，总叶柄粗壮，密被白绒毛；顶生小叶叶柄长，叶片大，侧生小叶近无柄，叶片小，叶近革质，椭圆状卵形，幼叶叶表具平伏毛，背面被短毛，脉上毛特密，顶生白或黄褐色毛。花两性，无花瓣，花萼管状，4裂，蓝色，反卷，被白毛。瘦果倒卵形，红棕色。

性味归经：辛，平。归肝、大肠经。

功能主治：清热解毒，祛风除湿。治疗肠炎，痢疾，风湿关节肿痛；外用治疮疖肿毒，结核性溃疡、瘰管。

用法用量：3~15克，水煎服。外用适量捣敷患处。

花萼蓝色



生境：阴湿的林边、河岸和溪旁。

科：木通科	种： <i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne.	药名：木通	别名：通草、附支
-------	--	-------	----------

木通

药用部位：木质茎。

植物特征：落叶或半常绿缠绕藤本。枝灰色，有条纹，皮孔突起。掌状复叶，通常 3 ~ 5 叶簇生或互生；小叶 5 枚，椭圆形，全缘。花雌雄同株，总状花序腋生，花紫色。蓇葖果。

性味归经：苦，凉。归心、小肠、膀胱经。

功能主治：泻火行水，通利血脉。治小便赤涩、水肿、胸中烦热、喉痹咽痛、遍身拘痛、妇女经闭、乳汁不通。

用法用量：5 ~ 10克，水煎服或入丸、散。

生境：山坡、灌丛或沟缘。

科：木通科	种： <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.	药名：预知子	别名：八月炸、三叶拿绳
-------	---	--------	-------------

三叶木通

药用部位：果实。

植物特征：落叶木质藤本。茎、枝无毛，灰褐色。3出复叶，小叶卵圆形，长宽变化很大，先端钝圆或具短尖，基部圆形，有时略呈心形，边缘浅裂或呈波状，春夏季开紫红色花，雌雄异花同株，总状花序腋生。

浆果肉质，长圆筒形。

性味归经：苦，寒。归肝、胆、胃、膀胱经。

功能主治：舒肝理气，活血止痛，利尿，杀虫。用于腕胁胀痛、经闭痛经、小便不利、蛇虫咬伤。

用法用量：3 ~ 9克，水煎服或入丸、散。

生境：山林灌丛。

科：小檗科	种： <i>Caulophyllum robustum</i> Maxim.	药名：红毛七	别名：鸡骨升麻、红毛三七
-------	--	--------	--------------



类叶牡丹

药用部位：根茎。

植物特征：多年生草本。根状茎横生，肥厚，坚硬，须根密生，红褐色。叶互生，叶2 ~ 3回3出复叶，花绿黄色，花瓣6。浆果球形，成熟黑蓝色。

性味归经：苦、辛，温。归肾、胃、肝经。

功能主治：理气止痛，祛风活血。用于月经不调，胃腹疼痛，跌打损伤，风湿疼痛。

用法用量：10 ~ 15克，水煎服或泡酒。

使用注意：有小毒，不可超量服用。

生境：山坡阴湿肥沃地或针阔叶混交林下。

科：小檗科	种： <i>Jeffersonia dubia</i> (Maxim.) Benth. Et Hook. f	药名：鲜黄连	别名：细辛幌子、常黄连、铁丝草、朝鲜黄连
-------	--	--------	----------------------

鲜黄连

药用部位：根及茎。

植物特征：多年生草本。根茎短，须根发达。叶丛生，叶片近圆形，两面光滑。花葶顶端着生一花，花冠淡紫色或紫红色。蒴果梨形。

性味归经：苦，寒。归胃、大肠、肺经。

功能主治：清热燥湿，泻火解毒。主治赤白痢疾、腕胁疼痛、呕吐、吐血、目赤肿痛、咽喉痛、痈疽疔疮等。

用法用量：6 ~ 12克，水煎服。外用适量，煎汁洗眼，或涂口舌。

使用注意：体弱者和孕妇忌服。

生境：山坡灌木丛中，杂木及针阔混交下或山脚阴湿处。



科：小檗科	种： <i>Epimedium brevicornum</i> Maxim.	药名：淫羊藿	别名：三叉骨、仙灵脾
-------	--	--------	------------

淫羊藿

药用部位：地上部分。

植物特征：多年生草本。2回3出复叶，小叶9片，小叶片薄革质，卵形至长卵圆形，边缘有细锯齿，锯齿先端成刺状毛，基部深心形；侧生小叶基部斜形，上面幼时有疏毛，开花后毛渐脱落，下面有长柔毛。花大，黄白色或乳白色，花萼8片，卵状披针形，花瓣4，近圆形。蓇葖果纺锤形。

性味归经：辛、甘，温。归肝、肾经。

功能主治：补肾阳，强筋骨，祛风湿。用于阳痿遗精、筋骨痿软、风湿痹痛、麻木拘挛、更年期高血压。

用法用量：3 ~ 9克，水煎服。



生境：多荫蔽的树林及灌丛中。

科：小檗科	种： <i>Berberis thunbergii</i> DC.	药名：小檗	别名：红叶小檗
-------	-----------------------------------	-------	---------

日本小檗

药用部位：根、茎。

植物特征：落叶灌木。叶片膜质，通常约8片簇生于刺腋，菱状卵形，两面脉纹不显著。花序伞形或近簇生，通常有花2 ~ 5，花黄色。浆果长椭圆形，熟时红色或紫红色，种子1 ~ 2粒。

性味归经：苦，寒。归胃、大肠经。

功能主治：清热燥湿，泻火解毒。用于细菌性痢疾、胃肠炎、副伤寒、消化不良、黄疸、肝硬化腹水、泌尿系感染、急性肾炎、扁桃体炎、口腔炎、支气管炎；外用治中耳炎、目赤肿痛、外伤感染。

用法用量：13 ~ 25克，水煎服。外用适量研粉调敷。



生境：常见栽培。

科：小檗科	种： <i>Berberis poiretii</i> Schneid.	药名：三颗针	别名：针雀、掌叶小檗
-------	--------------------------------------	--------	------------

细叶小檗




药用部位：根。

植物特征：落叶灌木植物。枝灰褐色，有槽及疣状突起，刺三分叉，或不分叉。叶簇生于刺腋，狭倒披针形，全缘。总状花序有时近伞形，有花4～15，花鲜黄色。浆果红色，矩圆形。

性味归经：苦，大寒，无毒。归胃、大肠经。

功能主治：清热燥湿，泻火解毒。治急性肠炎、痢疾、黄疸、热痹、瘰癧、肺炎、结膜炎、痈肿疮疖、血崩。

用法用量：5～30克，水煎服。



生境：山坡林下。

科：防己科	种： <i>Menispermum dauricum</i> DC.	药名：北豆根	别名：防己藤、汉防己、山豆藤
-------	------------------------------------	--------	----------------

蝙蝠葛



药用部位：茎。

植物特征：缠绕木质藤本。根状茎圆柱形，细长，皮棕褐色。小枝淡绿色，有细条纹。叶盾状着生，圆肾形或卵圆形，背面淡绿白色。圆锥花序腋生，花黄绿色，花瓣卵圆形，肉质，稍内卷。核果近圆形。

性味归经：苦、辛，寒。归脾、胃经。

功能主治：祛风清热，理气化湿。治咽喉炎、风湿痹痛、水肿、脚气、痢疾肠炎、胃痛腹胀。

用法用量：2～15克，水煎服。



生境：山野路旁、林下。

科：木兰科	种： <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. Et Wils.	药名：厚朴	别名：烈朴、赤朴
-------	---	-------	----------

厚朴

药用部位：树皮。

植物特征：落叶乔木。树皮厚，紫褐色，有辛辣味；幼枝淡黄色，有细毛，后变无毛。顶芽大，窄卵状圆锥形，密被淡黄褐色绢状毛。叶革质，倒卵形或倒卵状椭圆形。花与叶同时开放，单生枝顶，白色，芳香。聚合果长椭圆状卵圆形或圆柱状，长蓇葖果木质，种子倒卵圆形，有鲜红色外种皮。



树干



性味归经：苦、辛，温。归脾、胃、肺、大肠经。

功能主治：燥湿消痰，下气除满。用于湿滞伤中、脘痞吐泻、食积气滞、腹胀便秘、痰饮喘咳。

用法用量：3 ~ 9克，水煎服或研末吞服，也可入丸、散。

生境：海拔500 ~ 1500米的山地，常见栽培。

科：木兰科	种： <i>Magnolia liliflora</i> Desr.	药名：辛夷	别名：紫玉兰、木笔花
-------	------------------------------------	-------	------------

辛夷

药用部位：花蕾。

植物特征：落叶大灌木。常丛生。芽有灰褐色细毛；小枝紫褐色。叶倒卵形或椭圆状卵形，顶端急尖或渐尖，基部楔形，背面沿脉有柔毛。花先叶开放，大型，钟状；花瓣6，长圆状倒卵形，外面紫色或紫红色，内面白色。聚合果长圆形。



性味归经：辛，温。归肺、胃经。

功能主治：散风寒，通鼻窍。用于风寒头痛、鼻塞、鼻渊、鼻流浊涕。

用法用量：3 ~ 9克，包煎内服。



生境：常见栽培。

科：木兰科	种： <i>Illicium henryi</i> Diels.	药名：红茴香	别名：八角茴、土八角
红茴香 药用部位：果实。 植物特征：小乔木。叶互生，革质，椭圆状披针形或长披针形，全缘，表面深绿色。花红色，单生叶腋。蓇葖聚生成星状。 性味归经：甘，温。归胃、大肠、膀胱经。 功能主治：镇呕，行气止痛。治胃寒作吐，膀胱疝气及胸前胀痛等症。 用法用量：10 ~ 15克，水煎服。 使用注意：阴虚内热者禁用。 花红色 叶全缘 			
生境：杂木林中。			

科：木兰科	种： <i>Schisandra sphenanthera</i> Rehd. Et Wits.	药名：南五味子	别名：香苏、红铃子
华中五味子 药用部位：果实。 植物特征：木质藤本。叶椭圆形、倒卵形或卵状披针形。花单性，单生于叶腋，橙黄色。聚合果，浆果近球形，红色，肉质。 性味归经：酸、甘，温。归肺、心、肾经。 功能主治：收敛，滋补，生津，止泻。用于肺虚咳嗽、津亏口渴、自汗、盗汗、慢性腹泻。 用法用量：3 ~ 6克，水煎服，或1 ~ 3克，研末冲服。 浆果红色 肾经。 			
生境：向阳空旷地及灌丛中。			

科：木兰科	种： <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill.	药名：五味子	别名：山花椒、乌梅子、软枣子
北五味子 药用部位：果实。 植物特征：落叶藤本。叶互生，广椭圆形或倒卵形，边缘有细齿。花单性异株，生于叶腋，芳香。穗状聚合果，浆果球形，肉质。 性味归经：酸、甘，温。归心、肝经。 功能主治：收敛固涩，益气生津，补肾宁心。用于咳喘、遗精、久泻、自汗、盗汗、心悸失眠。 用法用量：2 ~ 10克，水煎服或入丸、散。外用研末掺或煎水洗。 使用注意：外有表邪，内实热，或咳嗽初起、痧疹初发忌服。 花蕾 穗状聚合果 			
生境：半阴湿的山沟、灌木丛中。			

科：蜡梅科	种： <i>Chimonanthus praecox</i> (L.) Link	药名：蜡梅花	别名：黄梅花、素馨
-------	--	--------	-----------

蜡梅

药用部位：花蕾。

植物特征：落叶灌木。高达3米。枝、茎成方形，棕红色，有椭圆形突出皮孔。叶椭圆状卵形至卵状披针形，顶端渐尖，基部圆形或阔楔形，表面深绿，背面淡绿。花芳香，外部花被片卵状椭圆形，黄色，

内部花被片渐短 内部的渐短，有紫色条纹；花托椭圆形，口部收缩。

性味归经：辛，凉。归胃、肺经。

功能主治：解暑生津，开胃散郁，止咳。用于暑热头晕、呕吐、气郁胃闷、麻疹、百日咳；外用治烫火伤、中耳炎。

用法用量：5 ~ 10克，水煎服。外用浸于花生油或菜油中成“腊梅花油”，用时搽患处或滴注耳心。



生境：常见 栽培。

科：罂粟科	种： <i>Papaver somniferum</i> L.	药名：米壳	别名：阿芙蓉、御米
-------	---------------------------------	-------	-----------

罂粟

药用部位：果皮。

植物特征：一年生或二年生草本。叶互生，灰绿色，无柄，抱茎，长椭圆形。花单生，开时直立，花大美丽，花瓣4枚，白色、粉红色、红色或紫红色。果长椭圆形或壶状。

性味归经：酸、涩，平。归肺、大肠、肾经。

功能主治：敛肺，涩肠，止痛。用于久咳、久泻，脱肛，脘腹疼痛。

用法用量：3 ~ 10克水煎服或入丸、散。

使用注意：不宜常服。儿童禁用。咳嗽、泻痢初起，或久痢积滞未消者慎服。



生境：常见栽培。

科：罂粟科	种： <i>Papaver nudicaule</i> L. subsp.	药名：野大烟、山米壳	别名：山大烟
野罂粟 药用部位：果实。 植物特征：草本。叶基生，近2回羽状深裂，叶片狭卵形或卵形。花橘黄色，单生。蒴果倒卵形。 性味归经：酸、涩、微苦，微寒，有毒。归肺、大肠、肾经。 功能主治：镇痛，敛肺止咳，止泻 花单生 果实 花橘黄色 固涩。治神经性头痛、偏头痛、胃痛、痛经、久咳、喘息、慢性肠炎、泻痢、便血、遗精、白带。 用法用量：3 ~ 6克，水煎服。 使用注意：本品有毒，勿过量及久服。 生境：山地林缘、沙地灌丛、沟谷草甸。			

科：罂粟科	种： <i>Hylomecon japonica</i> (Thunb.) Prantl et Kundig	药名：刀豆三七	别名：拐枣七
荷青花 药用部位：根。 植物特征：草本。茎叶含有黄色液汁。单数羽状复叶，小叶广卵形至菱状卵形。花1 ~ 2朵腋生成稀疏的聚伞花序，花瓣4，黄色，圆卵形。蒴果线形。 性味归经：苦，平。归肝经。 功能主治：祛风湿，舒筋活络，散瘀消肿，止痛止血。治风湿性关节炎、劳伤、跌打损伤。 花瓣圆卵形 用法用量：5 ~ 15克，水煎服或泡酒。 生境：高山林下阴湿处。			

科：罂粟科	种： <i>Dicranostigma leptopodum</i> (Maxim.) Fedde.	药名：秃疮花	别名：秃子花、勒马回
秃疮花 药用部位：全草。 植物特征：草本。根圆柱形。茎丛生，被长毛。基生叶簇生，叶片倒披针形，状全裂或深裂，2回裂片疏生小齿；茎生叶羽状全裂。花橙黄色，花瓣4。蒴果长圆柱形。 性味归经：苦、涩，凉，有毒。归肝、肺经。 功能主治：清热解毒，消肿止痛，杀虫。用于扁桃体炎、牙痛、淋巴结结核；外用治头癣、体癣。 花瓣4 用法用量：15 ~ 25克，水煎服。外用捣敷或煎水洗。 生境：丘陵、山坡、路边。			

科：罂粟科	种： <i>Chelidonium majus</i> L.	药名：白屈菜	别名：山黄连、土黄连、牛金花、八步紧、断肠草
白屈菜 药用部位：全草。 植物特征：草本。茎直立，被白粉，疏生柔毛。叶互生，1羽状全裂。花数朵，伞状排列；花瓣黄色，倒卵圆形。蒴果线状圆柱形。 性味归经：苦，凉，有小毒。归肺、 叶羽状全裂 蒴果线状圆柱形 花瓣黄色  胃经。 功能主治：镇痛，止咳，平喘，消肿。用于胃痛、慢性支气管炎、百日咳。 用法用量：5 ~ 15克，水煎服。外用适量研粉调膏或捣烂敷患处。 使用注意：有小毒，不可超剂量服用。			
生境：山坡、山谷林边草地。			

科：罂粟科	种： <i>Corydalis ambigua</i> Cham. et Schlecht. var. <i>amurensis</i> Maxim.	药名：元胡	别名：土元胡
东北延胡索 药用部位：块茎。 植物特征：草本。茎自鳞片叶腋中伸出。叶互生，叶片不完全2回3出全裂。总状花序，花瓣淡紫红色或蓝色，唇形。蒴果梭形。 性味归经：辛、苦，温。归 花瓣蓝色  肝、胃经。 功能主治：活血，散瘀，理气，止痛。治心腹腰膝诸痛、月经不调、症瘕、崩中、产后血晕、恶露不尽、跌打损伤。 用法用量：5 ~ 15克，水煎服或入丸、散。 使用注意：孕妇忌服。			
生境：林中及沟谷、林缘。			

科：罂粟科	种： <i>Corydalis bungeana</i> Turcz.	药名：地丁	别名：紫花地丁、苦丁
地丁草 药用部位：全草。 植物特征：草本。根细而直，淡黄棕色。茎细弱，灰绿色。基生叶互生，2回羽状全裂，两面灰绿色，无毛。总状花序，广卵形或卵状三角形花瓣4枚，淡紫色。蒴果扁椭圆形。 叶片灰绿色 花瓣淡紫色  性味归经：苦、辛，寒。归心、脾经。 功能主治：清热解毒。治温病高热烦躁、流感、传染性肝炎、肾炎、腮腺炎、疔疮及其他化脓性感染。 用法用量：5 ~ 15克（鲜品50 ~ 100克），水煎或捣汁内服。外用捣敷患处。			
生境：山沟、溪旁、杂草丛中及砾石处。			

科：白花菜科	种： <i>Cleome gynadra</i> L.	药名：白花菜	别名：臭菜
--------	-----------------------------	--------	-------

白花菜



药用部位：全草。

植物特征：草本。全株被黏质腺毛、具异味。掌状复叶。顶生总状花序，花白色至淡紫色。蒴果。

性味归经：苦、辛，温，有小毒。归肺、胃经。

功能主治：① 活血止痛，祛风散寒，健胃，助消化，散寒止痛。治风湿痛、慢性关节炎、脓疡、骨结核、痔疮、疟疾。② 叶止下痢、治跌打。③ 根治淋病。

用法用量：根15 ~ 24克，叶10 ~ 15克，种子1 ~ 1.5克，水煎服。

使用注意：有小毒，宜久煎。孕妇忌服。



生境：田埂、路旁、沟边等处。

科：十字花科	种： <i>Brassica pekinensis</i> L.	药名：大白菜	别名：胶菜、绍菜
--------	----------------------------------	--------	----------

大白菜

药用部位：叶。

植物特征：一、二年生草本。基生叶大，倒卵状长圆形至倒卵形，浅绿色或白色，先端圆钝，边缘波状，皱缩，中脉宽，白色，有多数粗壮的侧脉，叶柄扁平，边缘有缺刻的宽翅，上部茎生叶长圆形至长圆状披针形，基部抱茎，耳状。总状花序，顶生及腋生，花黄色。长角果。

性味归经：甘，平、微寒。归肠、胃经。

功能主治：解热除烦，通利肠胃，养胃生津，除烦解渴，利尿通便，清热解毒。用于肺热咳嗽、便秘、丹毒、漆疮。

用法用量：20 ~ 100克（鲜品500克），水煎服。外用适量捣敷患处。

叶皱缩

花黄色



总状花序顶
生及腋生



生境：常见栽培。

科：十字花科	种： <i>Isatis indigotica</i> Fortune.	药名：板蓝根	别名：大蓝
 长角果矩圆形  花黄色  茎生叶抱茎 菘蓝 药用部位：干燥根。 植物特征：二年生草本。叶互生，基生叶具柄，叶片长圆状椭圆形，全缘或波状；茎生叶长圆形或长圆状披针形，抱茎，全缘。复总状花序顶生，花黄色。长角果矩圆形。 性味归经：苦，寒。归肝、胃经。 功能主治：清热，解毒，凉血。治流感、乙脑、肺炎、丹毒。 用法用量：25 ~ 50克，水煎服。 使用注意：体虚而无实火热毒者忌服。 生境：常见栽培。			

科：十字花科	种： <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medic.	药名：荠菜	别名：枕头草、粽子菜、三角草
 叶羽状分裂 基生叶丛生  荠菜 药用部位：全草。 植物特征：一、二年生草本。基生叶丛生，莲座状、叶羽状分裂，不整齐。茎生叶狭披针形或披针形。总状花序顶生和腋生。花小，白色，两性，十字花冠。短角果扁平。呈倒三角形，含多数种子。 性味归经：甘，平。归心、肺、肾经。 功能主治：凉血止血，清热利尿。用于肾结核尿血、产后子宫出血、月经过多、肺结核咯血、高血压病、感冒发热、肾炎水肿、泌尿系结石、乳糜尿、肠炎。 用法用量：25 ~ 100克，水煎服。 使用注意：体质虚寒者忌服。 生境：田野路边。			

科：十字花科	种： <i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	药名：西洋菜	别名：西洋菜、水田芥
--------	--	--------	------------

豆瓣菜

药用部位：全草。

小叶深绿色光滑

植物特征：一年生或二年生水生草本。茎中空。叶互生，奇数羽状复叶，小叶卵圆形或近圆形，深绿光滑。顶生总状花序，花冠白色。

性味归经：甘，寒。归肺、膀胱经。

功能主治：清燥润肺，化痰止咳，通经利尿。治肺癆病、肺热咳嗽、痛经、月经不调、皮肤瘙痒、暑热、便秘。

用法用量：50 ~ 250克，水煎服，或捣取汁50 ~ 150毫升服用。

使用注意：体质虚寒、寒性咳嗽者忌食。孕妇、妇女不孕者禁食。

生境：浅水河流、小溪中。



科：十字花科	种： <i>Rorippa Montana</i> (Wall.) Small	药名：蔊菜	别名：辣米菜、野油菜
--------	---	-------	------------

蔊菜

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。茎下部叶长椭圆形，或羽状分裂，上部叶较少分裂或不分裂，边缘有锯齿。花小，花瓣黄色，倒卵形。长角果线形。

性味归经：辛、苦，平。归肺，肝经。

功能主治：清热解毒，镇咳，利尿。用于感冒发热、咽喉肿痛、肺热咳嗽、慢性气管炎、急性风湿性关节炎、肝炎、小便不利；外用治漆疮、蛇咬伤、疔疮痈肿。

用法用量：50 ~ 100克，水煎服。外用适量捣烂敷患处。

生境：荒地、路旁及田园中。



科：十字花科	种： <i>Descurainia Sophia</i> (L.) Webb. ex Prantl	药名：南葶苈子	别名：米蒿
--------	--	---------	-------

播娘蒿

药用部位：种子。

植物特征：一、二年生草本。全株有分叉毛，茎直立，上部多分枝；叶互生，下部叶有柄，上部叶无柄，叶片2~3回羽状深裂，最终的裂片条形；总状花序，顶生，花淡黄色，十字形。长角果线形；种子长圆形，黄褐色或红褐色。



药材



性味归经：辛、苦，大寒。归肺、膀胱经。

功能主治：泻肺平喘，行水消肿。用于痰涎壅肺、喘咳痰多、胸胁胀满、胸腹水肿、小便不利；肺源性心脏病水肿。

用法用量：3~9克，水煎服或入丸、散。

生境：田野、路边荒地。

科：十字花科	种： <i>Orychophragmus violaceus</i> (L.) O. E. Schulz	药名：二月兰	别名：诸葛菜
--------	---	--------	--------

二月兰



药用部位：全草。

植物特征：一年生或二年生草本。茎圆柱形，直立，基部分枝。基生叶和茎下部叶为提琴状羽裂，顶端裂片大，圆形或卵形，侧裂片甚小，长圆形，全缘；茎上部叶无

柄，长圆形或狭卵形。花5~20，花瓣淡紫色。长角果线形、圆柱形；种子1列，褐色。

性味归经：甘、平。归肺经。

功能主治：清肺利咽。治疗咳嗽；外用治疗风湿。

用法用量：50~100克，水煎服。外用捣敷患处。



生境：路边草地。

科：景天科	种： <i>Orostachys fimbriatus</i> (Turcz.) Berg.	药名：瓦宝塔	别名：流苏瓦松
-------	--	--------	---------



花淡
红色

瓦松

药用部位：全草。

植物特征：多年生肉质草本。基部叶成紧密的莲座状，线形至倒披针形，绿色带紫；茎上叶线形至倒卵形，长尖。花淡红色。蓇葖果。

性味归经：酸，平。归肝、肺经。

功能主治：清热解毒，止血，利湿，消肿。治吐血、肝炎、疟疾、痔疮、湿疹、疮疮、汤火灼伤。

用法用量：5 ~ 15克，水煎、捣汁或入丸剂。外用适量捣敷、煎水熏洗或烧存性研末调敷。

使用注意：脾胃虚寒忌用。

基部叶成紧
密莲座状



茎上叶长尖

生境：屋顶、墙头及石上。

科：景天科	种： <i>Rhodiola dumulosa</i> (Franch.) S. H. Fu	药名：凤尾七	别名：雾灵景天
-------	--	--------	---------

小丛红景天

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。常成亚灌木状。主干木质，基部被残枝。枝簇生。叶互生，密集线形，先端尖或稍钝，全缘无柄，绿色。花序顶生，聚伞状，两性花，花瓣5，淡红或白色，披针状长圆形，雄蕊10，较花瓣短。蓇葖果，直立或上部稍展开。种子长圆形，具狭翅。

性味归经：甘、微苦、涩，温。归肾经。

功能主治：补血调经，养阴。用于月经不调、阴虚潮热、头晕目眩、妇女虚劳。

用法用量：15 ~ 20克，煎汤内服。

叶全缘无柄



花瓣白色

生境：海拔1600 ~ 2000米高山山坡及高山梁的石隙中。

科：景天科	种： <i>Rhodiola kirilowii</i> (Regel) Maxim	药名：土三七	别名：细叶红景天
-------	--	--------	----------

狭叶红景天

药用部位：块根。

植物特征：多年生草本。地下块根粗大，形状不一，多为长圆形，外表淡青色或乳白色，被膜质鳞片。叶互生，线形或线状披针形，无毛，沿边缘全缘或有稀疏的不整齐的齿。头状伞房花序，花单性，雌雄异株，雌花花瓣5个，黄色或红色。蓇葖果，上部开裂外展；种子有翅，先端喙状。

性味归经：涩、微酸，温。归肝、肾、膀胱经。

功能主治：止血化淤，调经。主治跌打损伤、腰痛、吐血、崩漏、月经不调。民间用来治疗肺吐血效果甚佳。

用法用量：9 ~ 12克，水煎服。
外用鲜品适量捣敷。

生境：山地草甸的阴坡及森林下的石质坡地上。



科：景天科	种： <i>Sedum spectabile</i> Boreau	药名：八宝	别名：华丽景天、长药景天、大叶景天
-------	-----------------------------------	-------	-------------------

景天

药用部位：茎叶。

植物特征：多年生肉质草本植物。地下茎肥厚，地上茎簇生，粗壮而直立，全株略被白粉，呈灰绿色。叶轮生或对生，倒卵形，肉质，具波状齿。伞房花序密集如平头状，花淡粉红色。蓇葖果。

性味归经：酸，平。归肝、肺经。

功能主治：清热解毒，止血，利湿，消肿。治热淋、痔疮、湿疹、痈毒、疔疮等症。

用法用量：10 ~ 15克，水煎服。外用适量捣敷。

生境：山野林下，常见栽培。



科：景天科	种： <i>Sedum aizoon</i> L.	药名：土三七	别名：旱三七、血山草、费菜
-------	---------------------------	--------	---------------

景天三七

药用部位：全草。

植物特征：多年生肉质草本。茎直立，根状茎粗壮，近木化。叶互生，广卵形至狭倒披针形，先端渐尖，基部楔形，边缘有不整齐锯齿或近全缘，光滑或略带乳头状突起；几无柄。聚伞花序顶生，花密生；萼片5，披针形，长短不等；花瓣5，黄色，长圆状披针形；雄蕊10，心皮5。蓇葖果排成五角星状；种子平滑，边缘有宽翅。



花瓣黄色



性味归经：甘、微酸，平。归肝、肾经。

功能主治：散淤，止血，安神。用于溃疡病、肺结核、支气管扩张及血小板养活性紫癜等血液病的中小量出血、烦躁不安、外伤出血。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服。

生境：山坡岩石上或草丛中。

科：景天科	种： <i>Sedum tatarinowii</i> Maxim	药名：华北景天	别名：华北八宝
-------	-----------------------------------	---------	---------

华北景天

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。茎多条丛生，稍倾斜，不分枝。叶互生，肉质，叶片倒披针形，边缘有疏牙齿或浅齿，几无柄。聚伞花序伞房状。花密集，花梗较花长。花瓣5。



叶肉质

性味归经：甘、微酸，平。归肝、肺、胃经。

功能主治：止血消炎，安神宁心，并有抑菌作用。治疗过敏性紫癜、消化道出血、神经衰弱失眠、咳血鼻出血。

用法用量：15 ~ 30克（鲜品加倍），水煎或捣汁服用。

生境：海拔1000 ~ 2000米的山坡或山地石缝中。

科：景天科	种： <i>Sedum lineare</i> Thunb.	药名：佛甲草	别名：火烧草、火焰草
-------	--------------------------------	--------	------------

佛甲草



药用部位：全草。

植物特征：多年生肉质草本。全体无毛，茎纤细倾卧，着地部分节节生根。叶3～4片轮生，近无柄，线形至倒披针形。聚伞花序顶生，花黄色，细小，花瓣5，矩圆形，雄蕊10，心皮5个，成熟时分离，花柱短。蓇葖果。

性味归经：甘，寒。归肝、胆、小肠经。

功能主治：清热，消肿，解毒。治咽喉肿痛、痈肿、疔疮、丹毒、烫伤、蛇咬伤、黄疸、痢疾。

用法用量：15～30克（鲜品250克），水煎服。外用适量捣敷患处。

生境：生于山坡岩石上或栽培。

科：虎耳草科	种： <i>Astilbe chinensis</i> (Maxim.) Franch. et Sav.	药名：落新妇	别名：红升麻、虎麻、金猫儿
--------	--	--------	---------------

落新妇

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。根状茎粗大，暗褐色，须根多数。茎直立。基生叶2～3回3出复叶，小叶卵状长圆形、菱状卵形或卵形，顶生小叶比侧生小叶大，基部楔形或微心形，先端渐尖，边缘有重牙齿；茎生叶比基生叶小；小叶膜质，褐色。顶生圆锥花序，花瓣5，紫色，线形，雄蕊10，花药紫色；心皮2。蒴果；种子褐色，两头尖。

性味归经：辛、苦，凉。归肺经。

功能主治：祛风，清热，止咳。用于风热感冒、头身疼痛、发热咳嗽。

用法用量：10～25克，水煎服。



生境：海拔400～3600米的山坡林下阴湿地或林缘路旁草丛中。

科：虎耳草科	种： <i>Ribes burejense</i> Fr. Schmidt.	药名：刺李	别名：刺梨
--------	--	-------	-------

刺果茶藨子

药用部位：果实。

植物特征：落叶灌木。枝有刺，3分叉，粗大；老枝灰色，皮呈长条状剥裂，小枝节间常具细刺毛或腺毛，有时无毛。叶宽卵形，3~5裂，裂片顶端钝，边缘有深切的牙齿，两面均有细柔毛或近无毛。花1~2朵，单生叶腋或侧枝枝端上，花瓣长圆状披针形，白色，常略带绿色或红色。浆果椭圆形或近球形，紫色；满被腺体刺毛或无毛。

性味归经：酸，平。归肝经。
功能主治：滋肝健胃。治萎缩性胃炎、胆汁缺乏病。
用法用量：15~25克，水煎服，或作茶点食用。



生境：阳坡山地沟谷中。


科：虎耳草科	种： <i>Parnassia oveophila</i> Hance.	药名：细叉梅花草
--------	--------------------------------------	----------

细叉梅花草

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。株高10~30厘米。基生叶丛生，具长柄，叶片卵形或卵状椭圆形，全缘，两面均被锈色腺点；茎生叶1片，无柄，与基生叶同型。花瓣5，白色；假雄蕊5，上半部深3裂，裂片长柱状，近平行；花柱较长，先端3裂；子房半下位。蒴果倒卵形。

性味归经：苦，寒。归胃、心经。
功能主治：清热退烧。治疗发热。
用法用量：6~9克，水煎服。



生境：高山草地中。

科：蔷薇科	种： <i>Crataegus cuneata</i> Sieb. Et Zucc.	药名：山楂	别名：南山楂、小叶山楂、红果子
-------	--	-------	-----------------

山楂

药用部位：果实。

植物特征：落叶灌木或小乔木。枝密生，有细刺，幼枝有柔毛。叶倒卵形，先端常3裂，基部狭楔形下延至柄，边缘有尖锐重锯齿。伞房花序，总花梗和花梗均有柔毛，花白色。梨果球形或梨形，红色或黄色，宿萼较大，反折。



果球形

性味归经：酸、甘，微温。归脾、胃、肝经。
功能主治：消食，化滞消积，活血散瘀，化痰行气。用于肉食滞积、症瘕积聚、腹胀痞满、瘀阻腹痛、痰饮、泄泻、肠风下血等。

用法用量：10 ~ 30克，直接食用、水煎或榨汁服用。

使用注意：胃酸过多、消化性溃疡和龋齿者，及服用滋补药品期间忌服用。

生境：向阳山坡或山地灌木丛中。

科：蔷薇科	种： <i>Cydonia oblonga</i> Mill	药名：木梨	别名：楔楂
-------	--------------------------------	-------	-------

榲桲



药用部位：果实。

植物特征：灌木或小乔木。单叶互生，叶卵圆至长圆形，全缘，上面无毛或幼时有疏柔毛，暗绿色，下面密被长柔毛，叶脉显著。花冠纯白色，单生于小枝顶端，花瓣倒卵形。果实有扁圆形、倒卵形、石榴形，黄色，密被短绒毛，有特殊香味，

果肉粗硬，味酸略涩；种子饱满，红褐色，坚硬。

性味归经：甘、酸，温。归肝、肺、胃经。

功能主治：祛湿解暑，舒筋活络。用于伤暑，呕吐，腹泻，消化不良，关节疼痛，腓肠肌痉挛。

用法用量：7 ~ 15克，水煎服。



果实石榴形

生境：常见栽培。

科：蔷薇科	种： <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne	药名：木瓜	别名：冥楂
-------	--	-------	-------

木瓜

花瓣淡红色

药用部位：果实。

植物特征：落叶灌木或小乔木。叶互生，椭圆状卵形或长椭圆形，边缘有刺芒状锯齿。花单生于叶腋，萼片5；花瓣5，淡红色；雄蕊多数；子房下位，5室，花柱3 ~ 5，基部合生，有柔毛。梨果长圆形，深黄色，木质，芳香。

性味归经：酸、涩，温。归肝、脾经。

功能主治：舒筋活络，和胃化湿。主治风湿痹痛、菌痢、吐泻。

用法用量：6 ~ 15克，水煎服或入丸、散。外用适量煎水熏洗。

叶椭圆状卵形

生境：常见栽培。



科：蔷薇科	种： <i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai	药名：宣木瓜	别名：贴梗海棠
-------	--	--------	---------

皱皮木瓜

花淡红色

药用部位：果实。

植物特征：落叶灌木。小枝无毛，有刺。叶片卵形至椭圆形。花簇生，淡红色或白色；花柱5，基部合生，无毛。梨果球形或长圆形，干后果皮皱缩。

性味归经：酸，温。归肝、脾经。

功能主治：平肝舒筋，祛湿和胃。用于湿痹拘挛、腰膝关节酸重疼痛、吐泻转筋、脚气水肿。

用法用量：6 ~ 15克，水煎服或入丸、散。外用适量煎水熏洗。

使用注意：脾胃虚弱者不可服用。

药材

梨果球形

生境：常见栽培。



科：蔷薇科

种： *Rose davurica* Pall.

药名：山刺玫

别名：刺玫果

山刺玫

药用部位：果实。

植物特征：落叶灌木。小枝及叶柄基部常有成对的皮刺，刺弯曲，基部大。羽状复叶，矩圆形或长卵圆形，边缘近中部以上有锐锯齿，上面无毛，下面灰绿色，有白霜、柔毛和腺体。花单生或数朵聚生，深红色。蔷薇果球形或卵形，红色。

性味归经：酸、甘、涩，平。归肾、膀胱、大肠经。

功能主治：固精缩尿，涩肠止泻。用于遗精滑精、遗尿尿频、崩漏带下、久泻、久痢。

用法用量：6 ~ 12克，水煎服。

生境：野生向阳山坡。

叶边缘中部
以上有锐齿



果球形，
红色

羽状复叶

科：蔷薇科

种： *Sanguisorba officinalis* L.

药名：地榆

别名：黄瓜香、血箭草

地榆

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。根粗壮，本质化。单数羽状复叶，小叶片长圆状卵形至线状长椭圆形。穗状花序圆柱状或卵圆形；萼片花瓣状，暗紫红。瘦果。

性味归经：苦、酸、涩，微寒。归肝、大肠经。

功能主治：凉血止血，解毒敛疮。用于便血、痔血、血痢、崩漏、水火烫伤、痈肿疮毒。

用法用量：10 ~ 15克，水煎或入丸、散。外用适量捣汁或研末敷。

使用注意：虚寒者忌服。

生境：山坡、路旁或田边。

穗状花序圆柱状



科：蔷薇科	种： <i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	药名：棣棠	别名：黄度梅
-------	------------------------------------	-------	--------

棣棠

药用部位：花。

植物特征：落叶丛生小灌木。小枝绿色，无毛，髓白色，质软。叶卵形或三角状卵形，先端渐尖，边缘有锐尖重锯齿，叶背疏生短柔毛。花单生于当年生侧枝顶端，花金黄色，萼筒无毛，萼裂片卵状三角形或椭圆形，全缘，两面无毛；花瓣黄色，长圆形或近圆形，先端微凹；雄蕊长不及花瓣之半；花柱顶生，与雄蕊近等长。瘦果褐黑色，扁球形。

性味归经：微苦、涩，平。归肺、胃、脾经。

功能主治：化痰止咳，健脾化湿。治久咳、消化不良、水肿、风湿痛、热毒疮。

用法用量：15 ~ 25克，水煎服。外用适量煎水洗。



生境：海拔400 ~ 1000米的山坡、山谷、灌丛、杂林中。

科：蔷薇科	种： <i>Bhodotypos scandens</i> (Thunb.) Mak.	药名：鸡麻	别名：双珠母
-------	---	-------	--------

鸡麻

药用部位：果实。

植物特征：落叶灌木。老枝紫褐色，小枝初为绿色，后变为浅褐色。单叶对生，卵形或卵状椭圆形，叶面具皱折、叶缘下凹，缘具重齿。

花白色，单生于当年生小枝顶端，花瓣4枚。核果，成熟时黑色。

性味归经：甘，平。归肾经。

功能主治：补虚养血。治血虚、肾亏、贫血。

用法用量：21 ~ 30克，水煎服。



生境：常见栽培。

科：蔷薇科

种： *Rubus saxatilis* L.

药名：小悬钩子

别名：莓子、覆盆子

石生悬钩子

药用部位：果实。

植物特征：草本状小灌木。三出复叶，圆形或圆状菱形，先端锐尖，顶小叶基部楔形；侧小叶基部偏斜，叶缘有重锯齿及缘毛，两面绿色，有柔毛，下面脉上有时有刺，具沟槽，有柔毛及短刺。伞房花序，生于枝顶端，有花3 ~ 8，萼片5，披针形，两面有毛，花瓣5，白色。聚合果含小核果1至6个，红色，透明光滑。

性味归经：甘、酸，温。归肾经。

功能主治：补肾固精。用于遗精。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服。

生境：较干燥的阳坡或阔叶疏林内或林间空地。



科：蔷薇科

种： *Rubus kanayamensis* Levl. et Vant.

药名：牛迭肚

别名：悬钩子

山楂叶悬钩子

药用部位：果实。

植物特征：落叶灌木。小枝黄褐色至紫褐色，无毛，具直立针状皮刺，微具棱角。单叶互生，叶片广卵形至近圆卵形，边缘具有整齐粗锯齿，表面无毛。花2 ~ 6朵簇生于枝顶成短伞房状花序，或1 ~ 2朵生叶腋，花瓣卵状椭圆形，白色。聚合果近球形，暗红色，无毛，有光泽。

性味归经：甘、酸，温。归肝、肾经。

功能主治：益肾，固精，缩尿。用于肾虚遗尿、小便频数、阳痿早泄、遗精滑精。

用法用量：5.5 ~ 10克，水煎、浸酒、熬膏或入丸、散。



生境：山坡、路旁及灌丛中。

科：蔷薇科	种： <i>Rubus chingii</i> Hu	药名：覆盆子	别名：华东覆盆子、种田泡
覆盆子 药用部位：果实。 植物特征：落叶灌木。新枝略带蔓性，紫褐色，幼枝绿色，被白粉，有少数倒刺。羽状复叶互生，小叶5 ~ 7，边缘有锯齿。花单生于枝端叶腋，花瓣5，近圆形，白色。聚合果球形，红色，下垂，小核果密被淡黄白色短柔毛。 性味归经：甘、酸，温。归肝、肾经。 功能主治：益肾，固精，缩尿。用于肾虚遗尿、小便频数、阳痿早泄、遗精滑精。 用法用量：5.5 ~ 10克，水煎、浸酒、熬膏或入丸、散。 使用注意：肾虚有火，小便短涩者慎服。 生境：溪旁或山坡林中。 药材			

科：蔷薇科	种： <i>Rubus idaeus</i> L. var. <i>borealisinensis</i> Yü et Lu	药名：覆盆子	别名：种田泡
华北覆盆子 药用部位：果实。 植物特征：落叶灌木。新枝略带蔓性，紫褐色，幼枝绿色，被白粉，有少数倒刺。奇数羽状复叶，小叶3，稀为5。花单生于枝端叶腋，花瓣5，近圆形，白色。聚合果球形，红色，下垂，小核果密被淡黄白色短柔毛。 性味归经：甘、酸，温。归肝、肾经。 功能主治：补肝肾，缩小便，助阳，固精，明目。治阳痿、遗精、洩数、遗溺、虚劳、目暗。 用法用量：8 ~ 10克，水煎、浸酒、熬膏或入丸、散。 使用注意：肾虚有火，小便短涩者慎服。 生境：溪旁或山坡林中。			

科：蔷薇科	种： <i>Fragaria orientalis</i> Losina-Losinsk.	药名：东方草莓	别名：野草莓
-------	---	---------	--------

东方草莓

药用部位：果实。

植物特征：多年生草本。根状茎横走，黑褐色；匍匐茎细长。掌状三出复叶，基生，小叶近无柄，宽卵形或菱状卵形，边缘中上部有粗圆齿状锯齿。聚伞花序生花葶顶部，花少数，白色。瘦果卵形，多数聚生于肉质花托上。

性味归经：酸、微甘，平。归肺、胃经。

功能主治：祛痰止咳，除湿止痒。治咳嗽痰多，湿疹，肾结石。

用法用量：9 ~ 12克，水煎服。外用适量煎水搽患处。



瘦果聚生于肉质花托上



花白色



掌状三出复叶

生境：林下、林缘灌丛、林间草甸及河滩草甸。

科：蔷薇科	种： <i>Potentilla chinensis</i> Ser.	药名：翻白草	别名：白头翁、蛤蟆草
-------	-------------------------------------	--------	------------

委陵菜

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。羽状复叶互生，小叶片长圆形至长圆状倒披针形，羽状深裂，裂片三角形，常反卷。聚伞花序顶生，花瓣5，黄色，倒卵状圆形。瘦果有毛，多数，聚生于被有绵毛的花托上，花萼宿存。

性味归经：苦，寒。归肝、大肠经。

功能主治：清热解毒，凉血止痢。用于赤痢腹痛、久痢不止、痔疮出血、痈肿疮毒。

用法用量：9 ~ 15克，水煎服。外用鲜品适量，煎水洗或捣烂敷患处。



花瓣黄色



小叶片羽状深裂

羽状复叶

生境：向阳山坡、荒地。

科：蔷薇科	种： <i>Potentilla anserine</i> L.	药名：蕨麻	别名：人参果
-------	----------------------------------	-------	--------



羽状
复叶

鹅绒委陵菜

药用部位：根状茎。

植物特征：多年生草本。根圆柱状，具多数细长须根，部分须根局部膨大成长圆形的块根，肉质。基生叶为羽状复叶，小叶3 ~ 12对，卵状矩圆形或椭圆形，先端圆钝，边缘有深锯齿；小叶间有极小的小叶片；茎生叶有较少数小叶。花单生，黄色，花

瓣比萼片长。瘦果卵形，具洼点，背部有槽。

性味归经：甘，平。归胃、肾经。

功能主治：补气血，健脾胃，生津止渴，利湿。用于病后贫血、营养不良、脾虚腹泻、风湿痹痛。

用法用量：25 ~ 50克，水煎服。



花黄色

边缘有
深锯齿

生境：河滩沙地、潮湿草地、田边和路旁。

科：蔷薇科	种： <i>Potentilla glabra</i> Lodd.	药名：银露梅	别名：银老梅
-------	-----------------------------------	--------	--------

银露梅

药用部位：花、叶。

植物特征：落叶灌木。掌状复叶、有小叶2对，稀3小叶、上面一对小叶基部下延与轴汇合。小叶片椭圆形、倒卵椭圆形或卵状椭圆形，顶端圆钝或急尖，边缘平坦或微向下反卷。顶生单花或数朵，花梗细长，被疏柔毛，花瓣白色，倒卵形。瘦果表面被毛。

性味归经：甘，平。归脾、肾经。

功能主治：健脾，化湿，清暑，调经。主治大便燥结、月经不调。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服。



花瓣白色

生境：山坡草地、河谷岩石缝中、灌丛及林中。

科：蔷薇科	种： <i>Prunus sibirica</i> L.	药名：苦杏仁	别名：山杏
-------	------------------------------	--------	-------



西伯利亚杏

药用部位：种子。

植物特征：落叶灌木或小乔木。单叶互生，叶片宽卵形，边缘有细钝锯齿。花单生，花瓣白色或粉红色。核果近球形，两侧稍扁，被短柔毛，果柄极短，果肉较薄而干燥，离核。

性味归经：苦，温，有小毒。归肺、大肠经。

功能主治：降气，止咳，平喘，润肠通便。用于咳嗽气喘、胸满痰多、血虚津枯、肠燥便秘。

用法用量：5 ~ 10克，水煎服（宜打碎及后下），或入丸、散。外用适量捣敷患处。

使用注意：婴儿慎服；阴虚咳嗽及泄痢便溏者禁服。



生境：森林草原地带和落叶阔叶林地带的边缘，也散生于草原沙地上。

科：蔷薇科	种： <i>Prunus japonica</i> Thunb	药名：郁李仁	别名：爵梅、秧李
-------	---------------------------------	--------	----------



郁李

药用部位：种子。

植物特征：落叶灌木。叶卵形或宽卵形，少有披针形卵形，先端长尾状，边缘有锐重锯齿，无毛，或下面沿叶脉生短柔毛。花与叶同时开放，2 ~ 3朵，花瓣粉红色或近白色，倒卵形。核果近球形，暗红色，光滑而有光泽。

性味归经：辛、苦、甘，平。归脾、大肠、小肠经。

功能主治：润燥滑肠，下气，利水。用于津枯肠燥、食积气滞、腹胀便秘、水肿、脚气、小便不利。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服或入丸、散。



生境：多见栽培。

科：蔷薇科	种： <i>Prunus humilis</i> Bunge	药名：郁李仁	别名：钙果
欧李 药用部位：种子。 植物特征：落叶灌木。叶互生，长圆形或椭圆状披针形，先端尖，边缘有浅细锯齿。花与叶同时开放，单生或2朵并生，花梗有稀疏短柔毛；萼片5，花后反折；花瓣5，白色或粉红色。核果近球形，熟时鲜红色。 性味归经：辛、苦、甘，平。归脾、大肠、小肠经。 功能主治：润燥滑肠，下气，利水。用于津枯肠燥、食积气滞、腹胀便秘、水肿、脚气、小便不利。 用法用量：5 ~ 15克，水煎服入丸、散。 生境：荒山坡或砂丘边。			



科：蔷薇科	种： <i>Prunus pseudocerasus</i> Lindl.	药名：樱桃、樱桃仁、樱桃叶	别名：莺桃、荆桃
樱桃 药用部位：果实、种子、根、枝条、叶。 植物特征：落叶小乔木。干皮紫灰色，小枝淡红褐色，均光滑。单叶互生，叶卵圆形或长圆状披针形，先端短尖，缘具尖细锯齿。花单生或2朵簇生，白色，雄蕊约25枚，略短于花瓣。核果扁球形，腹缝线上微见沟纹，无梗洼，熟时黄、红或紫色，光亮或微被白粉。 性味归经：甘、微酸，温。归脾、肝经。 功能主治：清热透疹。用于麻疹不透。 用法用量：果实适量直接食用；核5 ~ 15克，叶25 ~ 50克，水煎服。外用适量，捣敷患处。 生境：常见栽培。			



科：蔷薇科	种： <i>Prunus padus</i> L.	药名：稠李叶	别名：臭李子
-------	---------------------------	--------	--------

稠李


药用部位：叶。

植物特征：落叶乔木。单叶互生，叶椭圆形，倒卵形或长圆状倒卵形，先端突渐尖，基部宽楔形或圆形，缘具尖细锯齿。两性花，腋生总状花序，下垂，基部常有叶片，有花10～20，花瓣白色，略有异。核果近球形，黑紫红色。

性味归经：苦，平。归肝、胃、大肠经。

功能主治：驱虫平肝。民间用于杀灭寄生虫。

用法用量：10～15克，水煎服。



生境：杂木林中。

科：豆科	种： <i>Albizzia julibrissin</i> Durazz.	药名：合欢皮	别名：夜合树、绒花树、鸟绒树
------	--	--------	----------------

合欢

药用部位：树皮。

植物特征：落叶乔木。树皮灰褐色，小枝带棱角。2回羽状复叶互生，镰状长圆形，两侧极偏斜，先端急尖，基部楔形。花序头状，多数，伞房状排列，腋生或顶生；花萼

头状花序伞房状排列



筒状，5齿裂；花冠漏斗状，5裂，淡红色。荚果扁平长椭圆形。

性味归经：甘，平。归心、肝、肺经。

功能主治：解郁安神，活血消肿。用于心神不安、忧郁失眠、肺痈疮肿、跌扑伤痛。

用法用量：7～15克；水煎服或入散剂。外用研末调敷患处。



2回羽状复叶

生境：路旁、林边及山坡上。

科：豆科	种： <i>Aeschynomene indica</i> L.	药名：合萌	别名：田皂角
------	----------------------------------	-------	--------

合萌

药用部位：全草。

植物特征：半灌木状草本。茎直立，质软中空。双数羽状复叶，小叶矩圆形，全缘。总状花序腋生，花少数，花冠黄色带紫纹。荚果条状矩圆形。种子肾形，黑褐色。

性味归经：苦、涩，凉，无毒。归肝、肾、大肠经。

功能主治：除时疫瘴气，祛风化痰，托毒生肌，利尿，明目。治痢疾。

用法用量：5 ~ 25克，水煎服。

生境：潮湿的水边和林下。

科：豆科	种： <i>Gleditsia sinensis</i> Lam.	药名：皂荚	别名：皂角
------	-----------------------------------	-------	-------

皂荚

药用部位：果实、刺。

植物特征：落叶乔木，树干有刺。羽状复叶，簇生或近对生，长椭圆形或卵状披针形，缘有细锯齿。总状花序腋生，花杂性。正常荚果直，条形；不育荚果微弯作镰刀形，不扭转。

性味归经：辛，温，有小毒。归肺、大肠经。

功能主治：祛风痰，除湿毒，杀虫。治中风口眼歪斜、头痛、咳嗽痰喘、肠风便血、痈肿便毒、疮癣疥癩。

用法用量：5 ~ 10克，水煎服，或焙焦研粉吞服。

使用注意：内服剂量不宜过大，否则易引起呕吐及腹泻；孕妇忌服。

生境：干燥阳坡山地。

科：豆科	种： <i>Sophora japonica</i> L.	药名：槐花	别名：国槐
------	-------------------------------	-------	-------

槐树

药用部位：花。

植物特征：落叶乔木，干皮暗灰色，小枝绿色，皮孔明显，芽被青紫色。奇数羽状复叶，小叶9 ~ 15，卵状披针形或卵状椭圆形。花两性，顶生，蝶形，浅黄绿色，7 ~ 8月开花，10月果实成熟，荚果肉质，串珠状，成熟后干涸不开裂。

性味归经：苦，微寒。归肝、大肠经。

功能主治：凉血止血。用于便血、血痢、痔血、崩漏、咯血、鼻出血等症。

用法用量：15 ~ 25克，水煎服。



生境：常见栽培。

科：豆科	种： <i>Sophora flavescens</i> Ait.	药名：苦参	别名：苦识、地槐
------	-----------------------------------	-------	----------

苦参

药用部位：根。


植物特征：多年生草本或灌木。主根圆柱形，外皮黄色。单数羽状复叶，小叶披针形至线状披针形。总状花序顶生，花冠淡黄色。荚果。

性味归经：苦，寒。归心、肝、胃、大肠、膀胱经。

功能主治：清热燥湿，杀虫，利尿。用于热痢、便血、黄疸尿闭、赤白带下、阴肿阴痒、湿疹、湿疮、皮肤瘙痒、疥癣麻风；外治滴虫性阴道炎。

用法用量：4.5 ~ 9克，水煎服。外用适量煎汤洗患处。

使用注意：伤胃、伤阴，脾胃虚寒及阴虚津伤者慎用。



生境：向阳山坡草丛中和山麓、郊野、路边、溪沟边。

科：豆科	种： <i>Indigofera tinctoria</i> L.	药名：木蓝	别名：蓝靛、槐蓝
------	-----------------------------------	-------	----------

木蓝

药用部位：茎叶。

植物特征：直立灌木。小枝被银白色短毛。单数羽状复叶互生，小叶对生，长椭圆形，全缘。总状花序，疏松，近无梗，花冠伸出萼外，红色。荚果无毛。种子8 ~ 12枚。

性味归经：苦，寒。归心、肝经。

功能主治：清热解毒，去瘀止血。治乙型脑炎、腮腺炎、目赤、疮肿、吐血。

用法用量：25 ~ 50克，水煎服。外用适量煎水洗或捣敷患处。



生境：山坡林下。

科：豆科	种： <i>Lespedeza cuneata</i> (Dum-Cours.) G. Don	药名：夜关门	别名：铁扫帚、三叶公母草、鱼串草
------	---	--------	------------------

截叶铁扫帚

药用部位：根、全草。

植物特征：落叶亚灌木。有长而纤弱的枝，薄被微柔毛。叶互生，3小叶，小叶常为线状楔形。花黄白色，蝶形，腋生总状花序，萼深5裂，旗瓣中央紫红色，雄蕊10枚，两体，子房上位，1室。荚果斜卵形。

性味归经：甘、微苦，平。归肝、肾、肺经。

功能主治：清热利湿，消食除积，祛痰止咳。用于小儿疳积、消化不良、胃肠炎、细菌性痢疾、胃痛、黄疸型肝炎、肾炎水肿、白带、口腔炎、咳嗽、支气管炎；外用治带状疱疹、毒蛇咬伤。

用法用量：25 ~ 50克，水煎服。外用取鲜品适量捣烂敷患处。



生境：山坡灌丛边，荒山草地中，路边，田边也有生长。

科：豆科	种： <i>Lespedeza bicolon</i> Turcz	药名：胡枝子	别名：胡枝条、野花生、过山龙
------	-----------------------------------	--------	----------------

胡枝子

药用部位：叶。

植物特征：灌木。3出复叶，小叶狭卵形、倒卵形或椭圆形，侧小叶较小，基部渐狭或圆形，先端常为圆钝头，稍具短尖，全缘，上面绿色，无毛。总状花序腋生成圆锥花序状，花冠紫色。荚果斜倒卵形。

性味归经：甘，平。归心、肝经。

功能主治：清热润肺，利尿通淋，止血。主治肺热咳嗽、感冒发热、百日咳、淋症、吐血、鼻出血、尿血、便血。

用法用量：9 ~ 15克（鲜品30 ~ 60克），水煎服，或代茶泡饮。

总状花序腋生成圆锥花序状

3出复叶

生境：山地灌木林下。

科：豆科	种： <i>Caragana arborescens</i> (Amm.) Lam	药名：杭子稍	别名：三叶豆
------	---	--------	--------

杭子稍

药用部位：根。

植物特征：落叶灌木。具3小叶复叶，小叶长圆形或椭圆形。总状花序腋生，花梗纤细，萼宽钟形，萼齿4，较短，花冠紫色或淡紫色。荚果斜椭圆形仅背腹缝边缘具短毛，网脉明显，顶端具短尖。

性味归经：甘，温。归肝、肺、大肠经。

功能主治：清热利湿，消食除积，散瘀止痛。治跌打损伤、血瘀肿痛、寒湿痢疾。

用法用量：9 ~ 15克，水煎服。外用适量捣敷患处。

荚果斜椭圆形

花冠淡紫色

生境：海拔 2000米以下的山坡、山谷、路旁和沟岸灌丛中。

科：豆科	种： <i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl.	药名：鸡眼草	别名：掐不齐
------	--	--------	--------



鸡眼草

药用部位：全草。

植物特征：一年生草本。分枝多，枝条细长而坚硬，被毛茸。叶互生，3小叶，小叶倒卵状长椭圆形，叶脉上有毛，叶柄短。花浅玫瑰色，蝶形，1 ~ 2朵，腋生。荚果卵状圆形。

性味归经：甘、淡，微寒。归肝、肾、大肠经。

功能主治：清热解毒，活血，利湿止泻。用于胃肠炎、痢疾、肝炎、夜盲症、泌尿系感染、跌打损伤、疔疮疖肿。

用法用量：15 ~ 50克，水煎服。外用适量外敷患处。

生境： 山坡、田边、 林边草地、溪边。

科：豆科	种： <i>Psoralea corylifolia</i> L.	药名：补骨脂	别名：破故纸
------	-----------------------------------	--------	--------



补骨脂

药用部位：果实。

植物特征：一年生草本。全株有白色毛及黑褐色腺点，茎直立。叶互生，多为单叶，仅枝端的叶有时侧生1枚小叶；叶片阔卵形至三角状卵形，边缘有不整齐的锯齿。花多数，密集成近头状的总状花序，腋生；花冠蝶形，淡紫色或白色。荚果近椭圆形。

性味归经：辛、苦，温。归肾、脾经。

功能主治：温肾助阳，纳气，止泻。用于阳痿遗精、腰膝冷痛、肾虚作喘、五更泄泻、白癜风、斑秃。

用法用量：6 ~ 9克，水煎服。

生境： 山坡、溪边、田边。

科：豆科	种： <i>Gueldenstaedtia verna</i> (Georgi) Boiss.	药名：甜地丁	别名：紫花地丁、地丁
------	---	--------	------------

米口袋

药用部位：全草。

植物特征：草本。高4 ~ 20厘米，全株被白色长绵毛，奇数羽状复叶，多数，丛生。花梗自叶丛间抽出数个至十数个，顶端集生2 ~ 5(8)朵花，排列成伞形；花梗极短，近无梗；花冠紫色。荚果圆筒状；种子肾形。



性味归经：苦、辛，寒。归肺、心、胃经。

功能主治：清热解毒。用于疮痈肿，急性阑尾炎，一切化脓性炎症。

用法用量：10 ~ 50克，水煎服。外用取鲜品适量捣烂敷患处，或煎水洗。

生境：向阳草地、干山坡、沙质地、草甸草原或路旁等处。

科：豆科	种： <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge	药名：黄芪	别名：北芪
------	--	-------	-------

膜荚黄芪

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。主根细瘦圆柱状，稍扭曲。茎被长柔毛。一回奇数羽状复叶互生，小叶卵状披针形或椭圆形。总状花序腋生，有长梗，花冠蝶形，白色。荚果膜质，膨胀，卵状长圆形。



性味归经：甘，微温。归肺、脾经。

功能主治：补脾益气，固表止汗，利尿消肿，排脓。用于气血两虚、心悸气短、脾虚泄泻、食少便溏、中气下陷、久泻脱肛、痈疽难溃、血虚痿黄等气衰血虚之症。

用法用量：30 ~ 120克，水煎服或入丸、散。



生境：向阳山坡的草丛和灌丛。

科：豆科	种： <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi	药名：葛根	别名：葛、葛藤
------	---	-------	---------

荚果密生黄褐色长硬毛

野葛

药用部位：根。

植物特征：藤本。全株被黄褐色长硬毛。三出复叶互生，中央小叶菱状卵形或宽卵形，侧生小叶斜椭圆形，两面被糙毛，背面较密。总状花序腋生，花密集，花冠蝶形，蓝紫色。荚果线形，扁平，密生黄褐色长硬毛。

性味归经：甘、辛，凉。归脾、胃经。

功能主治：解表退热，生津，透疹，升阳止泻。用于外感发热头痛、高血压颈项强痛、口渴、消渴、麻疹不透、热痢、泄泻。

中央小叶菱状卵形

用法用量：内服：煎汤，6 ~ 18克；或捣汁。外用适量捣敷患处。



花密集

生境：山坡草丛、路旁、疏林中较阴湿处。

科：豆科	种： <i>Arachis hypogaea</i> L.	药名：花生叶	别名：花生
------	-------------------------------	--------	-------

落花生

药用部位：叶。

植物特征：一年生草本。茎匍匐或直立，有棱，被棕黄色长毛。偶数羽状复叶，互生，托叶大，基部与叶柄基部连生，披针形，脉纹明显；小叶通常4枚，椭圆形至倒卵形。花黄色，单生或簇生于叶腋，花冠蝶形。荚果长椭圆形，种子1 ~ 4颗。

羽状复叶

荚果长椭圆形

花黄色

性味归经：甘、淡，平。归肝经。

功能主治：清热解毒，宁神降压。主跌打损伤、痈肿疮毒、失眠、高血压。

用法用量：30 ~ 60克，水煎服。外用取鲜品适量捣敷患处。

生境：常见栽培。

科：豆科	种： <i>Vicia unijuga</i> A. Brown	药名：歪头菜	别名：两叶豆苗、三铃子、草豆、野豌豆
歪头菜 药用部位：全草。 植物特征：多年生草本。偶数羽状复叶，仅有小叶1对，叶轴末端的卷须不发达。小叶菱卵形、椭圆形或卵状披针形。总状花序，腋生，有花8 ~ 20朵，花冠蓝色或蓝紫色。荚果线状长圆形，先端有短喙。 性味归经：甘，平。归肝、胃、肾经。 功能主治：补虚调肝，理气止痛，清热利尿。用于头晕、体虚浮肿、胃痛。外用治疗疖。 用法用量：15 ~ 25克，水煎服。外用适量捣敷患处。 生境：路边草丛或田野。  花冠蓝色 小叶菱卵状			

科：豆科	种： <i>Vicia cracca</i> L.	药名：广布野豌豆	别名：草藤、细叶落豆秧、肥田草、透骨草
广布野豌豆 药用部位：全草。 植物特征：一年生或多年生蔓生草本。有微毛。羽状复叶有卷须；小叶狭椭圆形或狭披针形。总状花序腋生，有花7 ~ 15朵；花萼斜钟形，花冠紫色或蓝色。荚果长圆形，褐色，肿胀，两端急尖；种子3 ~ 5颗，黑色。 性味归经：甘，平。归肝、膀胱经。 功能主治：散风祛湿，活血止痛。主治风湿筋骨疼痛、阴囊湿疹及疮毒等症。 用法用量：15 ~ 25克，水煎服。 生境：田边、山坡上。  小叶狭椭圆形 花冠蓝色			

科：豆科	种： <i>Caragana rosea</i> Turcz.	药名：红花锦鸡儿	别名：金雀儿
------	---------------------------------	----------	--------

红花锦鸡儿

药用部位：根。

植物特征：落叶灌木。长枝上的托叶成针刺状，短枝上的托叶脱落；小叶4，假掌状排列，椭圆状倒卵形，先端有短尖刺。花单生，花萼筒状，花冠蝶形，黄色，常带紫红或淡红色，凋时变为红色。荚果圆筒形，具尖刺，无毛。

性味归经：甘、微辛，平。归肝、脾经。

功能主治：健脾，益肾，通经，利尿。主治虚损劳热、咳嗽、淋浊、阳痿、妇女血崩、白带、乳少、子宫脱垂。

用法用量：6 ~ 24克，水煎服。



生境：低山区阳坡上。

科：豆科	种： <i>Oxytropis hirta</i> Bunge	药名：硬毛棘豆	别名：毛棘豆
------	---------------------------------	---------	--------

花多而密集

硬毛棘豆

药用部位：地上部分。

植物特征：多年生草本。无地上茎，全株被长硬毛。单数羽状复叶，基生；小叶卵状披针形或长椭圆形，先端锐尖，基部圆形。总状花序长穗状，花多而密集，花淡紫色或淡黄色，花萼筒状，花冠蝶形。荚果藏于萼内，长卵形，密被长毛。

性味归经：苦、甘，凉。归肝、肺经。

功能主治：用于瘟疫，丹毒，腮腺炎，“发症”，阵刺痛，肠刺痛，脑刺痛，麻疹，创伤，抽筋，鼻出血，月经过多，吐血，咯血。

用法用量：1.5 ~ 3克，研末冲服，或入散剂。

单数羽状复叶



生境：山坡、丘陵、山地林缘草甸、草甸草原。

科：豆科	种： <i>Glycyrrhiza pallidiflora</i> Maxim.	药名：刺果甘草	别名：胡苍耳、马狼秆、马狼柴、狗甘草
------	---	---------	--------------------

刺果甘草



药用部位：根、果实。

植物特征：多年生草本。茎直立，有条棱。羽状复叶，小叶披针形或宽披针形。总状花序腋生，花紧密，花萼钟状，花冠蓝色。荚果卵形，褐色，果表面密生尖刺。荚果排列成疏松的椭圆形果序。种子2，黑色。

性味归经：甘、辛，温。归肾、膀胱、肝经。

功能主治：① 果：催乳。用于乳汁缺少。② 根：杀虫。外用治阴道滴虫病。

用法用量：果10 ~ 15克，水煎服。根外用适量煎水熏洗。

生境：路边、田边、河边草丛中。

科：豆科	种： <i>Glycyrrhiza Uralensis</i> Fisch. <i>G. Glabra</i> L.	药名：甘草	别名：美草、蜜甘、蜜草、落草、国老、灵通、粉草、甜草、甜根子、棒草
------	--	-------	-----------------------------------

甘草

药用部位：根、根茎。

植物特征：多年生草本。根及根茎粗壮，皮红棕色。奇数羽状复叶，小叶卵形或宽卵形。花密集，花冠蓝紫色。荚果条形，呈镰刀状或环状弯曲。

性味归经：甘，平。归脾、胃、心、肺经。

功能主治：补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药。用于脾胃虚弱、心悸气短、咳嗽痰多、脘腹、四肢挛急疼痛。



用法用量：3 ~ 9克（大剂量30 ~ 60克），水煎服。外用适量煎水洗，或研末敷。

使用注意：不宜与京大戟、芫花、甘遂、海藻同用。



生境：荒漠沙地。

科：豆科	种： <i>phaseolus coccineus</i> L. <i>P. multiflorus</i> willd	药名：红花菜豆	别名：多花菜豆、荷包豆、龙爪豆
------	---	---------	-----------------

红花菜豆

药用部位：种子。

植物特征：多年生草本。缠绕茎。羽状3出复叶，互生，顶生小叶卵形，侧生小叶斜卵形，叶形不对称，小叶全缘。花冠鲜红色，蝶形，多数密集聚生成总状花序，腋生。荚果长条形，略弯曲，种子肾形，黑红色，有红色花纹。

性味归经：甘，平。归肝、肾经。

功能主治：滋补肝肾。主治脾胃虚弱、小便不利。

用法用量：15 ~ 30克，研末冲服或水煎服。



生境：常见栽培。

科：豆科	种： <i>Lathyrus quinquenervius</i> (Miq.) Litv. ex Kom. et Alis.	药名：五脉山黧豆	别名：紫地丁
------	--	----------	--------

五脉山黧豆

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。根状茎细而稍弯，常横走于地下。茎单一，直立或上升。偶数羽状复叶，小叶长圆状披针形至线状披针形，全缘，基部楔形，上部渐狭，先端锐尖或钝，具短刺尖。总状花序腋生，花冠蓝紫色或紫色。荚果长圆状线形，直或微弯；种子椭圆形。

性味归经：苦、涩，温。归肝经。

功能主治：祛风除湿，止痛。主治关节炎、头痛。

用法用量：5 ~ 25克，水煎服。

使用注意：种子有毒，服用谨慎。



生境：林缘、草甸、沙地、山坡。

科：牛儿苗科	种： <i>Erodium stephanianum</i> Willd.	药名：老鹳草	别名：长嘴老鹳草
--------	---------------------------------------	--------	----------

牻牛儿苗

药用部位：地上部分的干燥全草。

植物特征：草本。茎纤弱，节明显。叶对生，2回羽状全裂，裂片5～9，基部下延，再成羽状分裂。花2～5朵成伞形排列，顶生或腋生；总苞6～7片，披针形，具缘毛；花瓣5，蓝紫色。蒴果，先端长喙状。

性味归经：苦、辛，平。归肝、大肠经。

功能主治：祛风，活血，清热解毒。治风湿疼痛、拘挛麻木、痈疽、跌打、肠炎、痢疾。

用法用量：10～25克，水煎、浸酒或熬膏。



生境：林下或田野路旁。

科：蒺藜科	种： <i>Tribulus terrestris</i> L.	药名：白蒺藜	别名：硬蒺藜、蒺骨子
-------	----------------------------------	--------	------------

蒺藜

药用部位：果实。

植物特征：一年生匍匐草本。多分枝，全株有柔毛。羽状复叶互生或对生；小叶5～7对，长椭圆形，基部常偏斜，有托叶。花单生于叶腋，萼片5，花瓣5，黄色，早落。

性味归经：辛、苦，微温。归肝经。

功能主治：平肝解郁，活血祛风，明目，止痒。用于头痛眩晕、胸胁胀痛、乳闭乳痈、目赤翳障、风疹瘙痒。

用法用量：6～9克，研末，单服或入丸、散。外用适量，煎汤洗。



生境：田野、路旁及河边草丛。

科：蒺藜科	种： <i>Nitraria tangutorum</i> Bobr.	药名：白刺果	别名：酸胖、白茨
-------	-------------------------------------	--------	----------

白刺

药用部位：果实。

植物特征：匍匐性小灌木。叶互生，密生在嫩枝上，4 ~ 5簇生，倒卵状长椭圆形，全缘，肉质，被细绢毛，无叶柄，托叶早落。花序顶生，蝎尾状聚伞花序，萼绿色，萼片三角形，花瓣黄白色。果实近球形，径5毫米左右，成熟时初为红色，后为黑色。

性味归经：甘、酸，温。归肺、胃经。

功能主治：健脾胃，助消化，安神解表，下乳。主治失眠健忘、脾胃虚弱、乳汁不下等症。

用法用量：5 ~ 25克，水煎服。

生境：沙漠边缘。



科：芸香科	种： <i>Zanthoxylum bungeanum</i> Maxim.	药名：花椒	别名：大红袍、川椒
-------	--	-------	-----------

花椒

药用部位：果实。

植物特征：高大灌木或小乔木。枝上有短刺。叶有小叶5 ~ 11，小叶对生，卵形，椭圆形至广卵圆形，边缘有细圆锯齿。花序顶生，花被片4 ~ 8，雄花雄蕊5 ~ 7；雌花心皮4 ~ 6。果成熟时红色至紫红色，密生疣状突起的油点。

性味归经：辛，温。归脾、胃、肾经。

功能主治：温中止痛，杀虫止痒。用于脘腹冷痛、呕吐泄泻、虫积腹痛、蛔虫症。外治湿疹瘙痒。

用法用量：3 ~ 6克，水煎或研末服用。外用适量煎汤熏洗患处。



生境：山坡灌木丛中或向阳地、路旁。

科：芸香科	种： <i>Dictamnus dasycarpus</i> Turcz.	药名：白鲜皮	别名：白廔
-------	---------------------------------------	--------	-------

白鲜

药用部位：根皮。

植物特征：草本。下部类似灌木状。叶互生，奇数羽状复叶，小叶卵圆至椭圆形。花淡红或白色，顶生总状花序。蒴果。

性味归经：苦，寒。归脾、胃、膀胱经。



花淡红

药材

功能主治：清热燥湿，祛风解毒。用于湿热疮毒、黄水淋漓、湿疹、风疹、疥癣疮癩、风湿热痹、黄疸尿赤。

用法用量：4.5 ~ 9克，水煎或入丸、散。外用适量，煎汤洗或研粉敷。

生境：阔叶林边和沟谷湿地。

科：芸香科	种： <i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	药名：黄柏	别名：黄菠萝
-------	--	-------	--------

黄檗

药用部位：树皮。

植物特征：乔木。树皮外层灰色并带有甚厚的木栓层。叶对生，羽状复叶，小叶卵状披针形或近卵形。花单性。核果圆球形。

性味归经：苦，寒。归肾、膀胱经。

功能主治：清热燥湿，解毒疗疮。



小叶卵状披针形

核果圆球形

用于湿热泻痢、黄疸、带下、热淋、脚气、骨蒸劳热、盗汗、遗精、疮疡肿毒、湿疹瘙痒。

用法用量：3 ~ 12克，水煎、研末或入丸、散。外用适量煎汤洗。

使用注意：脾虚泄泻，胃弱食少者忌服。

生境：山野林中。

科：芸香科	种： <i>Poncirus trifoliata</i> (L.) Raf.	药名：枳实、枳壳	别名：枳、臭橘
-------	---	----------	---------

枸橘

药用部位：果实。

植物特征：灌木或小乔木。茎枝具粗大腋生的棘刺。3出复叶，花通常先叶开放，花瓣5，白色。柑果圆球形，熟时黄色，芳香。

性味归经：辛、苦，温。归肝、胃、大肠经。



3出复叶

药材

柑果圆球形

茎枝具腋生棘刺

功能主治：毒抗癌、理气止痛、消肿散结。用于癌瘤积毒、乳腺癌、胃肠气痛、治脘腹满痛；肿瘤结核、淋巴结核。

用法用量：3 ~ 9克，煎汤内服。

使用注意：脾胃虚弱者及孕妇慎用。

生境：常见栽培。

科：芸香科	种： <i>Citrus medica</i> L.	药名：香橼	别名：枸橼、香圆
-------	----------------------------	-------	----------

香橼

药用部位：果皮。

植物特征：常绿小乔木。叶大，互生，革质；叶片长圆形或长椭圆形。短总状花序，顶生及腋生，花3 ~ 10朵丛生，有两性花及雄花之分，花瓣5，肉质，白色，外面淡紫色。柑果长椭圆形或卵圆形，果顶有乳状突起，熟时柠檬黄色，果皮粗厚而芳香，果汁黄色，味极酸而苦；种子卵圆形。

性味归经：辛、苦、酸，温。归肝、脾、肺经。

功能主治：舒肝理气，宽中，化痰。用于肝胃气滞，胸胁胀痛，脘腹痞满，呕吐噎气，痰多咳嗽。

用法用量：3 ~ 9克，水煎服或研末，入丸、散。



生境：常见栽培。

科：苦木科	种： <i>Ailanthus altissima</i> (Mill) Swingle	药名：樗树子	别名：樗
-------	--	--------	------

臭椿

药用部位：果实。

植物特征：落叶乔木。奇数羽状复叶，互生，小叶13 ~ 25枚，卵状披针形，中上部全缘，近基部有1 ~ 2对粗锯齿。圆锥花序顶生，花白色。翅果扁平，长椭圆形。

性味归经：苦，凉。归胃、膀胱经。

功能主治：清热利尿，止痛，止血。用于胃痛、便血、尿血；外用治阴道滴虫。

用法用量：10 ~ 15克，水煎服或研末。外用适量，煎水冲洗。



生境：杂木林中，常见栽培。

科：苦木科	种： <i>Picrasma quassioides</i> (D. Don) Benn.	药名：苦木	别名：土樗子、苦皮树、苦胆木、熊胆树
 羽状复叶 苦木 药用部位：枝、叶。 植物特征：落叶乔木。叶互生，羽状复叶，小叶卵形或卵状椭圆形。伞房状总状花序腋生，花单性异株。核果倒卵形，3～4个并生，蓝至红色，有宿萼。 性味归经：苦，寒，有小毒。归肺、大肠经。 功能主治：清热，祛湿，解毒。 用于风热感冒、咽喉肿痛、腹泻下痢、湿疹、疮疖、毒蛇咬伤。 用法用量：4.5～9克，研末或水煎服。 外用适量研末用猪油调。 使用注意：有毒，不宜过量或持续服用。肝炎、肾炎患者慎服。 生境：路旁、坡脚，或栽于屋旁、篱边。  总状花序 伞房状			

科：远志科	种： <i>Polygala tenuifolia</i> Willd.	药名：远志	别名：细叶远志
 花紫色 远志 药用部位：根。 植物特征：多年生草本。茎由基部丛生、斜生或直立。叶互生，线形至狭线形，全缘。总状花序有稀疏的花，花绿白色带紫。蒴果扁卵圆形，有翅。 性味归经：苦、辛、涩，温。归心、肾、肺经。 功能主治：安神，益智，祛痰，消肿。用于惊悸健忘、多梦失眠、咳痰不爽、痰湿痲肿。 用法用量：3～9克，研末吞服或水煎服。 生境：山坡草丛、路旁或河岸。  叶互生			

科：大戟科	种： <i>Euphorbia humifusa</i> Willd.	药名：地锦草	别名：血见愁、红丝草、奶疮草、奶浆草
 聚伞花序 叶对生 地锦草 药用部位：地上部分全草。 植物特征：一年生葡萄草本。有白色乳汁。茎纤细，近基部分枝，带紫红色，无毛。叶对生，长圆形，边缘有细齿，绿色或带红色。杯状聚伞花序单生，总苞倒圆锥形，淡红色。蒴果三棱状球形，无毛。种子卵形，黑褐色。 性味归经：辛，平。归肝、大肠经。 功能主治：清热解毒，凉血止血。用于痢疾、肠炎、咳血、尿血、便血、崩漏、痈肿疮疖。 用法用量：9 ~ 20克（鲜品30 ~ 60克），水煎服。外用适量捣敷患处。  叶长圆形 生境：平原荒地、路边、田间。			

科：大戟科	种： <i>Euphorbia lathyris</i> L.	药名：续随子	别名：千金子、拒冬、小巴豆
 总状花序 顶生 续随子 药用部位：种子。 植物特征：二年生草本。茎下部叶密生，狭披针形，全缘，无柄；上部的叶交互对生，宽披针形，多少抱茎。总花序3 ~ 4梗成伞形顶生，基部2 ~ 4叶轮生，卵状披针形，端渐尖，每伞梗有2三角状卵形苞片。蒴果三棱状球形，光滑；种子椭圆形。 性味归经：辛，温，有小毒。归肝、肾经。 功能主治：行水消肿，破血散瘀。用于水肿、痰饮积滞胀满、二便不通、血瘀闭经。 用法用量：1 ~ 3克，多入丸、散。  叶无柄 蒴果三棱状球形，光滑 生境：多见栽培。			

科：大戟科	种： <i>Euphorbia peginensis</i> Rupe.	药名：大戟	别名：京大戟
-------	--------------------------------------	-------	--------

大戟

药用部位：根。

植物特征：草本。全株含有白色乳汁。根细长，圆锥状。茎直立，单叶互生，长圆形或披针形，全缘，下面稍被白粉。杯状聚伞花序，通常5枝，排列成复伞形；雌、雄花均无花被，基部苞叶近肾形。蒴果三棱状球形；种子卵圆形，灰褐色。

性味归经：苦，寒。有毒。归肺、脾、肾经。



功能主治：泻水逐饮，消肿散结。主水肿胀满、二便不通、形证俱实者，也可用于痰饮积聚、胸膈胀满、胁肋隐痛、痈肿疮毒及痰火瘰癧。

用法用量：1.5 ~ 3克，研末或煎服。

使用注意：患虚寒阴水者及孕妇忌服；体弱者慎用。

生境：山坡、路旁、荒地、草丛、林缘及疏林下。

科：大戟科	种： <i>Euphorbia kansui</i> T. N. Liou ex T. P. Wang	药名：甘遂	别名：重泽、苦泽
-------	---	-------	----------

甘遂

药用部位：根。

植物特征：多年生肉质草本。根细长。茎直立，淡紫红色。单叶互生，狭披针形或线状披针形，全缘。聚伞花序，苞叶三角状卵形，全缘；总苞杯状，花单性。蒴果圆形。

性味归经：苦，寒，有毒。归肺、肾、大肠经。

功能主治：泻水逐饮。用于水肿胀满、胸腹积水、痰饮积聚、气逆喘咳；外用治痈肿疮疡。

用法用量：2.5 ~ 5克，水煎服或入丸、散。外用研末调敷患处。

使用注意：孕妇禁用；不宜与甘草同用。



生境：山沟荒地。

科：大戟科	种： <i>Euphorbia helioscopia</i> L.	药名：泽漆	别名：五朵云、猫儿眼草、奶浆草
-------	------------------------------------	-------	-----------------

泽漆

药用部位：全草。

植物特征：一年生或二年生草本。全株含乳汁。茎基部分枝，带紫红色。叶互生，倒卵形或匙形，先端微凹，边缘中部以上有细锯齿，无柄。杯状花序组成聚伞状，顶生或腋生，顶生者伞梗5，总苞杯状；子房3室，花柱3。蒴果无毛，种子卵形。


性味归经：辛、苦，微寒，有毒。
归肺、小肠、大肠经。

功能主治：利尿消肿，化痰散结，杀虫止痒。用于腹水、水肿、肺结核、颈淋巴结核、痰多喘咳、癣疮。

用法用量：5 ~ 15克，水煎或研末。外用适量熬膏外涂。

使用注意：孕妇忌服。

生境：沟边、路旁、田野。



总苞杯状
顶生花序具伞梗5



杯状花序
聚伞状

科：漆树科	种： <i>Toxicodendron succedaneum</i> (L.) O. Kuntze	药名：野漆	别名：漆树
-------	--	-------	-------

野漆树

药用部位：根、叶、树皮及果。

植物特征：落叶小乔木或灌木。小枝粗壮，无毛。叶螺旋状互生，密集于枝端，小叶对生，薄革质，长椭圆状披针形或广披针形，全缘。圆锥花序腋生，花序梗光滑。核果扁平，斜菱状圆形，淡黄色，光滑无毛；果皮薄，干时有皱纹。

性味归经：苦、涩，平，有小毒。归肝、胃、肺经。

功能主治：平喘，解毒，散瘀消肿，止痛止血。用于哮喘，急、慢性肝炎，胃痛，跌打损伤；外用治骨折、创伤出血。

用法用量：10 ~ 15克，水煎服。外用适量，捣烂敷患处。

使用注意：漆树过敏者慎用。

生境：山坡林中。



叶全缘
叶广披针形

科：漆树科	种： <i>Cotinus coggyria</i> Scop.	药名：黄栌	别名：红叶
-------	----------------------------------	-------	-------

黄栌

药用部位：根、树枝及叶。

植物特征：落叶灌木或小乔木。树冠圆形；树皮暗灰褐色，被蜡粉。单叶互生，通常倒卵形，秋天变红色。花小，杂性，黄绿色。核果肾形。

性味归经：辛、苦，凉。归肝经。

功能主治：清热解毒，散瘀止痛。用于急性黄疸型肝炎、慢性肝炎（迁延性肝炎）、无黄疸肝炎、麻疹不出、丹毒、漆疮等。

用法用量：5～15克，水煎服。外用枝、叶煎水洗或叶捣烂敷患处。



生境：低山区树林中。

科：卫矛科	种： <i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	药名：冬青卫矛	别名：大叶黄杨
-------	-------------------------------------	---------	---------

冬青卫矛

药用部位：茎、叶。

植物特征：常绿灌木或小乔木。小枝近四棱形。叶片革质，表面有光泽，倒卵形或狭椭圆形，边缘有细锯齿。花绿白色，5～12朵排列成密集的聚伞花序，腋生。蒴果近球形，有4浅沟；种子棕色，假种皮橘红色。

性味归经：苦、甘，温。归肝、脾、肾经。

功能主治：散瘀止血，舒筋活络。用于咯血、月经不调、功能性子宫出血、风湿性关节痛；外用治跌打损伤、骨折、创伤出血。

用法用量：10～20克，水煎或泡酒服。外用适量，研粉撒患处或捣烂敷患处。

花绿白色



叶表面有光泽



生境：林下。

科：卫矛科	种： <i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Sieb.	药名：鬼箭羽	别名：鬼箭、四棱锋
-------	--	--------	-----------



叶对生

木栓质
阔翅

蒴果

卫矛

药用部位：木栓翅。

植物特征：落叶灌木。小枝四棱形，有2~4排木栓质的阔翅。叶对生，叶片倒卵形至椭圆形，边缘有细尖锯齿；早春初发时及初秋霜后变紫红色。花黄绿色，常3朵集成聚伞花序。蒴果棕紫色；种子褐色，有橘红色的假种皮。

性味归经：苦，寒。归足厥阴经。

功能主治：破血，通经，杀虫。治经闭、症瘕、产后淤滞腹痛、虫积腹痛。

用法用量：7~15克，水煎服或入丸、散。

使用注意：孕妇忌服。

花黄绿色

生境：山野林中。

科：七叶树科	种： <i>Aesculus chinensis</i> Bunge	药名：梭罗子	别名：杪罗树、天师栗、猴板栗
--------	------------------------------------	--------	----------------



小叶长椭圆
状倒披针形

掌状复叶

七叶树

药用部位：种子。

植物特征：落叶乔木。树皮灰褐色，片状剥落。掌状复叶对生，小叶倒卵状长椭圆形至长椭圆状倒披针形。花小，花瓣4，不等大，白色，上面2瓣常有橘红色或黄色斑纹。蒴果球形或倒卵形，密生疣点，黄褐色，粗糙，无刺，也无尖头，内含1或2粒种子，形如板栗。

性味归经：甘，温。归脾、肺经。

功能主治：宽中，理气，杀虫。治胃寒作痛、脘腹胀满、疳积虫痛、疟疾、痢疾。

用法用量：5~15克，水煎服或烧存性研末。

花小，白色

生境：常见栽培。

科：凤仙花科	种： <i>Impatiens noli-tangere</i> L.	药名：水金凤	别名：黄凤仙
--------	-------------------------------------	--------	--------

水金凤

药用部位：全草。

植物特征：一年生草本。茎直立，光滑，柔软，多分枝。叶互生，质薄而软，狭长椭圆形至卵形。先端钝或稍锐尖，基部楔形，边缘具粗锯齿。花黄色，从叶腋伸出，聚伞状花序，中央花瓣圆形。蒴果棒状，两端尖，无毛。种子深褐色。

性味归经：甘，温。归肝、肺经。

功能主治：活血调经，舒筋活络。用于月经不调、痛经；外用治跌打损伤、风湿疼痛、阴囊湿疹。

用法用量：15 ~ 25克，水煎服。外用适量，煎汤熏洗或捣烂敷患处。治阴囊湿疹用鲜品捣烂取汁外搽。



生境：水边潮湿处。

科：鼠李科	种： <i>Paliurus ramosissimus</i> (Lour.) Poir	药名：马甲子根	别名：铁篱笆、笏仔、雄虎刺
-------	--	---------	---------------

马甲子

药用部位：根。

植物特征：落叶灌木。叶互生，阔卵形，边缘有锯齿，表面深绿色，有光泽。花淡黄绿色，腋生聚伞花序，花冠5瓣，绿色，花盘黄色，甚显著，雄蕊5枚；子房大部陷入花盘之内，子房圆形，上位，3室。木质蒴果，扁圆形，边缘有浅翅。

性味归经：苦，平。归心，肺经。

功能主治：祛风除湿，活血解毒，行气止痛。主治喉痛、肠风下血、风湿、跌打损伤。

用法用量：10 ~ 15克（鲜品50 ~ 100克），水煎服或浸酒。外用浸酒涂擦。



生境：丘陵林边灌丛中，或荒山草地。

科：鼠李科	种： <i>Ziziphus psinosa</i> Hu	药名：酸枣仁	别名：山枣
-------	-------------------------------	--------	-------

酸枣

药用部位：种子。

植物特征：落叶灌木或小乔木。叶互生，长椭圆形至簇状披针形，边缘有细锯齿，基出3脉。花黄绿色，常2 ~ 3朵簇生于叶腋。核果小，长圆形或近圆形，暗红色，味酸，果核两端常为钝头。

性味归经：甘、酸，平。归心、脾、肝、胆经。

功能主治：养心，安神，敛汗。用于神经衰弱、失眠、多梦、盗汗。

用法用量：6 ~ 15克，水煎服；
3 ~ 5克，研末或入丸、散。




生境：向阳或干燥山坡、平原、路旁。

科：鼠李科	种： <i>Hovenia acerba</i> Lindl.	药名：枳椇子	别名：枳椇
-------	---------------------------------	--------	-------

拐枣

药用部位：果实。

植物特征：落叶乔木。嫩枝、幼叶背面、叶柄和花序轴初有短柔毛，后脱落。叶片椭圆状卵形、宽卵形或心状卵形，边缘有细锯齿，背面沿叶脉或脉间有柔毛。聚伞花序顶生和腋生；花小，黄绿色，花瓣扁圆形。果柄肉质，扭曲，红褐色；果实近球形，无毛，灰褐色。



性味归经：甘、酸，平。归心、脾、胃经。

功能主治：止渴除烦，利小便，解酒毒。用于口干烦渴、反胃呕吐、小腹拘急、热痢、小便不利、酒醉。

用法用量：5 ~ 10克，水煎服。

生境：向阳山坡、山谷、沟边及路旁，或栽培。

科：鼠李科	种： <i>Rhamnus davulrica</i> Pall	药名：鼠李	别名：大绿
-------	----------------------------------	-------	-------

鼠李

药用部位：果实。

植物特征：落叶灌木或小乔木。叶近对生，倒卵状长椭圆形至卵状椭圆形，先端锐尖，基部楔形，缘有细圆齿。花黄绿色，3 ~ 5朵簇生叶腋。果实球形，熟时紫黑色；种子2，卵形，背面有沟。

性味归经：苦、甘，凉。归肝、肾经。

功能主治：清热利湿，消积杀虫。治水肿腹胀、疝瘕、瘰癧、疥癣、齿痛。

用法用量：10 ~ 20克，水煎服、研末或熬膏。外用适量捣敷患处。



生境：山地杂木林中。

科：葡萄科	种： <i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv	药名：山葡萄	别名：草龙珠、蒲桃、山葫芦
-------	---	--------	---------------

山葡萄


药用部位：果实。

植物特征：木质藤本。树皮成条状剥落，有分枝卷须。单叶互生，圆卵形，3中裂。圆锥花序；花小，黄绿色，花瓣5。浆果球形或长圆形。

性味归经：甘、酸，平。归肺、脾、肾经。

功能主治：补气血，强筋骨，益肝阴，利小便，舒筋活血，暖胃健脾，除烦解渴。主治气血不足、脾胃虚弱、口干口苦等症。

用法用量：50 ~ 100克，捣汁服用。



生境：山地林中。

科：葡萄科	种： <i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Sieb. et Zucc.) Planch.	药名：地锦藤	别名：爬墙虎、地锦、飞天蜈蚣
-------	--	--------	----------------

爬山虎

药用部位：根茎。

植物特征：多年生大型落叶木质藤本植物。枝条粗壮，卷须短，多分枝，顶端有吸盘。叶互生，花枝上的叶宽卵形，基部心形常3裂，幼枝上的叶较小，常不分裂。聚伞花序常着生于两叶间的短枝上，花5数，花瓣顶端反折。浆果小球形，熟时蓝黑色。

性味归经：甘、涩，温。

功能主治：祛风通络，活血解毒。用于风湿关节痛；外用跌打损伤、痈疖肿毒。

用法用量：25 ~ 50克，水煎或泡酒服。外用取根皮适量捣烂，酒调敷患处。



生境：攀缘于岩石、大树或墙壁上。

科：葡萄科	种： <i>Ampelopsis japonica</i> (Thunb.) Makino	药名：白蔹	别名：猫儿卵、山地瓜
-------	---	-------	------------

白蔹

药用部位：块根。

植物特征：木质藤本。掌状复叶互生，小叶3 ~ 5，边缘疏生粗锯齿，叶轴有宽翅，两面无毛。聚伞花序与叶对生，序梗细长而缠绕；花小，花瓣5，淡黄色。浆果球形或肾形，熟时蓝色或白色，有针孔状凹点。

性味归经：苦、辛，微寒。归心、脾经。

功能主治：热解毒，消痈散结。用于痈疽发背、疗疮、瘰癧、水火烫伤。

用法用量：3 ~ 9克，水煎服。外用研末或调涂。

使用注意：脾胃虚寒及无实火者忌服。



生境：山野路旁草丛中。

科：锦葵科	种： <i>Althaea officinalis</i> L.	药名：药用蜀葵	别名：棋盘花
-------	----------------------------------	---------	--------

药用蜀葵

药用部位：根及果实。

植物特征：多年生草本。茎直立，密被星状长糙毛。叶片卵圆形或宽卵形，通常不分裂，边缘有锯齿，两面密被星状绒毛。花淡红色，花瓣5个，倒卵状矩圆形；雄蕊多数，花丝连合成筒；心皮多数。果盘形，熟时每心皮自中轴分离。种子肾形，红棕色。

性味归经：甘，凉。归肺、肾经。

功能主治：解表散寒，利尿，止咳，消炎解毒。治疮疖痈肿、咳嗽、气管炎和风寒感冒等。

用法用量：15 ~ 30克，水煎服。



生境：田野路旁，常见栽培。

科：锦葵科	种： <i>Abutilon theophrasti</i> Medic.	药名：苘麻	别名：白麻、青麻、野苧麻、八角乌、孔麻
-------	---------------------------------------	-------	---------------------

苘麻

药用部位：叶。

植物特征：一年生草本。茎直立，具软毛。叶互生，圆心形，先端尖，基部心形，边缘具圆齿，两面密生柔毛。花单生于叶腋，花萼绿色，下部呈管状，花瓣5，黄色。蒴果成熟后裂开；种子肾形、褐色，具微毛。



花瓣黄色



性味归经：苦，平。归肝、大肠经。

功能主治：解毒，祛风。治痢疾、中耳炎、耳鸣、耳聋、关节酸痛。

用法用量：15 ~ 50克，水煎服。外用适量捣敷患处。



生境：路旁、田野、荒地、堤岸上。

科：梧桐科	种： <i>Firmiana platanifolia</i> (L. f.) Marsili	药名：梧桐子	别名：青桐
-------	---	--------	-------

梧桐

药用部位：种子。

植物特征：落叶大乔木。树干挺直，树皮绿色，平滑。叶心形，3～5掌状分裂，裂片三角形，顶端渐尖，全缘，5出脉，背面有细绒毛。花小，黄绿色。蓇葖果4～5，纸质，叶状，有毛；种子形如豌豆，成熟时棕色，有皱纹。

性味归经：甘，平，无毒。归肝经。

功能主治：补气养阴，明目平肝，乌须发。主治肝火旺盛、白发早生。

用法用量：5～15克，研末吞服。



叶掌状分裂

生境：常见栽培为行道树。

科：猕猴桃科	种： <i>Actinidia arguta</i> (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Miq.	药名：软枣子	别名：青枣
--------	---	--------	-------

软枣猕猴桃

药用部位：果实。

植物特征：大藤本。无毛叶互生，叶片稍厚，卵圆形、椭圆形或长圆形，顶端锐尖或具长尾尖，边缘有锐锯齿，表面暗绿色。腋生聚伞花序，花3～6朵，花瓣5，白色，倒卵圆形。浆果球形至长圆形，光滑。

性味归经：甘、酸，寒。归肾经。

功能主治：解热，止渴，通淋。用于烦热、消渴、黄疸、石淋、痔疮。

用法用量：10～30克，捣汁内服。

生境：阔叶林或针阔混交林中。



叶片卵圆形



浆果光滑

科：猕猴桃科	种： <i>Actinidia chinensis</i> Planch.	药名：猕猴桃	别名：羊桃、猕猴桃梨、金梨
--------	---------------------------------------	--------	---------------

猕猴桃


药用部位：果实。

植物特征：藤本。幼枝及叶柄密被褐色毛或刺毛；老枝红褐色，光滑无毛。叶互生，营养枝上的阔卵圆形至椭圆形；花枝上的近圆形。花通常3 ~ 6朵，腋生，聚伞花序，少数为单生，初开时乳白色，后变为橙黄色。浆果卵状或近球形。

性味归经：甘、酸，寒。归肾经。

功能主治：解热，止渴，通淋。用于烦热、消渴、黄疸、石淋、痔疮。

用法用量：适量，水煎或捣汁服用。



生境：山坡、林缘或灌木丛中。

科：猕猴桃科	种： <i>Actinidia polygama</i> (Sieb. Et Zucc.) Miq.	药名：木天蓼子	别名：葛枣
--------	--	---------	-------

木天蓼

药用部位：带有虫瘿的果实。

植物特征：落叶藤本。单叶互生；叶片薄纸质，宽卵形至卵状长圆形。花1 ~ 3朵腋生，单性，雌雄异株或单性花与两性花共存，花瓣5 ~ 6，白色。浆果长圆形至卵圆形，黄色，有喙，无斑点，可食。

性味归经：辛、苦，温。归肝、肾经。

功能主治：祛风通络，活血行气，散寒止痛。主治中风口面歪斜、痿痹腹痛、疝气。

用法用量：6 ~ 9克，水煎服。



生境：山地林中。

科：堇菜科	种： <i>Viola yedoensis</i> Makino	药名：紫花地丁	别名：地丁、堇菜
-------	----------------------------------	---------	----------



紫花地丁

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。主根粗，黄白色。叶从根部丛生，上部两侧稍有翅，叶片长椭圆形、长卵形至线状广披针形，边缘具浅钝齿。花腋生，淡紫色。蒴果长圆形分裂为3果瓣。种子卵圆形，棕黄色，光滑。



性味归经：苦、辛，寒。归心、肝经。

功能主治：清热解毒，凉血消肿。用于疗疮肿毒、痈疽发背、丹毒、毒蛇咬伤。

用法用量：15 ~ 30克（鲜品30 ~ 60克），水煎服。外用适量捣敷患处。

使用注意：阴疽漫肿无头及脾胃虚寒慎服。

生境：草地或山坡。

科：堇菜科	种： <i>Viola acuminata</i> Ledeb.	药名：鸡腿堇菜	别名：鸡腿菜、胡森堇菜、红铧头草
-------	----------------------------------	---------	------------------



鸡腿堇菜

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。叶片心形、卵状心形或卵形，边缘具钝锯齿及短缘毛，两面密生褐色腺点，沿叶脉被疏柔毛。花淡紫色或近白色，具长梗，花瓣有褐色腺点。蒴果椭圆形。

性味归经：淡，寒。归肺、肾经。

功能主治：清热解毒，消肿止痛。主治肺热咳嗽、跌打肿痛、疮疖肿痛。

用法用量：15 ~ 25克，水煎服。外用适量捣烂敷患处。



生境：杂木林下或山坡草地，河谷湿地。

科：秋海棠科	种： <i>Begonia grandis</i> Dry. subsp. <i>sinensis</i> (A. DC.) Irmsch.	药名：红黑二丸	别名：野秋海棠
--------	--	---------	---------

中华秋海棠

药用部位：块根。

植物特征：多年生草本。球形块根，并有很多细长须根，肉质，少分枝。叶片宽卵形，薄纸质，先端渐尖，常呈尾状，偏斜。花单性，雌雄同株；聚伞花序腋生；花粉红色，雄花被片4，雄蕊多数，雌花被片5。蒴果有3翅。

性味归经：甘、苦，微寒。归肝、大肠经。

功能主治：活血止血。治跌打损伤、红崩白带、痢疾。

用法用量：内服煎汤，25 ~ 50克，水煎、浸酒或炖肉服。外用适量捣敷患处。



生境：潮湿山谷石缝。

科：瑞香科	种： <i>Edgeworthia chrysantha</i> Lindl.	药名：结香	别名：野蒙花、新蒙花
-------	---	-------	------------

结香

药用部位：根、花。

植物特征：落叶灌木。枝粗壮而柔软，常三叉分枝，枝上叶痕甚隆起。单叶互生，常集生于枝端，椭圆状倒披针形，先端钝尖，全缘。花黄色，外密被银白色毛，芳香，成下垂的头状花序，腋生枝端，叶前开花。

性味归经：甘，温。归肝、肾经。

功能主治：① 根：舒筋活络，消肿止痛。用于风湿性关节痛、腰痛；外用治跌打损伤、骨折。

② 花：祛风明目。用于目赤疼痛、夜盲。

用法用量：根15 ~ 25克，花10 ~ 15克，水煎服。外用适量捣烂敷患处。



生境：杂木林中，见有栽培。

科：瑞香科	种： <i>Stellera chamaejasma</i> L.	药名：瑞香狼毒	别名：狼毒
-------	-----------------------------------	---------	-------

瑞香狼毒

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。根圆柱形。单叶互生，狭卵形至线形，全缘，两面无毛；老时略带革质。头状花序顶生，花多数；萼常呈花冠状，白色或黄色，带紫红色。果卵形，为花被管基部所包。种子1枚。

性味归经：辛，温，有毒。
归手太阴，兼少阴经。

功能主治：清热解毒，
消肿，泻炎症，止溃疡，
祛腐生肌。熬膏内服用
于疔病、疖痈、瘰疬；
外用治顽癣、溃疡。

用法用量：0.5 ~ 1克。通常外用。

使用注意：三大毒药之一，内服宜慎；孕
妇禁用。

花萼常呈花冠状



生境：高山草地中。

科：瑞香科	种： <i>Diarrhron linifolium</i> Turcz.	药名：草瑞香
-------	---------------------------------------	--------

草瑞香

药用部位：全草。

植物特征：一年生草本。单叶互生，较稀疏，叶片线形至线状披针形，全缘，两面光滑。花小，成顶生总状花序，花梗极短；花萼筒瓶状，下部绿色，上部暗红色，顶端4裂，裂片卵状椭圆形，雄蕊4。小坚果卵形，黑色，有光泽，被残存的萼筒下部包围。

性味归经：苦、温。归肺经。

功能主治：清热解毒。民间用于感冒初起。

用法用量：10 ~ 25克，水煎服。



生境：固定沙丘及山谷间石砾滩地和山坡草地、灌丛间、林缘或柞林内。

科：瑞香科	种： <i>Wikstroemia chamaedaphne</i> Meisn.	药名：北堇花	别名：黄堇花
-------	---	--------	--------

河朔堇花

药用部位：花。

植物特征：落叶灌木。叶对生或近对生，几无柄，叶片披针形至条状披针形。穗状花序或圆锥花序顶生或腋生，被灰色短柔毛，花黄色。蒴果卵形。

性味归经：辛、苦，温，有毒。归肝、大肠经。

功能主治：逐水、涤痰、破积。用于驱虫。

用法用量：3 ~ 10克，研末冲服。

使用注意：不可过量长期服用。

花黄色

生境：低山区的向阳山坡或田边、路旁草丛中。

科：胡颓子科	种： <i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb.	药名：木半夏	别名：四月子、野樱桃
--------	---------------------------------------	--------	------------

木半夏

药用部位：果实。

植物特征：落叶灌木。单叶互生，叶柄锈色，叶膜质或纸质，椭圆形或卵形至卵状长圆形，全缘，花白色，常单生于新枝基部的叶腋。果实椭圆形，密被锈色鳞片，成熟时红色；果梗在花后伸长。

性味归经：淡、涩，温。归肺、大肠经。

功能主治：解毒消肿，活血行气。治肿毒、痢疾、痔疮、跌打损伤、哮喘。

用法用量：15 ~ 30克，水煎服。

叶全缘

果实椭圆形

生境：向阳山坡、灌木丛中。

科：胡颓子科	种： <i>Elaeagnus mollis</i> Diels	药名：翅果油	别名：木油果
--------	----------------------------------	--------	--------

翅果油树

药用部位：果实。

植物特征：落叶乔木。叶互生，卵形或卵状椭圆形，全缘。花两性，淡黄绿色，无花瓣，萼筒钟形，具8棱脊。果实核果状，干棉质，近圆形或宽椭圆形，有8个翅状棱脊，多毛；种子纺锤形，富含油脂。

性味归经：甘，平。归大肠经。

功能主治：润肠通便。治疗便秘。

用法用量：10 ~ 30克，水煎服。



生境：海拔800 ~ 1500米的山坡。

科：千屈菜科	种： <i>Lythrum salicaria</i> L.	药名：千屈菜	别名：水柳
--------	--------------------------------	--------	-------

千屈菜

药用部位：地上部分。

植物特征：多年生草本。多分枝，枝幼时有白色柔毛，后脱落。叶对生或3枚轮生，无柄；叶片狭披针形，顶端钝或短尖，基部圆形或心形，有时稍包茎。花紫色，为顶生大型的穗状花序，花瓣6。蒴果椭圆形，包于宿萼内，2裂，裂瓣上部再2裂；种子细小，无翅。

性味归经：苦，寒。归肝、胃经。

功能主治：清热毒，收敛，破经通淤。用于痢疾、淤血经闭。

用法用量：内服煎汤15 ~ 30克，水煎服。



生境：水边湿地。

科：八角枫科	种： <i>Alangium platanifolium</i> (Sieb. et Zucc.) Harms	药名：瓜木根	别名：白锦条、麻桐树
--------	--	--------	------------

瓜木

药用部位：根。

植物特征：灌木或小乔木。单叶互生，纸质，近圆形，稀阔卵形或倒卵形，不分裂或稀分裂，裂片钝尖、锐尖或尾状尖，边缘波状或钝齿状。聚伞花序腋生，通常3 ~ 5花，花瓣6 ~ 7，条形，白色，外面有短柔毛，基部粘合，上部反卷。核果长卵圆形，种子1。

性味归经：辛，微温，有毒。归肝经。

功能主治：祛风除湿，舒筋活络，散瘀止痛。用于风湿关节痛、跌打损伤、精神分裂症。

用法用量：5 ~ 15克，煎服或研末吞服。

使用注意：有毒，不可过量服用。孕妇忌服。



生境：沟谷或山坡。

科：菱科	种： <i>Trapa bicornis</i> Osbeck	药名：菱角	别名：水菱、风菱、乌菱
------	---------------------------------	-------	-------------

菱角

药用部位：果实。


植物特征：一年生浮叶水生植物。主根较弱，长约数尺伸入水底泥中。叶分两类，浮叶聚生于短缩茎上，浮出水面，倒三角形，相互镶嵌成一盘状，俗称“菱盘”。花白或红白色，花受精后花便向下弯曲，坚果。

性味归经：生者甘，凉，无毒；熟者甘，平，无毒。归胃、肠经。

功能主治：利尿通乳，止消渴，解酒毒。主治疮毒、赘疣。

用法用量：50 ~ 70克，水煎服。

使用注意：不可与猪肉同食，否则易腹痛。



生境：淡水池沼中。

科：月见草科	种： <i>Oenothera biennis</i> L. High	药名：月见草	别名：夜来香、山芝麻
--------	-------------------------------------	--------	------------

月见草

药用部位：地上部分。

植物特征：二年生草本。叶互生，茎下部的叶有柄，上部的叶近无柄；叶片长椭圆状披针形，先端短尖，基部楔形，边缘疏有细锯齿，两面均被白色柔毛。花单生于枝端叶腋，排成疏穗状，花瓣4，黄色，倒卵形或倒心形。蒴果圆筒形，先端狭，外被白色长毛。

性味归经：甘，温。归肝经。

功能主治：强筋壮骨、祛风除湿。治风湿病、关节痛。

用法用量：5 ~ 15克，煎服或泡酒。



生境：常见栽培。

科：锁阳科	种： <i>Cynomorium songaricum</i> Rupr.	药名：锁阳	别名：地毛球、锈铁棒、锁严子
-------	---------------------------------------	-------	----------------

锁阳

药用部位：肉质茎。

植物特征：多年生肉质寄生草本。全株棕红色。茎圆柱形，大部分埋于沙中，基部稍膨大，具互生鳞片。肉穗花序顶生，长圆柱状，暗紫红色，花杂性。果实坚果状。种子有胚乳。

性味归经：甘，温。归肝、肾、大肠经。

功能主治：补肾阳，益精血，润肠通便。用于骨蒸潮热、腿膝痿弱无力、肾虚阳痿及血枯便秘。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服。



生境：沙漠地带，大多寄生于蒺藜科植物白刺（*Nitraria sibirica* Pall.）等植物的根上。

科：五加科	种： <i>Acanthopanax senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Harms	药名：五加皮	别名：五加、刺拐棒
-------	--	--------	-----------

刺五加

药用部位：根皮。

植物特征：落叶灌木。茎密生细长倒刺。掌状复叶互生，小叶5，稀4或3，边缘具尖锐重锯齿或锯齿。伞形花序顶生，花多而密，花瓣5，卵形。浆果状核果近球形或卵形，后具5棱，有宿存花柱。



性味归经：辛、微苦，温。归脾、肾、心经。

功能主治：益气健脾，补肾安神。用于脾肾阳虚、体虚乏力、食欲不振、腰膝酸痛、失眠多梦。

用法用量：9 ~ 27克，水煎服。

生境：山地林下及林缘。

科：五加科	种： <i>Acanthopanax sessiliflorus</i> (Rupr. et Maxim.) Seem	药名：五加皮	别名：短梗五加
-------	--	--------	---------

无梗五加

药用部位：根皮、叶。

植物特征：落叶灌木。枝上有锥形的硬刺或无刺。掌状复叶，小叶3 ~ 5枚，矩圆状倒卵形或倒卵形至矩圆状倒披针形，有不规则锯齿。花暗紫色，几无柄，成密生球形头状花序生于有细毛的短梗上，通常数个生于小枝顶端。果黑色，阔椭圆形。

性味归经：辛、温。归肝、肾、胃、大肠经。

功能主治：败毒抗癌，祛风除湿，强筋壮骨。主治脾肾阳虚、体虚乏力、食欲不振、腰膝酸痛、失眠多梦。

用法用量：煎剂：6 ~ 15克。酒剂：18 ~ 25%，15 ~ 90克。散剂：2 ~ 4.5克。



生境：山地林下、林缘。

科：五加科

种： *Aralia cordata* Thunb

药名：土当归

别名：食用楸木

土当归

药用部位：根茎及根。

植物特征：多年生草本。根茎粗壮，横生，根茎下方散生多数圆柱形的根。茎有纵沟纹，分枝多，老枝近于无毛，幼枝疏生短柔毛。叶互生，2~3回羽状复叶，小叶心形，边缘有锯齿或重锯齿，两面疏生短柔毛。圆锥状复伞形花序顶生或腋生，花瓣6，白色或淡黄色，卵形。浆果圆球状，种子6粒。

性味归经：辛，温，无毒。归肺经。

功能主治：疏风清热，止咳祛痰。主治肺热咳嗽、气喘。

用法用量：6~9克，水煎服。

生境：杂木林中。



科：五加科

种： *Panax ginseng* C. A. Mey.

药名：人参

别名：棒槌

人参

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。主根肉质，圆柱形或纺锤形，须根细长；根状茎（芦头）短，上有茎痕（芦碗）和芽苞。掌状复叶，轮生，小叶3~5。伞形花序顶生，花小，花瓣5，淡黄绿色。核果浆果状。

性味归经：甘、苦，平。归脾、肺、心经。

功能主治：大补元气，复脉固脱，补脾益肺，生津，安神。用于体虚欲脱、肢冷脉微、脾虚食少、肺虚喘咳、津伤口渴、内热消渴、久病虚羸、惊悸失眠、阳痿宫冷；心力衰竭、心源性休克。

用法用量：3~9克，另煎兑入汤剂服；野山参研粉吞服，一次2克，一日2次。泡酒或入丸、散。

使用注意：实证、热症忌服。

生境：海拔数

百米的落叶阔

叶林或针叶阔叶混交林下，多见栽培。



科：伞形科	种： <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	药名：峨参	别名：土田七
-------	---	-------	--------

峨参

药用部位：根、叶。

植物特征：多年生草本。直根粗大。叶互生，2回3出式羽状分裂或2回羽状分裂；裂片披针状卵形。复伞形花序，顶生或腋生，花瓣5，白色。双悬果条状管形。

性味归经：甘、辛、微苦，微温。归脾、胃、肺经。

功能主治：补中益气，祛瘀生新。根：用于跌打损伤、腰痛、肺虚咳嗽、咳嗽咯血、脾虚腹胀、四肢无力、老人尿频、水肿；叶：外用治创伤。

用法用量：根20 ~ 25克，水煎服；叶外用适量，鲜叶捣烂或干叶研粉敷患处。

使用注意：邪实而正气未虚者忌用。



生境：中山区的阴处或半阴处。

科：伞形科	种： <i>Bupleurum chinense</i> DC.	药名：柴胡	别名：竹叶柴胡
-------	----------------------------------	-------	---------

北柴胡

药用部位：根茎。

植物特征：多年生草本。主根较粗大，棕褐色，质坚硬。基生叶倒披针形或狭椭圆形，早枯落；茎中部叶倒披针形或广线状披针形。复伞形花序，花柱基深黄色。果广椭圆形，棕色，两侧略扁。

性味归经：苦、微寒。归肝、胆经。

功能主治：和解表里，疏肝，升阳。用于感冒发热、寒热往来、胸胁胀痛、月经不调、子宫脱垂、脱肛。

用法用量：10 ~ 25克，水煎服，或入丸、散。



生境：较干燥的山坡、田野及路旁等处。

科：伞形科	种： <i>Bupleurum smithii</i> Wolff.	药名：黑柴胡	别名：杨家坪柴胡
-------	------------------------------------	--------	----------

黑柴胡

药用部位：根茎。

植物特征：多年生草本。常丛生，根黑褐色，质松，多分枝。植株变异较大。叶多，质较厚，基部叶丛生，狭长圆形或长圆状披针形或倒披针形；中部的茎生叶狭长圆形或倒披针形。花瓣黄色。果棕色，卵形。

性味归经：苦，微寒。归肝、胆经。

功能主治：和解表里，疏肝，升阳。用于感冒发热、寒热往来、胸胁胀痛、月经不调、子宫脱垂、脱肛。

用法用量：6 ~ 9克，水煎服。

使用注意：肝阳上亢，肝风内动，阴虚火旺及气机上逆者忌用或慎用。



生境：高山草地和石缝。

科：伞形科	种： <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk.	药名：防风	别名：关防风、东防风
-------	---	-------	------------

防风

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。基生叶2 ~ 3回羽状分裂，最终裂片披针形，顶生叶简化，具扩展叶鞘。复伞形花序，花瓣白色。双悬果矩圆状宽卵形，扁平，侧棱具翅。

性味归经：甘、辛，温。归膀胱、肺、脾经。

功能主治：解表祛风，胜湿，止痉。用于感冒头痛、风湿痹痛、四肢拘挛、风湿瘙痒、破伤风。

用法用量：7 ~ 15克，水煎服，或入丸、散。外用适量研末调敷。



生境：草原、干燥山坡。

科：伞形科	种： <i>Foeniculum Vulgare</i> Mill	药名：小茴香	别名：小茴、小香、茴香苗、香丝菜、刺梦
茴香 药用部位：全草。 植物特征：草本。茎直立，上部分枝。基生叶丛生；茎生叶互生，3 ~ 4回羽状复叶。小花金黄色或白色，顶生或侧生。双悬果卵状长圆形。  性味归经：辛，温。归肝、肾、脾、胃经。 功能主治：温肝肾，暖胃气、散塞结，散寒止痛，理气和胃。用于寒疝腹痛、睾丸偏坠、妇女痛经、少腹冷痛、脘腹胀痛、食少吐泻等症。 用法用量：10 ~ 25克，水煎服。			
生境：常见栽培。			

科：伞形科	种： <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	药名：窃衣	别名：粘粘草、破子衣
窃衣 药用部位：果实。 植物特征：草本。叶片2 ~ 3回羽状全裂。复伞形花序有长梗，花瓣白色。双悬果卵形，密被钩状刺。 性味归经：苦、辛，微温，有小毒。归脾、大肠经。  功能主治：活血消肿，收敛杀虫。用于慢性腹泻、蛔虫病；外用治痈疮溃疡久不收口、阴道滴虫。 用法用量：10 ~ 15克，水煎服。外用适量捣敷。 使用注意：孕妇忌服。			
生境：山坡、路旁、林缘草地、草丛荒地、杂木林下。			

科：伞形科	种： <i>Ligusticum jeholense</i> Nakai et Kitag.	药名：藁本	别名：热河藁本
辽藁本 药用部位：根茎及根。 植物特征：草本。根圆锥形，表面深褐色。根茎较短。叶具柄，叶片宽卵形，2 ~ 3回3出式羽状全裂。复伞形花序顶生或侧生，花瓣白色，长圆状倒卵形。分生果背腹扁压，椭圆形。  性味归经：辛，温。归膀胱经。 功能主治：祛风，散寒，除湿，止痛。用于风寒感冒，巅顶疼痛，风湿肢节痹痛。 用法用量：3 ~ 9克，水煎服。			
生境：林下及草地。			

科：伞形科	种： <i>Ligusticum tenuissimum</i> (Nakai) Kitaga.	药名：细叶藁本	别名：山茴香
-------	---	---------	--------

细叶藁本

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。根分叉，深褐色，根颈短。茎直立，圆柱形，中空，具纵条纹，带紫色。基生叶具长柄，早枯；茎下部叶3 ~ 4回3出式羽状全裂，先端具小尖头。复伞形花序顶生或侧生，花瓣白色，倒卵形，先端微凹。分生果椭圆形，背棱突起，侧棱扩大成翅。



性味归经：辛、苦，温。归肺经。

功能主治：疏风除湿，散寒止痛。治疗风寒感冒、感冒夹湿、头痛、风寒湿痹。

用法用量：3 ~ 9克，水煎服或入丸、散。外用适量，煎汤洗或研细粉调涂。

生境：多石质山坡林下。

科：伞形科	种： <i>Carum carvi</i> L. f. carvi	药名：葛缕子	别名：山茴香
-------	-----------------------------------	--------	--------

葛缕子

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。根圆柱形，表皮棕褐色。基生叶及茎下部叶的叶片轮廓长圆状披针形，2 ~ 3回羽状分裂；茎中、上部叶与基生叶同形，较小，无柄或有短柄。小伞形花序有花5 ~ 15，花杂性，花瓣白色，或带淡红色。果实长卵形，成熟后黄褐色，果棱明显。

性味归经：辛、苦，温。归肺经。

功能主治：疏风除湿，散寒止痛。治疗风寒感冒、感冒夹湿、头痛、风寒湿痹。

用法用量：3 ~ 9克，水煎服。



生境：高山林下、草地。

科：伞形科	种： <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	药名：当归	别名：秦归、云归、西当归、岷当归
-------	---	-------	------------------



当归

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。基生叶及茎下部叶卵形，2 ~ 3回3出或羽状全裂；茎上部叶羽状分裂。花白色。双悬果。

性味归经：甘、辛，温。归心、肝、脾经。

功能主治：补血活血，调经止痛，润肠通便。用于月经不调、虚寒腹痛、肠燥便秘、风湿痹痛、跌打损伤。

用法用量：7 ~ 15克，水煎服、浸酒、熬膏或入丸、散。

使用注意：湿阻中满及大便溏泄者慎服。



生境：高寒多雨山区。

科：伞形科	种： <i>Angelica dahurica</i> Benth. et Hook	药名：白芷	别名：白茺
-------	--	-------	-------

白芷

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。根粗大，直生。茎下部的叶大，2 ~ 3回羽状分裂，最终裂片卵形至长卵形，边缘有尖锐的重锯齿；茎上部的叶较小。复伞形花序顶生或腋生，花瓣5，白色，卵状披针形。双悬果扁平椭圆形或近于圆形，分果具5果棱，侧棱成翅状。

性味归经：辛，温。归肺、脾、胃经。

功能主治：祛风，燥湿，消肿，止痛。治头痛、眉棱骨痛、齿痛、鼻渊、寒湿腹痛、肠风痔漏、赤白带下、痈疽疮疡、皮肤燥痒、疥癣。

用法用量：4 ~ 10克，水煎服或入丸、散。外用适量研末撒或调敷。

使用注意：阴虚血热者忌服。



生境：河岸、溪边，以及沿海的丛林砾岩上。

科：伞形科	种： <i>Aralia fargesii</i> Franch	药名：独活	别名：川独活、九眼独活
-------	----------------------------------	-------	-------------

独活

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。根粗厚而长。叶为1 ~ 3回羽状复叶，上部的叶为单叶或1回羽状复叶；小叶膜质，卵形至长圆状卵形，先端渐尖至长渐尖。花序顶生或腋生，花小，绿白色，花瓣5。果长圆形，黑色，具5棱。

性味归经：辛、苦，温。归肺、脾、肾经。

功能主治：疏风解毒，活血祛淤，止痛。用于痘疮、跌打损伤、头痛、腰痛等症。

用法用量：6 ~ 9克，水煎服。



生境：海拔1800 ~ 2800米的山坡疏林、灌丛中。

科：伞形科	种： <i>Heracleum moellendorffii</i> Hance	药名：独活	别名：独摇草、独滑、长生草
-------	--	-------	---------------

短毛独活

药用部位：根及根茎。

植物特征：多年生草本。根圆锥形，黄白色。茎绿色，表面有纵直沟纹及白色短毛。叶互生，1回羽状分裂，裂片3，广卵形或菱形，不规则的3 ~ 5裂，边缘有粗锯齿。复伞形花序顶生或腋生，花小，白色；花瓣5。双悬果倒卵状长圆形。

性味归经：辛、苦，温。归肾、膀胱经。

功能主治：祛风，胜湿，散寒，止痛。治风寒湿痹、腰膝酸痛、手脚挛痛、慢性气管炎、头痛、齿痛。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服，浸酒或入丸、散。外用煎水洗。

使用注意：阴虚血燥者慎服。



生境：山坡林下、林缘及山沟溪边。

科：伞形科	种： <i>Peucedanum terebinthaceum</i> (Fisch.) Fisch. ex Turcz. var. <i>terebinthaceum</i>	药名：石防风	别名：小芹菜、 山香菜
石防风 药用部位：根。 植物特征：多年生草本。根圆柱形或近纺锤形，灰黄色或黑褐色。叶互生；基出叶及茎下部叶具柄，叶片2回3出式羽状全裂，1回裂片卵形至披针形；茎上部叶简单，鞘狭倒卵形，不膨大。复伞形花序，花瓣5，白色，先端弯向内方。双悬果卵状椭圆形，无毛，背棱中棱肋状。 性味归经：苦、辛，凉。归肺、胃经。 功能主治：降气祛痰，发散风热。治感冒、咳嗽、支气管炎、胸胁胀满、喘息。 用法用量：5 ~ 15克，水煎服。 生境：山坡、林缘。 			

科：山茱萸科	种： <i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc.	药名：山萸肉、枣皮	别名：药枣
山茱萸  药用部位：果实。 植物特征：落叶小乔木或灌木。叶卵形至长椭圆形，先端渐尖。花先叶开放，伞形花序生于小枝顶端；总苞片4，黄绿色；花瓣4，黄色；雄蕊4；花盘环状，肉质；子房下位，2室。核果椭圆形，熟时深红色。 性味归经：酸、涩，温。归肝、肾经。 功能主治：补益肝肾，涩精固脱。用于眩晕耳鸣、腰膝酸痛、阳痿遗精、遗尿尿频、崩漏带下、大汗虚脱、内热消渴。 用法用量：5 ~ 10克，水煎服或入丸、散。 生境：阴湿沟畔、溪旁或向阳山坡灌丛中，有栽培。 			

科：鹿蹄草科	种： <i>Pyrola rotundifolia</i> ssp. <i>chinensis</i>	药名：紫背金牛草	别名：鹿含草、鹿安茶
--------	---	----------	------------

鹿蹄草

叶圆形



药用部位：全草。

植物特征：常绿草本。全体光滑无毛，根状茎细长呈匍匐状。叶基生，圆形或广椭圆形，带革质，叶背和叶柄灰蓝绿色。总状花序，花瓣白色，稍带粉红色。蒴果扁球形。

花瓣白色



性味归经：甘、苦，温。归肝、肾经。

功能主治：祛风湿，强筋骨，止血。用于风湿痹痛、腰膝无力、月经过多、久咳劳嗽。

用法用量：9 ~ 15克，水煎服。

生境：高山林下潮湿处。

科：杜鹃花科	种： <i>Rhodoendron micranthum</i> Turcz.	药名：照山白	别名：小花杜鹃
--------	---	--------	---------

照山白

药用部位：枝叶。

植物特征：半常绿灌木。叶互生，革质，椭圆状披针形或狭卵圆形，先端尖，边缘有疏浅齿或不明显。花密生成总状花序；花冠钟形，白色，5裂。蒴果长圆形，成熟后褐色，5裂，外面有鳞片。

花密生成总状花序



花白色

性味归经：苦，寒，有毒。归心、肺、大肠经。

功能主治：祛风，通络，止血。治支气管炎、痢疾、产后身痛、骨折。

用法用量：5 ~ 10克，水煎服。外用适量捣敷患处。

使用注意：有毒，内服需谨慎。孕妇忌服。

生境：干燥山坡上。

科：杜鹃花科	种： <i>Rhododendron mucronulatum</i> Turcz.	药名：迎山红	别名：蓝荆子、尖叶杜鹃
--------	--	--------	-------------

迎红杜鹃

药用部位：叶子。

植物特征：落叶灌木。树皮灰褐色。叶散生，质薄，椭圆形至长圆形。侧生花芽2 ~ 5个簇生枝顶，每芽生花1朵；花淡紫色，先叶开放。蒴果，圆柱形，有鳞片。

性味归经：苦，平。归肺经。

功能主治：解表，化痰，止咳，平喘。用于感冒头痛、咳嗽、哮喘、支气管炎。

用法用量：5 ~ 25克，水煎服。



生境：中高海拔的树林中。

科：报春花科	种： <i>Androsace umbellate</i> (Lour.) Merr.	药名：点地梅	别名：喉咙草、白花珍珠草、天星草
--------	---	--------	------------------

点地梅

药用部位：全草。

植物特征：一年生草本。植物体有多细胞的细柔毛。叶心形，边缘有齿牙。伞形花序有花3 ~ 10朵，花冠白色，裂片宽卵形，与花萼等长。蒴果圆形。

性味归经：苦、辛，寒。归肝经。

功能主治：清热解毒，消肿止痛。用于扁桃体炎、咽喉炎、风火赤眼、跌扑损伤，以及咽喉肿痛等症。

用法用量：15 ~ 25克，水煎服。

花冠裂片宽卵形



生境：田野草地中。

科：报春花科	种： <i>Trientalis europaea</i> L.	药名：七瓣莲
--------	----------------------------------	--------

七瓣莲

药用部位：根状茎。

植物特征：多年生小草本。须根多数，细长；根状茎细长，横走，黄白色。茎生叶互生，茎顶5 ~ 7(8)叶集生呈轮生状，叶柄极短或近无柄，叶较大，广披针形、长圆状披针形、长圆形至狭倒卵形，全缘或具浅疏锯齿，两面无毛。花1 ~ 2 (3) 朵，生于茎顶叶腋，花冠白色，花药先端内卷，黄色。蒴果近球形，5瓣裂。种子三棱形，背面宽平。



性味归经：苦、辛，寒。归肝、肺经。

功能主治：清热解毒，平喘止咳。主治外感风寒、气喘咳嗽。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服。

生境：北方林下。

科：报春花科	种： <i>Primula maximowiczii</i> Regel	药名：胭脂花	别名：段报春
--------	--------------------------------------	--------	--------

胭脂花

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。叶基生，长圆状披针形或倒卵状披针形。1 ~ 3轮伞形花序，每轮花朵4 ~ 16，暗红色；花瓣5，萼片披针形，雄蕊5对。蒴果圆柱形，伸出萼外。



性味归经：辛、苦，微温。归肝、肾经。

功能主治：祛风、止痛。治风湿痹痛、关节疼痛、筋骨疼痛、癫痫、头痛。

用法用量：6 ~ 12克，水煎服。



生境：高山草地及林下。

科：报春花科	种： <i>Lysimachia christinae</i> Hance	药名：过路黄	别名：风寒草
--------	---------------------------------------	--------	--------

过路黄

药用部位：全草或带根全草。

植物特征：多年生草本。有短毛或近于无毛。茎叶对生，心形或宽卵形，顶端圆钝。花单生于叶腋，花冠黄色。蒴果球形，有黑色腺条，瓣裂。

性味归经：辛、甘，微温。归肝、胆、肾、膀胱经。

功能主治：清热，利湿，消肿，解毒，祛风散寒。治膀胱癌、前列腺癌。

用法用量：15 ~ 60克，水煎或捣汁服。外用适量捣敷患处。



生境：山坡、路旁较阴湿处。

科：报春花科	种： <i>Lysimachia trientaloides</i> Hemsl.	药名：黄开口	别名：轮叶过路黄
--------	---	--------	----------

轮叶排草

药用部位：带根全草。

植物特征：多年生草本。全株无毛。茎单生或数茎丛生，不分枝。茎端叶轮生，条状披针形、宽披针形至椭圆形；下部叶对生或3枚轮生，退化成鳞片状。花集生于茎端，有时亦生于近顶端1 ~ 2轮鳞片状叶腋中，花冠黄色，5深裂，裂片卵状矩圆形。蒴果球形，5瓣裂。

性味归经：酸、涩，凉。归心、肺、肾经。

功能主治：降压，止血，解蛇毒。主治高血压症，外用止血、治疗蛇毒。

用法用量：15 ~ 30克，水煎服。治毒蛇咬伤，捣汁服并外敷。



生境：林下及阴湿沟边。

科：蓝雪科	种： <i>Limonium bicolor</i> (Bge.) o. Ktze	药名：补血草	别名：血见愁
-------	---	--------	--------

二色补血草



药用部位：带根全草。

植物特征：多年生草本。全体光滑无毛。叶多根出，匙形或长倒卵形，基部窄狭成翅柄，近于全缘。花序着生于枝端而位于一侧，或近于头状花序，花瓣5，匙形至椭圆形。蒴果具5棱，包于萼内。

性味归经：甘、苦，平。归肝经。

功能主治：补血，止血，散瘀，调经，益脾，健胃。治崩漏、尿血、月经不调。

用法用量：30 ~ 50克，水煎服。



花着生于枝端

生境：盐碱地。

科：柿树科	种： <i>Diospyros lotus</i> L.	药名：黑枣	别名：君迁子
-------	------------------------------	-------	--------

黑枣

药用部位：果实。

植物特征：落叶乔木。树皮暗褐色，幼枝有灰色柔毛。叶椭圆形至长圆形，先端渐尖或急尖，表面密生柔毛后脱落，背面灰色或苍白色，脉上有柔毛。花淡黄色或淡红色，单生或簇生叶腋。果实近球形，熟时蓝黑色，有白蜡层，近无柄。

性味归经：甘，凉。归心、肺经。

功能主治：清热、润燥、化痰。用于肺热燥咳、咽干喉痛、口舌生疮、吐血、咯血、痔疮出血、消渴、津亏便秘、痔疮等。

用法用量：3 ~ 9克，水冲服或入丸剂。外用适量捣敷。



果实近球形



花淡红色



叶先端急尖

叶椭圆形

生境：田野路旁，常见栽培。

科：木犀科	种： <i>Fraxinus sogdiana</i> Bunge.	药名：秦皮	别名：苦枥
-------	------------------------------------	-------	-------

小叶白蜡

药用部位：树皮。

植物特征：落叶乔木。树皮淡灰色，裂皱浅细。羽状复叶对生，小叶椭圆形或椭圆状卵形，边缘具锯齿或钝锯齿，下面脉上有柔毛。圆锥花序顶生，大而疏松，花小，无花冠。翅果披针形。

性味归经：苦、涩，寒。
归肝、胆、大肠经。

功能主治：清热燥湿，收涩，明目。用于热痢、泄泻、赤白带下、目赤肿痛、目生翳膜。

用法用量：6 ~ 12克，水煎服。
外用适量，煎洗患处。



生境：山坡、山沟及丛林中。

科：木犀科	种： <i>Forsythia suspense</i> (Thunb.) Vahl	药名：连翘	别名：黄花条、落翘
-------	--	-------	-----------

连翘

药用部位：果实。

植物特征：落叶灌木。枝条下垂，有四棱，髓中空。叶对生，卵形至椭圆状卵形，边缘有锯齿，一部分形成羽状三出复叶。花先叶开放，单生于叶腋，花冠金黄色。蒴果卵圆形，表面散生瘤点。

性味归经：苦，微寒。归肺、心、小肠经。

功能主治：清热解毒，消肿散结。用于痈疽、瘰癧、乳痈、丹毒、风热感冒、温病初起、温热入营、高热烦渴、神昏发斑、热淋尿闭。

用法用量：6 ~ 15克，水煎服或入丸、散。



生境：野荒坡或栽培。

科：木犀科	种： <i>Chionanthus retusa</i> Lindl et Paxt	药名：流苏树	别名：茶叶树
-------	--	--------	--------

流苏树

药用部位：叶。

植物特征：落叶小乔木或灌木。树皮灰褐色，薄片状剥裂。叶对生，卵形至倒卵状椭圆形，全缘或有小锯齿。雌雄异株，聚伞状圆锥花序着生枝顶，疏散，花冠白色，筒短。核果椭圆形，蓝黑色。



花

性味归经：苦，平。归心经。

功能主治：消暑止渴，治疗中暑。

用法用量：6 ~ 12克，水煎服。



核果椭圆形

叶全缘

生境：低山区林中。

科：木犀科	种： <i>Syringa villosa</i> Vahl.	药名：丁香皮	别名：野丁香
-------	---------------------------------	--------	--------

红丁香

药用部位：树皮。

植物特征：灌木。小枝粗壮，有瘤状突起和微柔毛。叶对生，宽椭圆形或长椭圆形，较大，全缘，下面有白粉，近中脉处有柔毛；叶柄短。圆锥花序顶生，花紫色或白色；花冠管状，裂片4，开展。蒴果光滑。

性味归经：苦、寒。归肺经。

功能主治：驱虫、解毒、健胃。民间用于治疗癣疖，内服驱虫。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服。外用研末涂抹。



花白色



紫色花

生境：高山林中或林缘山坡。

科：马钱科	种： <i>Buddleja officinalis</i> Maxim.	药名：密蒙花	别名：黄饭花、鸡骨头花
-------	---------------------------------------	--------	-------------

密蒙花

药用部位：花。

植物特征：落叶灌木。叶对生，被灰白色绒毛，叶片长圆状披针形、宽披针形或线状披针形，全缘或有不明显的疏生小锯齿，纸质，叶脉隆起。聚伞圆锥花序顶生及腋生，花芳香，花萼钟状，花冠淡紫色，略带黄色，管内面黄色，疏生绒毛。蒴果卵形，2瓣裂；种子多数，细小，具翅。

性味归经：甘，微寒。归肝经。

功能主治：清热养肝，明目退翳。用于目赤肿痛、多泪羞明、眼生翳膜、肝虚目暗、视物昏花。

用法用量：3 ~ 9克，水煎服。



生境：山坡、杂木林地、河边和丘陵地带，通常为半阴生。

科：龙胆科	种： <i>Gentianamacrophylla</i> Pall.	药名：秦艽	别名：大叶龙胆
-------	-------------------------------------	-------	---------

秦艽

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。叶披针形或长圆状披针形，在茎基部者较大，先端尖，全缘；茎生叶对生，3 ~ 4对，稍小，基部连合。花生于上部叶腋，成轮状丛生；花冠筒状，深蓝紫色。蒴果长圆形；种子椭圆形，褐色，有光泽。

性味归经：辛、苦，平。归胃、肝、胆经。

功能主治：祛风湿，清湿热，止痹痛。用于风湿痹痛、筋脉拘挛、骨节烦痛、日晡潮热、小儿疳积发热。

用法用量：3 ~ 9克，水煎服。



生境：高山草地中。

科：龙胆科	种： <i>Swertia diluta</i> (Turcz.) Benth. et Hook. F.	药名：淡味当药	别名：獐牙菜
-------	--	---------	--------

当药



药用部位：全草。

植物特征：一年生直立草本。茎光滑，自下部分枝，几四棱形。叶对生，具单脉，长披针形，端尖无柄。花序顶生及腋生，成复总状聚伞花序，花梗细弱，直立，花萼5裂，花冠蓝色，几分裂至基部。蒴果卵圆形，平滑；种子小，多数，卵圆形。

性味归经：苦，寒。归肺、肝经。

功能主治：清热解毒，祛风杀虫。治骨髓炎、喉炎、扁桃体炎、结膜炎、疥癣。

用法用量：25 ~ 50克，水煎服或研末。外用捣敷或捣汁搽。

生境：草地、山坡。

科：龙胆科	种： <i>Swertia erythrosticta</i> Maxim.	药名：红直当药	别名：红直当獐牙菜
-------	--	---------	-----------

红直当药

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。茎直立，无毛，不分枝，呈四棱形；节间不等长，淡紫红色。叶对生或轮生，长披针形，全缘。总状聚伞花序，腋生或顶生；花萼浅绿色，斜长披针形，花冠绿色，具黑褐色小斑点。蒴果椭圆形，绿色。

性味归经：苦，凉。归心、肺、脾经。

功能主治：清热解毒，利湿退黄，杀虫。主治风热咳喘，咽喉肿痛、痘、梅毒、疮痈肿毒、疥癣。

用法用量：15 ~ 30克，水煎服或研末冲服。外用适量捣敷。



生境：海拔1500 ~ 4300米的河滩、干草原、高山草甸。

科：龙胆科	种： <i>Mneyanthes trifoliata</i> L.	药名：睡菜	别名：蜈菜、醉草
-------	------------------------------------	-------	----------

睡菜

药用部位：全草。

植物特征：挺水植物。全株光滑无毛。根状茎匍匐状，叶基生，三出复叶，椭圆形，全缘状微波形。总状花序顶生，基部生一披针形苞叶。小花具柄，花冠5深裂，白色，有纤毛。蒴果球形。

性味归经：甘、微苦，寒。归心脾经。

功能主治：健脾消食，养心安神，清热利尿。主治胃炎、消化不良、心悸失眠、湿热黄疸、胆囊炎、水肿、小便不利或赤热涩痛。

用法用量：10 ~ 15克，水煎或捣汁服。

生境：静水池沼中。



叶全缘微波状

花冠有绒毛

科：夹竹桃科	种： <i>Apocynum venetum</i> L.	药名：罗布麻	别名：红麻、茶叶花、红柳子
--------	-------------------------------	--------	---------------

罗布麻

药用部位：叶。

植物特征：落叶直立半灌木。叶对生，椭圆状披针形。圆锥状聚伞花序顶生或侧生，花紫红色。蓇葖果2，长圆柱形，叉生，下垂。种子长圆形，顶端具白毛。

性味归经：甘、苦、微寒。归心经。

功能主治：降压，强心，清火，利尿。用于心脏病、高血压、神经衰弱、肝炎腹胀、肾炎浮肿等症。

用法用量：3 ~ 6克，水煎服。

生境：田野荒地中。



花紫红色

科：萝藦科

种： *Metaplexis japonica* (Thunb.) Makino

药名：萝藦子

别名：斫合子

萝藦

药用部位：果实。

植物特征：多年生草质藤本。全株具乳汁。叶对生，膜质，叶片卵状心形。总状式聚伞花序腋生或腑外生；花冠白色，有淡紫红色斑纹。果叉生，纺锤形，平滑无毛，先端渐尖，基部膨大。种子扁平，褐色，有膜质边，先端具白色绢质种毛。

花冠白色



性味归经：甘、微辛，温。归心、肺、肾经。

功能主治：补益精气，生肌止血。主治虚劳、阳痿、遗精、金疮出血。

用法用量：9 ~ 18克，水煎服或研末。外用适量，捣敷患处。

果纺锤形



叶卵状心形

生境：山野平原林中、路旁。

科：萝藦科

种： *Periploca sepium* Bunge.

药名：香加皮

别名：北五加皮、羊奶条

杠柳

药用部位：根皮。

植物特征：落叶藤本。全株具乳汁。单叶对生，叶片稍革质，卵状披针形，全缘。花较大，花冠紫红色，数朵集生成聚伞花序，腋生。果双生，种子长圆形，顶端具绢质长绒毛。

性味归经：辛、苦，温，有毒。归肝、肾、心经。

功能主治：祛风湿，强筋骨。用于风寒湿痹、腰膝酸软、心悸气短、下肢浮肿。

用法用量：3 ~ 9克，水煎服，或入酒，入丸、散。


使用注意：有毒，服用不宜过量。

花蕾

花冠紫红色



单叶对生



生境：山野、河边、砂质地。

科：萝藦科	种： <i>Cynanchum atratum</i> Bge.	药名：白薇	别名：山烟根子、白马尾、老君须
白薇 药用部位：根及根茎。 植物特征：多年生草本。叶对生，卵形或长圆形，两面均有淡白色绒毛。聚伞花序伞形状，花深紫色，花冠裂片5，外面有微柔毛。蓇葖果单生。 性味归经：苦、咸，寒。归胃、肝经。 功能主治：清热凉血，利尿通淋，解毒疗疮。用于温邪伤营发热、阴虚发热、骨蒸劳热、产后血虚发热、热淋、血淋、痈疽肿毒。 用法用量：3 ~ 12克，水煎服。 生境：林下草地或荒地。			

科：萝藦科	种： <i>Cynanchum auriculatum</i> Royle ex Wight	药名：牛皮消、白首乌	别名：飞来鹤
牛皮消 药用部位：块根。 植物特征：藤状灌木。宿根肥厚，呈块状；茎被微毛；有乳汁。叶膜质，宽卵形至卵状长圆形，聚伞花序伞房状，腋生，着花达30朵；花冠白色，辐射状，花粉块卵圆形，下垂；蓇葖果双生，叉开，披针形，种子卵状椭圆形，顶端种毛长2厘米。 性味归经：甘、微苦，微温。归肝、肾、脾胃经。 功能主治：补肝肾，益精血，强筋骨，止心痛。用于肝肾阴虚所致的头昏眼花、失眠健忘、须发早白、腰膝酸软、筋骨不健、胸闷心痛。 用法用量：6 ~ 15克（鲜品加倍），水煎服；1 ~ 3克，研末或浸酒。外用适量，鲜品捣敷患处。 生境：海拔1000 ~ 3500米山坡林缘及路旁灌木丛中。			

科：萝藦科	种： <i>Cynanchum bungei</i> Decne	药名：白首乌	别名：泰山何首乌、戟叶牛皮消
-------	----------------------------------	--------	----------------

白首乌

药用部位：块根。

植物特征：多年生缠绕草本。根稍肉质，近球形或块状，常数个相连；外皮褐色，干时易剥离，内面白色。叶对生，叶片戟形或三角状窄卵形，先端渐尖。伞形花序生于叶腋，黄绿色。蓇葖果略细长窄卵形；先端有细长尖头。种子多数，倒卵形，顶端有少数白色长丝光毛。

性味归经：苦、甘、涩，微温。归肝、肾、脾胃经。

功能主治：安神，补血。用于体虚失眠、健忘、皮肤瘙痒。

用法用量：15 ~ 50克，水煎服。

生境：阴湿的山地或石缝中。



科：萝藦科	种： <i>Cynanchum paniculatum</i> (Bge.) Kitag.	药名：徐长卿	别名：竹叶细辛
-------	---	--------	---------

徐长卿

药用部位：根和根状茎。

植物特征：多年生草本。叶对生，纸质，披针形至线形，两端急尖，叶缘反卷有睫毛。圆锥花序近顶腋生，有花10余朵，花冠黄绿色，近辐射状。蓇葖果单生。种子长圆形，顶端具白绢质毛。

性味归经：辛，温，有毒。归肝、胃经。

功能主治：镇静止痛，祛湿解毒。用于风湿性关节痛、头痛、牙痛、跌打损伤、头晕、皮肤湿疹、蛇虫咬伤。

用法用量：3 ~ 12克，水煎服，入煎剂宜后下。

使用注意：有微毒，不可超剂量服用。

药材



生境：阳坡草丛中。

科：旋花科	种： <i>Cuscuta chinensis</i> Lam	药名：菟丝子	别名：黄丝、黄藤子、豆寄生
-------	---------------------------------	--------	---------------

菟丝子

药用部位：种子。

植物特征：一年生寄生草本。全株无毛。茎细，缠绕，黄色。花簇生于叶腋，花冠白色，钟形。蒴果扁球形，被花冠全部包住，盖裂。种子2 ~ 4粒。

性味归经：甘，温。归肝、肾、脾经。

功能主治：滋补肝肾，固精缩尿，安胎，明目，止泻。



用于阳痿遗精、尿有余沥、遗尿尿频、腰膝酸软、目昏耳鸣、肾虚胎漏、胎动不安、脾肾虚泻；外治白癜风。

用法用量：6 ~ 12克，水煎服。



生境：田边、荒地及灌丛中，常寄生于豆科等植物上。

科：旋花科	种： <i>Cuscuta japonica</i> Choisy	药名：金灯藤	别名：日本菟丝子
-------	-----------------------------------	--------	----------

金灯藤


药用部位：全草。

植物特征：一年生寄生草本。茎较粗壮，稍肉质，橘红色。无叶。花成穗状花序。花柱1蒴果扁球形，被花冠全部包住，盖裂。种子2 ~ 4粒。

性味归经：甘，温。归肝、肾、脾经。

功能主治：滋补肝肾，固精缩尿，安胎，明目，止泻。用于阳痿遗精、尿有余沥、遗尿尿频、腰膝酸软、目昏耳鸣、肾虚胎漏、胎动不安、脾肾虚泻；外治白癜风。

用法用量：6 ~ 12克，水煎服。



生境：林间，寄生于其他植物上。

科：旋花科	种： <i>Calystegia hederacea</i> Wall.	药名：打碗花	别名：小旋花、面根藤
-------	--------------------------------------	--------	------------

打碗花

药用部位：花、根。

植物特征：多年生草质藤本。主根较粗长，横走。叶互生，叶片三角状戟形或三角状卵形，侧裂片展开，常再2裂。花萼外有2片大苞片，卵圆形；花蕾幼时完全包藏于内。花冠漏斗形（喇叭状），口近圆形微呈五角形。花粉红色，喉部近白色。蒴果。

性味归经：甘、淡，平。归脾、肾经。

功能主治：① 根：健脾益气，利尿，调经，止带。用于脾虚消化不良、月经不调、白带、乳汁稀少。
② 花：止痛；外用治牙痛。

用法用量：根50 ~ 100克，水煎服。花外用适量捣敷。



花冠漏斗形

生境：田间、野地。

科：旋花科	种： <i>Convolvulus arvensis</i> L.	药名：田旋花	别名：拉拉菟、野牵牛
-------	-----------------------------------	--------	------------

田旋花

药用部位：全草。

植物特征：多年生缠绕草本。叶互生，卵状长圆形或三角状卵形，先端微圆，基部近戟形或箭形，全缘或微波状。花1 ~ 2朵生于叶腋，花梗细长；花冠淡红色，漏斗状，有不明显的裂片5。蒴果球形。

性味归经：微咸，温，有毒。归肝肾经。

功能主治：祛风止痒，止痛。主治皮肤瘙痒、红肿。

用法用量：外用适量捣敷。



花冠淡红色

叶微波状

生境：田野及村边草地。

科：旋花科	种： <i>Pharbitis purpurea</i> Voigt	药名：黑丑、白丑	别名：喇叭花
-------	------------------------------------	----------	--------



花蕾

圆叶牵牛

药用部位：种子。

植物特征：一年生缠绕草本。全株密被白色长毛。叶互生，阔心形，全缘。花序有花1 ~ 3朵；花冠白色、蓝紫色或紫红色，漏斗状。蒴果球形。种子5 ~ 6粒，卵形，黑色或淡黄白色。

性味归经：苦，寒，有毒。归肺、肾、大肠经。

功能主治：泻水通便，消痰涤饮，杀虫攻积。用于水肿胀满、二便不通、痰饮积聚、气逆喘咳、虫积腹痛、蛔虫、绦虫病。

用法用量：2 ~ 3克，水煎服；研末吞服，每次0.5 ~ 1克，每日2 ~ 3次。

使用注意：用量过大可出现神经系统症状及便血、腹痛、呕吐等副作用。



花冠蓝紫色

叶阔心形

花冠漏斗状

生境：山野灌丛中、村边、路旁。

科：紫草科	种： <i>Lithospermum erythrorhizon</i> Sieb. et Zucc.	药名：紫草	别名：紫丹、红石根
-------	---	-------	-----------



花冠白色

叶互生

紫草

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。有平伏状粗毛。根粗大，圆锥形，干时紫色。叶互生，披针形，无柄或具柄。花萼裂片线性；花冠白色，喉部有5鳞片，鳞片顶端微凹。小坚果卵形灰白色，光滑。

性味归经：甘、咸，寒。归心、肝经。

功能主治：凉血，活血，解毒透疹。用于血热毒盛、斑疹紫黑、麻疹不透、疮疡、湿疹、水火烫伤。

用法用量：4 ~ 10克，水煎服。外用适量捣敷。

生境：荒山田野、路边及干燥多石山坡的灌木丛中。

科：紫草科	种：Common Carpesium Fruit	药名：鹤虱	别名：鬼虱
-------	--------------------------	-------	-------

鹤虱

药用部位：种子。

植物特征：一年生或越年生草本。茎多分枝，有粗糙毛。叶互生，倒披针状条形或条形，有紧贴的细糙毛。全缘或略显波状。花顶生，苞片披针状条形；花生于苞腋的外侧，花冠淡蓝色。小坚果4，卵形，褐色，有小疣状突起，边沿有2 ~ 3行不等长的锚状刺。

性味归经：苦、辛，平，有毒。归胃、大肠、膀胱经。

功能主治：杀虫，清热解毒，健脾和胃。治虫积腹痛、阴道滴虫。

用法用量：15 ~ 25克，水煎服或入丸、散。

使用注意：孕妇忌服。



生境：林边草地。

科：紫草科	种：Trigonotis peduncularis (Trev.) Benth	药名：附地菜	别名：鸡肠草
-------	---	--------	--------

附地菜

药用部位：全草。

植物特征：一年生草本。茎通常自基部分枝，或丛生，具平伏细毛。叶互生，匙形、椭圆形或披针形，两面均具平伏粗毛，下部叶具短柄，上部叶无柄。总状花序顶生，花通常生于花序的一侧，有柄，花冠蓝色。



小坚果三角状四边形，具细毛，少有光滑，有小柄。

性味归经：甘、辛，温。归脾胃、肝经。

功能主治：温中健胃，消肿止痛，止血。用于胃痛、吐酸、吐血；外用治跌打损伤，骨折。

用法用量：5 ~ 10克，水煎服；研粉冲服1 ~ 3克。外用适量，捣烂涂患处。

生境：田野路旁。

科：马鞭草科	种： <i>Vitex chinensis</i> Mill.	药名：牡荆	别名：小荆、黄荆
--------	---------------------------------	-------	----------

荆条

药用部位：叶、果实。

植物特征：落叶灌木。小枝四棱。叶具长柄，掌状复叶对生，小叶椭圆状卵形，先端锐尖，缘具切裂状锯齿或羽状裂，背面灰白色，被柔毛。圆锥花序，花冠蓝紫色。核果，球形或倒卵形。

性味归经：辛、苦，温。归肺、胃经。

功能主治：祛风，除痰，行气，止痛。用于感冒、咳嗽、哮喘、风痹、疟疾、胃痛、疝气、痔漏。

用法用量：果实5 ~ 15克，叶15克 ~ 50克，水煎服。



生境：山地阳坡上。

科：马鞭草科	种： <i>Clerodendrum bungei</i> Sterd	药名：臭牡丹	别名：臭枫根
--------	-------------------------------------	--------	--------

臭牡丹



药用部位：根、叶。

植物特征：落叶灌木。叶对生，广卵形，先端尖，基部心形，或近于截形，边缘有锯齿而稍带波状，上面深绿色而粗糙，具密集短毛，下面淡绿色而近于光滑，唯脉上有短柔毛。花蔷薇红色，芳香，头状聚伞花序。核果，外围有宿存的花萼。

性味归经：苦、辛，平。归肝、脾、肾、肺经。

功能主治：祛风除湿，解毒散淤。根：治风湿关节痛、跌打损伤、高血压病、头晕头痛、肺脓疡。叶：外用治痈疖疮疡、痔疮发炎、湿疹，还可作灭蛆用。

用法用量：根25 ~ 50克，水煎服。鲜叶外用适量，捣烂敷患处。



生境：湿润的林边、山沟及屋旁，亦有栽培。

科：马鞭草科	种： <i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.	药名：海州常山	别名：臭梧桐
--------	---	---------	--------

海州常山

药用部位：枝叶。

植物特征：落叶灌木或小乔木。嫩枝棕色短柔毛。单叶对生，叶卵圆形，先端渐尖，基部多截形，全缘或有波状齿，两面近无毛。伞房状聚伞花序着生顶部或腋间，花萼紫红色五裂至基部，花冠细长筒状，白色或粉红色。核果球状，蓝紫色。

性味归经：辛、苦、甘，凉，归肝经。

功能主治：祛风湿，降血压。主治风湿痹痛、半身不遂、高血压病、偏头痛、痢疾、痔疮、痈疽疮疥。

用法用量：10～15克，水煎服。外用适量捣敷患处。



生境：山坡、路旁和溪边、村旁。

科：唇形科	种： <i>Ajuga lupulina</i> Maxim.	药名：白苞筋骨草	别名：甜格宿宿草
-------	---------------------------------	----------	----------

白苞筋骨草

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。茎粗壮，直立，四棱形。叶柄具狭翅，基部抱茎，边缘具缘毛；叶片纸质，披针状长圆形，对生。穗状聚伞花序由多数轮伞花序组成；苞叶大，向上渐小，白黄、白或绿紫色，卵形或阔卵形，花冠白、白绿或白黄色，具紫色斑纹，狭漏斗状。小坚果倒卵状或倒卵长圆状三棱形。

性味归经：苦、涩，寒。归肝、胃经。

功能主治：清热解毒。用于炭疽、疔疮、癫痫、虫病。

用法用量：12～15克，水煎服。



生境：河滩沙地、高山草地或陡坡石缝中。

科：唇形科	种： <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi	药名：黄芩	别名：黄金茶、山茶根、烂心草
-------	--	-------	----------------

黄芩

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。叶对生，披针形至条状披针形，全缘。总状花序顶生，花冠紫色、紫红色至蓝紫色，花冠筒近基部明显膝曲。小坚果卵球形。

性味归经：苦，寒。归肺、心、肝、胆、大肠经。

功能主治：消热燥湿，泻火解毒，止血，安胎。用于湿温、暑温胸闷呕恶、泻痢、黄疸、肺热咳嗽、高热烦渴、痈肿疮毒、胎动不安。

用法用量：3 ~ 9克，水煎服或入丸、散。外用适量，煎水洗，或研末调敷。

使用注意：脾肺虚热者忌用。



生境：向阳草地山坡及休荒地上。

科：唇形科	种： <i>Lagopsis supine</i> (Steph.) IK.-Gal.ex Knoor	药名：夏至草	别名：小益母草、白花夏枯、灯笼棵
-------	---	--------	------------------

夏至草


药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。矮小。叶圆形，掌状浅裂或深裂。轮伞花序腋生，多花密集，花小，白色、黄色至褐紫色。小坚果卵圆状三棱形，光滑或具鳞秕，或具细网纹。

性味归经：微苦，平，有小毒。归肾、膀胱经。

功能主治：养血调经。用于贫血性头晕，半身不遂，月经不调。

用法用量：15 ~ 20克。水煎服或熬膏剂服。



生境：田野、路旁。

科：唇形科	种： <i>Agastache rugosa</i> (Fisch. et Mey.) O. Ktze.	药名：藿香	别名：排香草、野藿香
-------	--	-------	------------

藿香

药用部位：地上部分全草。

植物特征：多年生草本。叶对生，心状卵形或长圆状披针形，边缘有不整齐钝锯齿。轮伞花序组成顶生的假穗状花序，花冠淡紫色或红色。小坚果顶端有毛。

性味归经：辛，微温，归脾、胃、肺经。

功能主治：祛暑解表，化湿脾，理气和胃。主治外感暑湿、寒湿、湿温及湿阻中焦所致寒热头昏、胸脘痞闷、食少身困、呕吐泄泻，并妊娠恶阻、胎动不安、口臭、鼻渊、手足癣。

用法用量：6 ~ 12克，水煎服。

生境：田野路旁，常见栽培。



科：唇形科	种： <i>Schizonepeta tenuifolia</i> (Benth.) Briq.	药名：荆芥穗	别名：香荆芥、线芥、四棱杆蒿、假苏
-------	--	--------	-------------------

荆芥

药用部位：地上部分全草。

植物特征：一年生草本。有香气。茎方形，被短柔毛，基部略带紫色，上部多分枝。叶对生，3 ~ 5回羽状深裂，裂片条形或披针形，两面被柔毛。轮伞花序多花，组成间断的假穗状花序，花冠青紫色，2唇形。小坚果矩圆状三棱形，有小点。

性味归经：辛，微温。归肺、肝经。

功能主治：解表散风，透疹。用于感冒、头痛、麻疹、风疹、疮疡初起。炒炭治便血、崩漏、产后血晕。

用法用量：4.5 ~ 9克，水煎服，不宜久煎。

生境：田野路边。



科：唇形科	种： <i>Glechoma biondiana</i> (Diels) C. Y. Wu et C. Chen	药名：白透骨消	别名：长管活血丹
-------	---	---------	----------

白透骨消

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。全株被具节的长柔毛。匍匐茎着地生根，茎上升，四棱形。叶对生，叶片心形，先端急尖，通常具针状小尖头，基部心形，边缘具圆锯齿。轮伞花序通常具3花，花冠粉红或淡紫色。小坚果长圆形，深褐色，具小凹点。



性味归经：甘、辛，平。归肝经。

功能主治：舒筋止痛、活血消肿。治筋骨痛、外伤红肿。

用法用量：9 ~ 15克，水煎服。外用适量煎水外洗。

生境：山地林缘，溪边阴湿地。

科：唇形科	种： <i>Phlomis umbrosa</i> Turcz.	药名：糙苏	别名：常山、山芝麻
-------	----------------------------------	-------	-----------

糙苏

药用部位：全草。

植物特征：多年生直立草本植物。根肥粗，须根肉质，分枝多。叶近圆形、卵圆形至卵状矩圆形，苞叶变小，卵形，具短柄，叶片两面疏被绒毛及星状疏柔毛。轮伞花序多花，生于主茎及分枝上，花冠通常粉红。小坚果无毛。



叶卵圆形



性味归经：辛，温。归肝、肺经。

功能主治：祛风活络，强筋壮骨，消肿。用于感冒、风湿关节痛、腰痛、跌打损伤、疮疖肿毒。

用法用量：10 ~ 20克，水煎服。

生境：疏林下或山地草甸中。

科：唇形科	种： <i>Lamiophlomis rotata</i> (Benth.) Kudo.	药名：独一味
独一味 药用部位：根茎。 植物特征：草本。根及根茎直立，较粗，单叶基生，4枚，辐射状两两相对，平展；菱状圆形或肾形，质厚，边缘具圆齿。轮伞花序组成头状或短穗状，花冠小，淡红紫色，唇形。 性味归经：苦，微寒，有小毒。归肝经。 功能主治：活血，行淤，消肿，止血。治跌伤筋骨、闪腰挫气、关节积黄水。 用法用量：5 ~ 10克，浸酒或入散剂。 使用注意：孕妇忌服。 叶质厚  生境：高山强度风化的碎石滩中或高山草地。		

科：唇形科	种： <i>Lamium barbatum</i> Sieb. et Zucc.	药名：野芝麻	别名：野油麻、山麦胡、地蚤
野芝麻 药用部位：地上全草或花。 植物特征：草本。叶卵状心形至卵状披针形，两面疏生柔毛。轮伞花序，生在茎的上部叶腋，花冠白色。小坚果倒卵形，有3棱。 性味归经：甘、辛，平。归胃、大肠经。 功能主治：① 全草：散淤，消积，调经，利湿。用于跌打损伤、小儿疳积、白带、痛经、月经不调、肾炎、膀胱炎。② 花：调经，利湿。用于月经不调、白带、子宫颈炎、小便不利。 用法用量：全草50 ~ 100克；花15 ~ 25克，水煎服。 花冠白色 叶卵状心形  生境：阴湿的路旁、山脚或林下。			

科：唇形科	种： <i>Salvia miltiorrhiza</i> Bge.	药名：丹参	别名：血生根、赤参、血参、红根
丹参 药用部位：根及根状茎。 植物特征：草本。叶常为单数羽状复叶；小叶卵形或椭圆状卵形。花冠蓝紫色，筒内有毛环，上唇镰刀形，下唇短于上唇，3裂，中间裂片最大。坚果。 性味归经：苦，微寒。归心、脾、肝、肾经。 功能主治：祛淤止痛，活血通经。用于月经不调、经闭痛经、症瘕积聚、胸腹刺痛、疮疡肿痛、肝脾肿大、心绞痛。 用法用量：7 ~ 15克，水煎服或入丸、散。外用熬膏涂，或煎水熏洗。 使用注意：无淤血者慎用。 上唇镰刀形 花冠蓝色  生境：山坡草地、林下、溪旁。			

科：唇形科	种： <i>Origanum vulgare</i> L.	药名：牛至	别名：止痢草、土香薷、小叶薄荷
-------	-------------------------------	-------	-----------------

牛至



花冠白色

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。芳香。茎直立，或近基部伏地生须根，四棱形，略带紫色。叶对生，叶片卵圆形或长圆状卵圆形。伞房状圆锥花序，花冠紫红、淡红或白色，管状钟形。小坚果卵圆形，褐色。

性味归经：辛，温。归肺、大肠经。

功能主治：发汗解表，消暑化湿。用于中暑、感冒、急性胃肠炎、腹痛。

用法用量：5 ~ 15克，内服煎汤。



叶片卵圆形

生境：海拔500 ~ 3600米的山坡、林下、草地或路旁。

科：唇形科	种： <i>Monarda citriodora</i> Arij	药名：日本薄荷	别名：人丹草、蕃荷菜
-------	-----------------------------------	---------	------------

野薄荷

药用部位：地上部分全草。

植物特征：多年生草本。茎方形，被逆生的长柔毛及腺点。单叶对生，叶片长卵形至椭圆状披针形。轮伞花序腋生，花冠紫色、淡红色或白色。小坚果藏于宿萼内。

性味归经：辛，凉。归肺、肝经。

功能主治：疏风，散热，辟秽，解毒。治外感风热、头痛、目赤、咽喉肿痛、食滞气胀、口疮、牙痛。

用法用量：4 ~ 10克，水煎服（不宜久煎），或入丸、散。外用适量捣或煎汁涂。

使用注意：阴虚血燥、肝阳偏亢、表虚汗多者忌服。



单叶对生

轮伞花序腋生

叶片长卵形

生境：林下路边、水边等，亦见栽培。

科：唇形科	种： <i>Stachys sieboldi</i> Miq.	药名：甘露子	别名：宝塔菜、地蚕、草石蚕、土人参、地牯牛草
-------	---------------------------------	--------	------------------------

甘露子

药用部位：全草或块茎。

植物特征：多年生草本。地下有匍匐枝，成熟时顶端膨大成螺旋状的肉质块茎。茎直立，方形。叶对生，卵形至长椭圆状卵形，两面被贴生短硬毛。花唇形，浅紫色，轮伞花序。小坚果卵圆形，具小瘤。

性味归经：甘，平。归肝、肺经。

功能主治：祛风热，利湿，活血散瘀。用于黄疸、尿路感染、风热感冒、肺结核；外用治疮毒肿痛、蛇虫咬伤。

用法用量：10 ~ 25克，水煎服。
外用鲜根茎适量捣烂敷患处。



生境：温湿地或近水处。

科：唇形科	种： <i>Thymus mongolicus</i> Ronn	药名：地椒	别名：千里香
-------	----------------------------------	-------	--------

百里香

药用部位：地上部分。

植物特征：矮小半灌木状草本。叶对生，2 ~ 4对，卵形。花序头状，花冠紫红色至粉红色，2唇形。小坚果近圆球形或卵圆形。

性味归经：辛，温，有小毒。归肝、肺经。

功能主治：温中散寒，驱风止痛。治吐逆、腹痛、泄泻、食少痞胀、风寒咳嗽、咽肿、牙疼、身痛、肌肤瘙痒。

用法用量：15 ~ 20克，水煎服、研末或浸酒。外用适量研末撒或煎水洗。

使用注意：有小毒，不可过量服用；孕妇忌服。



生境：干燥山坡砂质地。

科：唇形科	种： <i>Mosla chinensis</i> Maxim.	药名：香薷	别名：香茹、香草
-------	----------------------------------	-------	----------

石香薷

药用部位：地上部分全草。

植物特征：多年生草本。茎直立，通常呈棕红色。叶对生，广披针形至披针形。轮伞花序密聚成穗状，顶生和腋生，花冠唇形，淡红紫色，花药黄色。小坚果4，近卵圆形，棕色，藏于宿存萼内。

性味归经：辛，微温。归肺、胃经。

功能主治：发汗解表，和中利湿。用于暑湿感冒、恶寒发热、头痛无汗、腹痛吐泻、小便不利。

用法用量：5 ~ 15克，水煎或研末服用。

使用注意：表虚者忌服。



科：唇形科	种： <i>Dracocephalum rupestre</i> Hance	药名：岩青兰	别名：毛建草
-------	--	--------	--------

岩青兰

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。茎斜生，四棱，有细毛。基生叶阔卵圆形或心状长椭圆形，边缘有规则的圆齿，两面有毛，上面绿色，下面白色；茎生叶对生，短柄。总状花序，数朵生于茎顶，花冠2唇形，蓝紫色，苞片具大齿牙。

性味归经：甘、辛，凉。归肺、胃、脾经。

功能主治：清热消炎，凉血止血。治外感风热、头痛寒热、喉痛、咳嗽、黄疸型肝炎、吐血、鼻出血、痢疾。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服或研末入丸、散。



生境：石质山坡或山坡路旁，河谷湿润处。

科：茄科	种： <i>Nicandra physalioides</i> (L.) Gaertn.	药名：假酸浆	别名：水晶凉粉、苦莛
------	--	--------	------------

假酸浆

药用部位：全草。

植物特征：一年生草本。主根长锥形，有纤细的须根。茎棱状圆柱形，有4 ~ 5条纵沟，绿色，有时带紫色，上部三叉状分枝。

单叶互生，草质。花单生于叶腋，淡紫色，花冠漏斗状。蒴果球形；种子小，淡褐色。

性味归经：甘、淡、微苦，平。归肺、肝经。

功能主治：镇静，祛痰，清热，解毒。治狂犬病、精神病、癫痫、风湿痛、疮疖、感冒。

用法用量：50 ~ 100克，水煎服。



生境：田边、荒地、屋园周围、篱笆边。

科：茄科	种： <i>Lycium barbarum</i> L.	药名：枸杞	别名：西枸杞、中宁枸杞
------	------------------------------	-------	-------------

宁夏枸杞

药用部位：果实。

植物特征：灌木或小乔木。果枝披散，营养枝略向上斜升，具刺。叶互生或簇生，披针形或椭圆状披针形，全缘，无毛。花冠漏斗状，淡紫红色。浆果多为宽椭圆形，红色、橘红色或黄色。种子多数，扁肾形，棕黄色。

性味归经：甘，平。归肝、胃、肺经。

功能主治：补肾益精，养肝明目，补血安神，生津止渴，润肺止咳。治肝肾阴亏、腰膝酸软、头晕、目眩、目昏多泪、虚劳咳嗽、消渴、遗精。

用法用量：10 ~ 20克，水煎、熬膏、浸酒或入丸、散。



生境：阳坡干燥山地。

科：茄科	种： <i>Hyoscyamus niger</i> L.	药名：天仙子	别名：莨菪、山大烟
------	-------------------------------	--------	-----------

天仙子

药用部位：种子。

植物特征：一年生或二年生草本。有特殊臭味。基生叶大，叶片长卵形；茎生叶互生，排列较密，无柄，卵状披针形。花腋生，单一，花冠漏斗状，浅黄色。壶形蒴果，种子多数，呈不规则阔肾形。

性味归经：苦、辛，温，有毒。归心、胃、肝经。

功能主治：定痫，止痛。治癫狂、风痫、风痹厥痛、神经痛、喘咳、胃痛、久痢、久泻、脱肛、牙痛、痈肿、恶疮。

用法用量：1 ~ 2克，入丸、散。外用适量煎水洗，研末调敷或烧烟熏。

使用注意：大毒，内服宜慎。



壶形蒴果

花冠漏斗形

生境：宅边的荒地上，或为栽培。

科：茄科	种： <i>Hyoscyamus bohemicus</i> F. W. Schmidt	药名：小莨菪	别名：小天仙子
------	--	--------	---------



花冠黄色

花蕾

小莨菪

药用部位：根、叶、种子。

植物特征：一年生草本。根细瘦，木质。茎直立，单一或分枝。叶互生，茎上部叶椭圆形或卵形。花单生于叶腋，花冠钟状，黄色有紫色网状脉。蒴果卵圆状。种子多数，肾状，略扁平，表面有细密网纹。

性味归经：苦、辛，温，有毒。归心、胃、肝经。

功能主治：解痉、镇痛、安神。主治胃肠痉挛、胃痛、腹泻、脱肛、神经痛、咳嗽、哮喘、癔病、癫狂；外用治痈肿疮疖、龋齿痛。

用法用量：1 ~ 2克，入丸、散。

使用注意：大毒，内服宜慎。

生境：村边寨旁或路边多腐殖质的肥沃土壤上。

科：茄科	种： <i>Physalis alkekengi</i> L.var. <i>franeholtii</i> (Mast.) Mak.	药名：锦灯笼	别名：红姑娘、灯笼草
------	---	--------	------------

酸浆

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本植物。地上茎直立，节间膨大。根状茎横走地下。叶片在下部互生，在上部假对生，长卵形、宽卵形或菱状卵形，顶端渐尖，基部楔形，偏斜，叶缘波状，有锯齿。

花单生于叶腋，花冠白色，辐射状。浆果球形，未熟时绿色，成熟时橙红色，酸苦。种子肾形。

性味归经：酸、苦，寒。归肺、脾经。

功能主治：清热解毒，化痰，利尿。
主治肺热咳嗽、咽喉肿痛、黄疸、痢疾、水肿。

用法用量：9 ~ 15克，水煎服。外用适量捣敷或研末调敷。

生境：田野路旁。

包裹着果实的果萼



叶先端渐尖

叶在上部假对生



科：茄科	种： <i>Solanum nigrum</i> L.	药名：龙葵	别名：野葡萄、野茄子
------	-----------------------------	-------	------------

龙葵

药用部位：地上部分全草。

植物特征：一年生草本。茎直立，多分枝。叶卵形。花白色，细小；花萼杯状，绿色，5浅裂；花冠辐射状，裂片卵状三角形，雄蕊5；子房卵形，花柱中部以下有白色绒毛。浆果球形，熟时黑色；种子近卵形。

性味归经：苦，寒，有小毒。归肺、肾经。

功能主治：清热解毒，利水消肿。用于感冒发烧、牙痛、慢性支气管炎、痢疾、泌尿系感染、乳腺炎、白带、癌症；外用治痈疖疔疮、天疱疮、蛇咬伤。

用法用量：15 ~ 50克，水煎服。外用鲜品适量捣烂敷患处。

使用注意：脾胃虚弱者勿服。

生境：路旁或田野。

叶卵形



浆果球形
熟时黑色



科：茄科	种： <i>Solanum lyratum</i> Thunb.	药名：白英	别名：白毛藤、毛风藤
------	----------------------------------	-------	------------

白英

药用部位：全草。

植物特征：多年生草质藤本。茎及叶密生有节长柔毛。叶互生，多为琴形，全缘或有3～5深裂，中裂片卵形，较大，两面均被长柔毛。聚伞花序顶生或腋外生；花蓝色或白色。浆果圆球形，成熟后红色。

性味归经：甘，寒，有小毒。归心、肺经。

功能主治：清热解毒，祛风利湿，化淤。用于湿热黄疸、风热头痛、白带过多、风湿性关节炎。

用法用量：6～9克，水煎服。外用适量捣敷患处。

生境：山坡或路旁。



科：茄科	种： <i>Solanum melongena</i> L.	药名：茄根	别名：茄子、吊菜子、落苏、矮瓜
------	--------------------------------	-------	-----------------

茄

药用部位：根。

植物特征：一年生草本植物。幼枝、叶、花梗、萼片均有星状绒毛。叶大，具柄，卵圆形至矩圆状卵形，基部不相等，边缘浅波状或深波状浅裂。花单生，紫色，浆果大型，紫色或绿色。

性味归经：甘、辛，寒。归脾胃、肾经。

功能主治：散热消肿。治久痢便血、脚气、齿痛、冻疮。

用法用量：15～30克，水煎服，或入散剂。

生境：常见栽培。



科：茄科	种： <i>Capsicum frutescens</i> L.	药名：辣椒	别名：辣子、辣角、牛角椒
------	----------------------------------	-------	--------------

辣椒

药用部位：果实。

植物特征：草本。单叶互生，叶片卵形至卵状披针形，大小多变。花萼杯状，花白色。果实通常成圆锥形或长圆形，未成熟时绿色，成熟后常见红色。

性味归经：辛，热。归胃、肺经。

功能主治：温中散寒，健胃消食。用于胃寒疼痛、胃肠胀气；外治冻疮、风湿、腰肌痛。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服。

使用注意：胃及十二指肠溃疡、急性胃炎，肺结核、痔疮、眼疾患者忌用。

生境：常见栽培。



科：茄科	种： <i>Dature Stramonium Datura</i> L.	药名：洋金花	别名：醉心花、闹羊花
------	---------------------------------------	--------	------------

曼陀罗

药用部位：叶、花、种子。

植物特征：一年生草本。叶互生，叶片宽卵形，边缘具齿。花单生，花冠漏斗状，白色至紫色。蒴果表面有硬刺，卵圆形。

性味归经：辛，温。归肺、肝经。

功能主治：平喘止咳，镇痛，解痉。用于哮喘、脘腹冷痛、风湿痹痛、小儿慢惊；外科麻醉。

用法用量：0.3 ~ 0.6克，水煎，入丸、散或浸酒。外用适量煎水洗或研末敷。

使用注意：有毒，内服宜慎。体弱、外感、痰热喘咳、青光眼、高血压、心脏病及肝肾功能不全者和孕妇禁服。

生境：农田或荒地。



科：玄参科	种： <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.	药名：地黄	别名：酒壶花、山白菜
-------	--	-------	------------

地黄



花冠紫红色

叶基生成丛

药用部位：块根。

植物特征：多年生草本。全株有白色长柔毛和腺毛。叶基生成丛，倒卵状披针形，边缘有不整齐钝齿，叶面皱缩。花序总状，花冠钟形，紫红色，内面常有黄色带紫的条纹。蒴果球形或卵圆形。

性味归经：甘、苦，寒。归心、肝、肺经。

功能主治：生地黄清热凉血，养阴生津。主治热邪伤阴、舌绛烦渴、阴虚内热、夜热早凉、骨蒸劳热、内热消渴、吐血鼻出血、热毒斑疹（熟地黄性温，补血，用于血虚萎黄、心悸怔忡、月经不调等）。

用法用量：10 ~ 30克（鲜品加倍），水煎服或以鲜品捣汁入药。

使用注意：脾虚湿滞、腹满便溏者，不宜使用。

生境：山坡、田埂、路旁。

科：玄参科	种： <i>Digitalis Purpureal</i> L.	药名：洋地黄	别名：毛地黄
-------	----------------------------------	--------	--------



花萼钟状，深裂

洋地黄

药用部位：叶。

植物特征：多年生草本。除花冠外，全株被灰白色短柔毛和腺毛。基生叶多数，成莲座状；叶片卵形或长椭圆形，下部茎生叶与基生叶同形，向上渐小，叶柄短直至无柄而成为苞片。总状花序顶生；萼钟状，5裂几达基部，花端被白色柔毛。蒴果卵形，种子短棒状。

性味归经：甘，温。有毒。归心经。

功能主治：活血通阳、利水消肿。治心悸、心痛、水肿、小便不利。

使用注意：剧毒，内服慎，遵医嘱。

生境：常见栽培。



花序顶生

花萼钟状

基生叶多数，成莲座形

科：玄参科	种： <i>Scrophularia ningpoensis</i> Hemsl.	药名：玄参	别名：山当归、水萝卜、浙玄参
-------	---	-------	----------------

玄参



长聚伞花序

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。根肥大，近圆柱形，皮灰黄或灰褐色。下部叶对生，上部叶有时互生，叶片卵形或卵状椭圆形。长聚伞花序疏散形，呈圆锥形；花冠暗紫色，管部斜壶状。蒴果球形。

性味归经：甘、苦、咸，微寒。归肺、胃、肾经。

功能主治：清热凉血，滋阴降火，解毒散结。温热病热和营血、烦渴、舌绛、发斑、骨蒸劳嗽、津伤便秘、目涩昏花、咽喉肿痛、瘰疬痰核、痈疽疮毒。

用法用量：9 ~ 15克，水煎服或入丸、散。
外用适量，捣敷或研末调敷。

使用注意：脾胃湿、脾虚便溏忌服。

生境：坡林下。



叶卵状椭圆形
叶对生

科：玄参科	种： <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> Pennell	药名：胡黄连	别名：胡连
-------	--	--------	-------

胡黄连



叶匙形至卵形

叶基生

叶缘具锯齿

药用部位：根茎。

植物特征：多年生草本。根茎粗壮。叶基生，莲座状，匙形至卵形，顶端圆形，基部渐狭成短柄，边缘具锯齿。花序总状；花萼裂片5，不等；花冠深紫色，外被短毛，具短筒，上唇向前弯作盔状，下唇3裂片长达上唇之半；雄蕊4枚。蒴果长卵形。

性味归经：苦，寒。归肝、胃、大肠经。

功能主治：清湿热，除骨蒸，消痞热。用于湿热泻痢、黄疸、痔疾、骨蒸潮热、小儿疳热。

用法用量：3 ~ 10克，水煎服。

使用注意：脾胃虚寒者忌服。

生境：高山草地及石堆中。



药材

科：玄参科	种： <i>Veronica linariifolia</i> Pall. ex Link.	药名：细叶婆婆纳	别名：水蔓菁
-------	--	----------	--------

细叶婆婆纳

药用部位：地上部分全草。

植物特征：多年生草本。根状茎短。茎直立或斜生。叶对生或互生，线形或线状披针形。总状花序顶生，多花密集成穗状，花冠蓝色、蓝紫色、淡蓝紫色、淡红紫色或白色。蒴果椭圆形或近圆状肾形，顶端微凹，无毛。种子多数，细小，近圆形或长卵形。

性味归经：苦、甘，平。归肺经。

功能主治：清肺，化痰，止咳，解毒。治慢性气管炎、咳叶脓血；外用治皮肤湿疹，疖痈疮疡。

用法用量：9 ~ 12克，水煎服。



生境：山坡草地、林边、灌丛、草原、沙岗及路边。

科：玄参科	种： <i>Veronicastrum sibiricum</i> (L.) Pennell	药名：草本威灵仙	别名：九盖草、狼尾巴花
-------	--	----------	-------------

草本威灵仙

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。根状茎横走，节间短，多须根。叶轮生，无柄，叶片长圆形至宽条形，两面无毛或疏被柔毛。花顶生，长尾状，各部分无毛，花梗短，花红紫色、紫色或淡紫色。蒴果卵形，4瓣裂，两面对有沟。

性味归经：辛、微苦，寒。归肝、胃、肺经。

功能主治：祛风除湿，清热解毒。主治感冒风热、咽喉肿痛、腮腺炎、风湿痹痛、蛇虫咬伤。

用法用量：10 ~ 15克（鲜品30 ~ 60克），水煎服。外用取鲜品适量捣敷，或煎水洗。



生境：路边、山坡草地及山坡灌丛。

科：玄参科	种： <i>Pedicularis resupinala</i> L.	药名：芝麻七	别名：马先蒿
-------	-------------------------------------	--------	--------

反顾马先蒿

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。直立。根多数丛生，细长纤维状。茎粗壮中空，方形有棱。叶互生或有时对生，卵形至长圆状披针形，先端渐狭，基部广楔形或圆形，边缘有钝圆重齿，叶柄短。花单生，花冠淡紫红色。蒴果斜长圆状披针形。

性味归经：苦，平。归肾、膀胱经。

功能主治：祛风湿、利尿。用于风湿痹痛、小便不利、尿路结石等。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服或研末为散。外用煎水洗。



生境：山地林下，林缘草甸及沟谷草甸。

科：玄参科	种： <i>Mimulus tenellus</i> Bunge	药名：沟酸浆	别名：酸叶
-------	----------------------------------	--------	-------

沟酸浆

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。茎直立，单生，具4棱。叶对生，叶片广卵形至狭卵形，边缘上部有粗锯齿。花单生于枝顶或叶腋，花柄细长，花萼钟状，裂片5，花冠淡黄色，2唇形，上唇2裂，下唇3裂，有黄褐色斑，并有两突起的脉，雄蕊4。蒴果球形。

性味归经：酸涩，平，无毒。归大、小肠经。

功能主治：收敛，止泻。治湿热痢疾、脾虚泄泻及妇女白带。

用法用量：20 ~ 40克，水煎服。



生境：潮湿的水沟旁。

科：玄参科	种： <i>Siphonostegia chinensis</i> Benth.	药名：刘寄奴	别名：金钟茵陈
-------	--	--------	---------

阴行草

药用部位：全草。

植物特征：一年生草本。叶对生，叶片2回羽状全裂，裂片狭线形。花对生于茎枝上部，成稀疏总状花序。花冠2唇形，上唇微带紫色、下唇黄色。蒴果长圆形。

性味归经：苦，温。归心、肝、脾经。

功能主治：活血疗伤，通经，止痛，止血。用于跌打损伤、肿痛出血、血淤经闭、产后淤滞腹痛、治食积。

用法用量：5 ~ 10克（单味消积可至30克），水煎服，或入散剂。外用适量捣敷或研末。

使用注意：气血虚弱、脾虚作泄者慎服，孕妇禁服。



生境：低山山坡或草地上。

科：紫葳科	种： <i>Catalpa ovata</i> G. Don	药名：梓白皮	别名：臭梧桐、黄金树
-------	--------------------------------	--------	------------

梓树

药用部位：果实、树皮。

植物特征：落叶乔木。树冠倒卵形或椭圆形，树皮褐色或黄灰色，叶对生或轮生，广卵形或圆形。圆锥花序，花冠淡黄色或黄白色，内有紫色斑点和2黄色条纹。蒴果细长如豇豆，经久不落。种子扁平，两端生有丝状毛丛。

性味归经：① 果实：甘，平。② 树皮：苦，寒。归肝、肾、膀胱经。

功能主治：① 果实：利尿，消肿。用于浮肿、慢性肾炎、膀胱炎、肝硬化腹水。② 树皮：利湿热，杀虫。外用治湿疹、皮肤瘙痒、小儿头疮。

用法用量：① 果实5 ~ 15克，水煎服。② 树皮外用适量，煎水洗患处。



生境：常见栽培。

科：紫葳科	种： <i>Campsis radicans</i> (L.) Seem.	药名：凌霄花	别名：美洲凌霄
-------	---------------------------------------	--------	---------

凌霄

药用部位：花。

植物特征：多年生木质藤本。羽状复叶对生，小叶卵形至卵状披针形，先端长尖，基部不对称，边缘有锯齿，下面脉间有细柔毛。由3出聚伞花序集成顶生圆锥花丛，花萼钟形，肉质，花冠鲜红色，漏斗状。蒴果长如豆荚。种子多数。

性味归经：甘、酸，寒。归肝、心包经。

功能主治：行血去淤，凉血祛风。用于经闭症瘕、产后乳肿、风疹发红、皮肤瘙痒、痤疮。

用法用量：6 ~ 9克，水煎服。
外用适量敷患处。

使用注意：孕妇慎用。



生境：常见栽培。

科：紫葳科	种： <i>Incarvillea younghusbandii</i> Sprague	药名：角蒿	别名：羊角蒿
-------	--	-------	--------

角蒿

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。具茎，分枝。叶互生，2 ~ 3回羽状细裂，形态多变，小叶不规则细裂呈线状披针形。顶生总状花序，疏散，花冠淡红色微带紫、钟状漏斗形，基部实收缩成细管。蒴果淡绿色，圆柱形细长；种子扁圆形，细小，四周具透明膜质翅。

性味归经：辛、苦，寒。归肺、胃、膀胱经。

功能主治：清热祛湿。治口疮、齿龈溃烂、耳疮、湿疹、疥癣、阴道滴虫病。

用法用量：外用适量烧存性研末掺，或煎汤熏洗。



生境：山坡、田野及路旁。

科：列当科	种： <i>Cistanche deserticola</i> Y. C. Ma	药名：肉苁蓉	别名：大芸
 药材 肉苁蓉 药用部位：地上部分。 植物特征：多年生寄生草本。茎肉质肥厚，圆柱形，黄色，不分枝或有时从基部分2 ~ 3枝。被多数肉质鳞片状叶，黄色至褐黄色，覆瓦状排列，卵形至长圆状披针形，穗状花序圆柱形，花萼钟形，淡黄色或白色，花冠管状钟形，5浅裂，裂片近圆形，紫色，管部白色。蒴果椭圆形。种子多数。 性味归经：甘、咸，温。归肾、大肠经。 功能主治：补肾助阳，润肠通便，软坚散结。治月经不调、闭经、不孕、阳痿、遗精、小便淋漓、声哑失音、便秘、虚寒泄泻、症瘕。 用法用量：6 ~ 9克，水煎服。  穗状花序圆柱形			
生境：盐碱地、干河沟沙地、戈壁滩。寄生在红沙、盐爪爪、着叶盐爪、珍珠、西伯利亚白刺等植物的根上。			

科：列当科	种： <i>Orobanche pycnostachya</i>	药名：黄花列当	别名：列当
 花冠淡黄色 黄花列当 药用部位：全草。 植物特征：一年生寄生草本。植株密被腺毛。茎直立，常不分枝，圆柱形，基部常膨大，黄褐色。叶为鳞片状、卵状披针形。穗状花序顶生，花冠淡黄色，有时为白色，2唇形。雄蕊4，2强。子房长圆形，花柱细长。蒴果，种子小，褐黑色，多数，扁球形。 性味归经：甘，温。归肾经。 功能主治：补肾助阳，强筋骨。用于性神经衰弱、腰腿酸软；外用治小儿腹泻、肠炎、痢疾。 用法用量：10 ~ 15克，水煎服。外用适量煎汤洗脚。  穗状花序			
生境：沙丘、山坡、草地。主要寄生于蒿属植物的根上。			

科：苦苣苔科	种： <i>Corallodiscus cordatulus</i> (Craib.) Burt.	药名：马耳还阳	别名：马耳朵
--------	---	---------	--------



珊瑚苣苔

药用部位：全草。

植物特征：年生草本。根茎肥厚粗短，表面黑褐色。叶于基部丛生，平卧，叶片卵形至菱形，肥厚肉质，先端急尖，基部渐狭边缘具细锯齿，上面深绿色，下面密被棕色细长丝状毛；聚伞花序，苞片不明显，花萼深裂，花冠二唇形，紫堇色。蒴果条形。

性味归经：甘、苦，寒。归肾经。

功能主治：清热解毒，强肾，止血。主治：解野菜、肉类及乌头中毒。治热性腹泻、阳痿早泄、月经失调、白带过多。

用法用量：5 ~ 10克，水煎服。



生境：高山岩石缝隙中。

科：苦苣苔科	种： <i>Boea hygrometrica</i> (Bunge) R. Brown	药名：牛耳草	别名：猫耳朵、石花子
--------	--	--------	------------



牛耳草

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。叶基生，密集，无柄，肉质，近圆形，边缘具波状锯齿，叶表有贴伏的白色长柔毛。花淡蓝紫色，花柱伸出。蒴果螺旋状扭曲。

性味归经：甘，平。归肺经。

功能主治：散瘀，止血，解毒。用于创伤出血、跌打损伤、肠炎、中耳炎。

用法用量：① 创伤出血、跌打损伤：鲜品捣烂敷或干品研粉撒患处。② 肠炎：每次5 ~ 15株，煎水洗脚。③ 中耳炎：鲜品捣烂取汁滴耳。



生境：丘陵或低山区石崖。

科：爵床科	种： <i>Rostellularia procumbens</i> (L.) Nees	药名：爵床	别名：小青草、野万年青
-------	--	-------	-------------

爵床

药用部位：全草。

植物特征：一年生草本。茎绿色，被疏毛，节稍膨大，基部伏地。叶对生，卵形或长圆形。穗状花序顶生或腋生，花萼裂片4，线状披针形，边缘和背面有毛；花冠粉红色，2唇形。蒴果棒形。

性味归经：微苦，寒。归肝、肾经。

功能主治：清热解毒，消疳积。用于咽喉肿痛、感冒发热、小儿疳积；外治痈疮肿疖。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服。外用适量外敷。



穗状花序

花序腋生

叶长圆形

生境：田野草地、路旁较阴湿处。

科：透骨草科	种： <i>Phryma leptostachya</i> L.	药名：透骨草	别名：蝇毒草、粘人裙
--------	----------------------------------	--------	------------

透骨草

药用部位：全草。

植物特征：多年生直立草本。茎分枝少，有四棱，密生微毛，节间较长，节部膨大，表面有纵条纹。叶对生，叶片卵形，边缘有粗锯齿，两面疏生细柔毛。花白色，顶生或腋生长穗状的总状花序，花初开时向上，开后则渐转向下。蒴果在宿存萼中，成熟时下垂。

性味归经：涩，凉。归肝经。

功能主治：清热。治黄水疮，疥癣及虫疮毒。根可杀蝇蛆，全草能杀灭蔬菜青虫。

用法用量：10 ~ 15克，研末内服。外用适量捣敷。



花白色

花开后转向下

叶片卵形

叶边缘有粗锯齿

生境：山坡林边、沟谷丛林草丛中。

科：车前科	种： <i>Plantago major</i> L.	药名：车前子	别名：当道、牛舌草
-------	-----------------------------	--------	-----------



穗状花序

根出叶外展

大车前

药用部位：种子。

植物特征：多年生草本。全体光滑或稍有短毛。根出叶外展，叶柄和叶片几等长，基部膨大。花茎较叶片短或超出，有浅槽；穗状花序排列不紧密，花绿白色，花冠裂片披针形。蒴果椭圆形，近中部开裂；果内有种子，细小，黑色，腹面平坦。

性味归经：甘、淡，寒。归肺、肝、肾、膀胱经。

功能主治：清热利尿，渗湿止泻，明目，祛痰。主治小便不利、淋浊带下、水肿胀满、暑湿泻痢、目赤障翳、痰热咳喘。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服（包煎），或入丸、散。外用适量，水煎洗或研末调敷。

生境：路边、草地。

科：车前科	种： <i>Plantago depressa</i> Willd.	药名：车前子	别名：小车前
-------	------------------------------------	--------	--------



根生叶直立或平展

花序

平车前

药用部位：种子。

植物特征：一年生草本。有明显的圆柱形直根，须根少。根生叶直立或平展，椭圆状披针形或卵状披针形，无毛或有毛，纵脉3 ~ 7条。花茎略带弧状，花冠裂片椭圆形，顶端有浅齿。蒴果圆锥状，果内有种子5粒。

性味归经：甘、淡，微寒。归肺、肝、肾、膀胱经。

功能主治：清热利尿，渗湿止泻，明目，祛痰。主治小便不利、淋浊带下、水肿胀满、暑湿泻痢、目赤障翳、痰热咳喘。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服（包煎），或入丸、散。

生境：山坡、路旁、田边及河岸上。

科：茜草科	种： <i>Galium aparine</i> L. var. <i>tenerum</i> (Gren. et Godr.) Reichb	药名：猪殃殃	别名：拉拉藤、锯锯藤
-------	---	--------	------------

猪殃殃

药用部位：全草。

植物特征：蔓生或攀缘状草本。茎四棱形，棱上和叶背中脉及叶缘均有倒生细刺，触之粗糙。叶轮生，线状倒披针形，顶端有刺尖，表面疏生细刺毛，无柄。花3 ~ 10朵组成顶生或腋生的聚伞花序，花冠辐射状。果球形，密生钩毛，果柄直生。

性味归经：辛、苦，凉。归肺、肝经。

功能主治：热解毒，利尿消肿。治感冒，牙龈出血，急、慢性阑尾炎，泌尿系感染，水肿，痛经，崩漏，白带，癌症，白血病；外用治乳腺炎初起、痈疖肿毒、跌打损伤。

用法用量：50 ~ 100克，水煎服。外用适量，鲜品捣烂敷或绞汁涂患处。

生境：田野路旁。



科：茜草科	种： <i>Galium verum</i> L. var. <i>asiaticum</i> Nakai	药名：蓬子菜	别名：松叶草、黄米花、鸡肠草
-------	---	--------	----------------

蓬子菜

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本植物。茎近直立，密被短柔毛。叶轮生，狭条状，无柄，两侧密被柔毛，边缘反卷。聚伞圆锥花序，稍紧密；花小，淡黄色。果小，果瓣双生，近球状。

性味归经：苦、甘，温。归肺、肝经。

功能主治：解毒，利湿，止痒。用于急性荨麻疹、水田皮炎、静脉炎、痈疖疮。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服。外用适量，鲜品捣烂敷患处。

生境：山坡、旷野、路旁草丛中。



科：忍冬科

种： *Lonicera tragophylla* Hemsl

药名：银花

别名：土银花

盘叶忍冬

药用部位：花蕾。

植物特征：落叶灌木。叶具短柄，矩圆形至椭圆形。聚伞花序集成头状，花冠黄色至橙黄色，上部外面略带红色，裂片唇形，上唇直立而略反转，具4裂片，下唇反转。浆果红色，近球形，直径约1厘米。

性味归经：甘，寒。归肺、胃、大肠经。

功能主治：清热解毒，凉散风热。用于痈肿疔疮、喉痹、丹毒、热血毒痢、风热感冒、温病发热。

用法用量：3 ~ 9克，水煎服。外用适量捣敷患处。

裂片唇形

叶椭圆形



生境：杂木林中。

科：忍冬科

种： *Lonicera japonica* Thunb.

药名：金银花

别名：忍冬

金银花

药用部位：花蕾。

植物特征：常绿缠绕灌木。叶对生，卵形至长卵形，初时两面有毛，后则上面无毛。花成对腋生，花梗及花均有短柔毛；花冠初开时白色，后变黄色，外被柔毛和腺毛，花冠筒细长。浆果球形，熟时黑色。

性味归经：甘，寒。归肺、心、胃经。

功能主治：凉散风热。用于痈肿疔疮、喉痹、丹毒、热血毒痢、风热感冒、温病发热。

用法用量：6 ~ 15克，水煎服，或泡茶饮用。

使用注意：脾胃虚寒及气虚体弱者慎用。

花初开时白色

花成对腋生

叶对生



生境：路旁、山坡灌丛或疏林中。

科：忍冬科	种： <i>Sambucus williamsii</i> Hance.	药名：接骨木	别名：舒筋树、续骨树
-------	--------------------------------------	--------	------------

接骨木

药用部位：叶、花、果、根。

植物特征：落叶小乔木。叶对生，单数羽状复叶；小叶边缘有较粗锯齿，两面无毛。圆锥花序顶生，密集成卵圆形至长椭圆状卵形；花萼钟形，花冠辐射状，花淡黄色。浆果圆形，鲜红色。

性味归经：甘、苦，平。归肝经。

功能主治：祛风，利湿，活血，止痛。治风湿筋骨疼痛、腰痛、水肿、风痒、瘾疹、产后血晕、跌打肿痛、骨折、创伤出血。

用法用量：15 ~ 25克，水煎服，或入丸、散。外用捣敷或煎水熏洗。

使用注意：孕妇忌服。



生境：向阳山坡或栽培于庭园。

科：败酱科	种： <i>Patrinia scabiosaefolia</i> Fisch.	药名：败酱草	别名：黄花龙牙
-------	--	--------	---------

败酱



药用部位：根和根状茎。

植物特征：多年生草本。根状茎横走，地上茎下部有脱落性倒生粗毛，茎上部近无毛或有一排硬毛。基部叶簇生，卵形或长卵形，有长柄；茎生叶对生，披针形或阔卵形。顶生大型伞房状聚伞花序，苞片小，花萼不明显，花冠黄色。瘦果长椭圆形。

性味归经：苦、平。归肝、大肠经。

功能主治：清热利湿，解毒排脓，

活血去淤。主治阑尾炎、肠炎、肝炎、痢疾、产后淤血腹痛、痈肿疔疮。

用法用量：5 ~ 10克，水煎服。外用适量捣烂外敷。



生境：山坡草丛中。

科：败酱科	种： <i>Valeriana offeinalis</i> L.	药名：缬草	别名：鹿子草、甘松
-------	-----------------------------------	-------	-----------

缬草

药用部位：根及根茎。

植物特征：多年生草本。茎直立，有纵条纹，具纺锤状根茎或多数细长须根。基生叶丛出，长卵形，小叶片9 ~ 15，全缘或具少数锯齿，叶柄长；茎生叶对生，无柄抱茎，单数羽状全裂。伞房花序顶生，排列整齐；花小，白色或紫红色。蒴果光滑，具种子1。



性味归经：辛、苦，温。归心、肝经。

功能主治：安神镇静，驱风解痉，生肌止血，止痛。治心神不安、胃弱、腰痛、月经不调、跌打损伤。

用法用量：5 ~ 7.5克，水煎服，或研末或浸酒。

使用注意：体弱阴虚者慎用。

生境：山坡草地。

科：川续断科	种： <i>Dipsacus asperoides</i> C. Y. Cheng et T. M. Ai	药名：川续断	别名：接骨草、小血转
--------	---	--------	------------

续断

药用部位：根部。

植物特征：多年生草本。叶对生；基生叶有长柄，茎生叶羽状分裂，椭圆形至椭圆状广卵形，两面密被白色贴伏的柔毛。头状花序球形或广椭圆形；总苞片数枚，线形，每花外有一倒卵形苞片，花冠红紫色，4浅裂，裂片卵圆形；瘦果楔状长圆形，具4棱，淡褐色，花萼宿存。

性味归经：苦、辛，微温。归肝、肾经。

功能主治：补肝肾，续筋骨，调血脉。治腰背酸痛、足膝无力、胎漏、崩漏、带下、遗精、跌打损伤、金疮、痔漏、痈疽疮肿。

用法用量：10 ~ 20克，水煎服，或入丸、散。外用捣敷患处。



生境：山坡草地、土壤较湿处或溪沟旁，阳坡草地亦有生长。


科：川续断科	种： <i>Dipsacus japonicus</i> Miq.	药名：续断	别名：山萝卜
日本续断 药用部位：根。 植物特征：多年生草本。根单一，粗壮，木质。基生叶长椭圆形，3裂或不裂，有长柄；茎生叶对生，倒卵状椭圆形，边缘有粗锯齿，两面被白色贴伏柔毛，叶柄明显。头状花序顶生，每花外有苞片1枚，长倒卵形，花小，紫红色。瘦果。 性味归经：苦、辛、甘，微温。 功能主治：补肝肾，行血脉，续筋骨，安胎。治腰膝酸软、遗精、尿频、风湿痹痛、筋骨折伤、跌打损伤、崩漏下血、胎动不安。 用法用量：6 ~ 15克，水煎服，或入丸、散剂。  头状花序顶生  花小，紫红色 生境：山地草甸较湿沟谷处。			

科：葫芦科	种： <i>Bolbostemma paniculatum</i> (Maxim.) Franquet	药名：土贝母	别名：大贝母、草贝
假贝母 药用部位：鳞茎。 植物特征：攀缘草本。地下鳞茎肥厚，白色，瓣大小成对，各对交互对生呈扁球形。茎细弱，有卷须。叶互生，具柄，心形，掌状深裂。花单性，雌雄异株，腋生，花冠淡黄绿色。蒴果圆筒状，平滑，成熟后顶端盖裂。种子斜方形，表面棕黑色，先端具膜质翅。 性味归经：苦、凉。归肝、脾、肺、大肠经。 功能主治：散结，消肿，解毒。用于乳痈、瘰疬、乳腺炎、颈淋巴结结核、慢性淋巴结炎、肥厚性鼻炎。 用法用量：4.5 ~ 9克，水煎服。  叶心形  地下鳞茎肥厚 生境：山坡、平原草丛及灌木丛中。			

科：葫芦科	种： <i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Mak.	药名：绞股蓝	别名：七叶胆、五叶参
叶缘有锯齿 复叶 卷须生于叶腋 绞股蓝 药用部位：全草。 植物特征：多年生草质藤本。茎细长，有1～3米，横断面呈五角形或多边形，卷须生于叶腋。复叶，小叶膜质，被糙毛；侧生小叶卵状长圆形或长圆状披针形，中央一枚较大，叶缘有锯齿，齿尖具芒。果实圆球形，味苦，有草腥气。 性味归经：寒、苦。归肺、脾、肾经。 功能主治：补气养阴，清肺化痰，养心安神，生精固精。治疗气管炎、咽喉炎、偏头痛、降血压、降血脂、助睡眠等。 用法用量：15～30克，水煎服，或3～6克，研末吞服或泡茶。外用适量捣烂涂擦。 草质藤本 生境：较湿润的林中。			

科：葫芦科	种： <i>Thladiantha dubia</i> Bunge.	药名：赤雹	别名：王瓜
单生花朵 赤雹 药用部位：果实、块茎。 植物特征：多年生草质藤本。块根纺锤形，肥大。茎细弱，多分枝。卷须2歧，被短柔毛。叶互生，叶片纸质，阔卵形或圆形。花雌雄异株；雄花总状花序，或1单花与其并生，雌花单生，花梗短。果实卵圆形。 性味归经：①果：酸、苦，平。②块根：苦，寒。归心、肾经。 功能主治：①果：理气，活血，祛痰，利湿。治跌打损伤、暖气吐酸、黄疸肠炎、肺结核咯血。②块根：治乳汁不下，乳房胀痛。 用法用量：①果：5～15克，水煎服或研末。②块根：5～10克，研末服用。 使用注意：块根孕妇慎用。 叶片纸质 生境：山谷森林中、山坡疏林中或灌丛中。			

科：葫芦科	种： <i>Luffa cylindrical</i> (L.) Roem.	药名：丝瓜络、丝瓜	别名：水瓜
-------	--	-----------	-------



叶掌状心形

瓠果长圆柱形

叶边缘有波状浅齿

丝瓜

药用部位：果络、种子。

植物特征：一年生攀缘草本。枝具棱，有卷须。叶片掌状心形，边缘有波状浅齿。花雌雄同株，雄花为总状花序，先开，雌花单生，花冠浅黄色。瓠果长圆柱形，下垂。种子扁矩卵形，黑色。

性味归经：甘，凉。归肺、肝经。

功能主治：清热化痰，凉血解毒，解暑除烦，通经活络。主治热病身热口渴、痰喘咳嗽、肠风痔漏、疮痈肿、妇女乳汁不下等。

用法用量：5 ~ 25克。水煎服。

使用注意：脾胃虚寒、腹泻不宜。

花冠浅黄色

生境：常见栽培。

科：葫芦科	种： <i>Citrullus lanatus</i> L.	药名：西瓜翠衣	别名：夏瓜、寒瓜
-------	--------------------------------	---------	----------



幼果

叶片3全裂

瓠果表面具深浅相间的条纹

西瓜

药用部位：果皮。

植物特征：一年生蔓生草本。茎细弱，匍匐，嫩枝密被毛；卷须2分叉，被毛。叶互生；叶片三角状卵形、广卵形等，3深裂或近3全裂。花单生，花冠合生成漏斗状，外面绿色，被长柔毛。瓠果近圆形或长椭圆形，表面绿色、浅绿色，多具深浅相间的条纹。种子多数，扁平，略呈卵形。

性味归经：甘，凉。归脾、胃经。

功能主治：清暑解热，止渴，利小便。治暑热烦渴、小便短少、水肿、口舌生疮。

用法用量：15 ~ 50克，水煎服。

生境：常见栽培。

科：葫芦科	种： <i>Cucumis melo</i> L.	药名：苦丁香	别名：甜瓜、果瓜
-------	---------------------------	--------	----------

香瓜

药用部位：瓜蒂。

植物特征：一年匍匐或攀缘草本。茎、枝黄褐色或白色的糙毛和突起。叶片厚纸质，近圆形或肾形，边缘不分裂或3 ~ 7浅裂。花雌雄同株，雄花簇生于叶腋，花冠黄色；雌花单生。果实球形或长椭圆形，果皮平滑，有纵纹或斑纹。



叶片厚纸质

性味归经：苦，寒，有毒。归胃、肺、大肠。

功能主治：内服，行水湿、退黄疸。治涌吐热痰、宿食。外用可引去湿热、湿热黄疸、湿家头痛。

用法用量：2.5 ~ 5克，水煎服，0.3 ~ 1克，入丸、散。外用小量，研末畜鼻，待鼻中流出黄水即停药。

使用注意：本品有毒，内服谨慎。



生境：常见栽培。

科：葫芦科	种： <i>Benincasa hispida</i> (Thunb.) Cogn.	药名：冬瓜皮	别名：白皮
-------	--	--------	-------

冬瓜

药用部位：果实。

植物特征：一年生攀缘草本。叶片心状卵形，通常5 ~ 7浅裂，裂片三角形或卵形。花单生叶腋，黄色。果实长椭圆形，幼时绿色，表面密被针状毛，成熟后有白色蜡质粉质，果肉肥厚纯白，疏松。种子卵形。

性味归经：甘、淡，凉。归肺、大肠、小肠、膀胱经。

功能主治：润肺生津，化痰止渴，利尿消肿，清热祛暑，解毒排脓。可用于暑热口渴、痰热咳喘、水肿、脚气、胀满、消渴、痤疮、面斑、脱肛、痔疮等，还能解鱼、酒毒。

用法用量：10 ~ 15克，水煎服；鲜果可捣汁内服。外用适量捣敷。

使用注意：脾胃虚寒、肾虚者不宜多服。



生境：常见栽培。

科：葫芦科	种： <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim.	药名：瓜蒌皮、天花粉	别名：山金匏、药瓜皮
瓜蒌 药用部位：果实、根状茎。 植物特征：多年生草质藤本。茎有棱线，卷须2 ~ 3歧。叶互生，叶片宽卵状心形，3 ~ 5浅裂至深裂，边缘常再分裂。花常单生，花冠白色，裂片扇状倒三角形，先端流苏状。果实椭圆形至球形，果瓢橙黄色。种子扁椭圆形。 性味归经：甘、微苦，寒。归肺、胃、大肠经。 功能主治：① 果实清热涤痰，宽胸散结，润肠；② 根清热生津、消脓排肿。用于肺热咳嗽、痰浊黄稠、胸痹心痛、乳痈、肺痈、肠痈肿痛。 用法用量：5 ~ 30克，水煎服，1.5 ~ 3克，入丸、散。  生境：山坡、草丛、林缘半阴处。			

科：葫芦科	种： <i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim	药名：王瓜	别名：土瓜
王瓜 药用部位：果实。 植物特征：多年生攀缘草本。根肥大，块状。茎细长，有卷须。叶互生，掌状，浅3裂或5裂，缘具齿。花腋生，雌雄异株，花冠白色。瓠果球形乃至长椭圆形，熟时带红色。 性味归经：苦，寒。心、肾经。 功能主治：清热，生津，消淤，通乳。治消渴、黄疸、反胃、经闭、乳汁少，痈肿、慢性咽喉炎。 用法用量：15 ~ 50克，烧存性研末入丸、散。外用捣敷患处。 使用注意：孕妇忌服。  生境：山谷沟旁。			

科：葫芦科	种： <i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl. var. <i>depressa</i> (Ser.) Hara	药名：壶卢	别名：瓠瓜
-------	---	-------	-------

瓢瓜

药用部位：果实。

植物特征：一年生攀缘草本。全株苍绿色，被软毛；卷须分枝。叶互生；叶片心状卵圆形或肾状卵圆形，有长叶柄，顶端具腺齿2枚。花雌雄同株，单生于叶腋，花瓣白色，稍圆形。果实扁圆球形或梨形，幼时略柔软，淡绿色，熟后外皮变硬，近于白色。种子白色，多数，呈倒卵状长椭圆形。

性味归经：甘、淡，平。归肺、脾、肾经。

功能主治：利水，通淋。治水肿、腹胀、黄疸、淋病。

用法用量：20 ~ 50克，水煎服，或煨存性研末。

生境：常见栽培。



科：葫芦科	种： <i>Momordica charantiap</i> L.	药名：苦瓜	别名：凉瓜、锦荔枝、癞葡萄、癞瓜
-------	-----------------------------------	-------	------------------

苦瓜

药用部位：果实。

植物特征：一年生攀缘草本。叶互生，掌状5 ~ 7深裂。花小，单性，雌雄同株，黄色。长不超过2厘米。果实纺锤形，有瘤状凸起，成熟时橙黄色，味苦，瓢鲜红色，味甜。

性味归经：苦，寒。归脾、胃、心、肝经。

功能主治：清热祛心火、解毒、明目、补气益精、止渴消暑、治痢。

用法用量：10 ~ 15克，水煎服。

使用注意：孕妇不宜。

生境：常见栽培。



科：葫芦科	种： <i>Cucurbita moschata</i> (Duch.) poiret	药名：南瓜子	别名：北瓜、金瓜
-------	---	--------	----------

南瓜

药用部位：种子。

植物特征：一年生蔓生草本。茎有短刚毛，卷须3 ~ 4裂。叶片稍柔软，宽卵形或卵圆形，5浅裂，两面密生粗糙毛，边缘有细齿。花雌雄同株，单生，黄色；雄花花萼裂片线形，花冠钟状，雄蕊3；雌花花萼裂片显著叶状，花柱短。瓜蒂扩大成喇叭状。果实常有数条纵沟。

性味归经：甘，平。归肾、大肠经。

功能主治：驱虫，消肿。用于治绦虫、蛔虫、产后手足浮肿、百日咳、痔疮。

用法用量：100 ~ 400克，炒熟研末服用。



生境：常见栽培。

科：桔梗科	种： <i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A. DC.	药名：桔梗	别名：苦菜根
-------	--	-------	--------

桔梗

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。全株有白色乳汁。主根长纺锤形，少分枝。茎无毛，通常不分枝或上部稍分枝。叶轮生、对生或互生，叶片卵形至披针形，下面被白粉。花1朵至数朵单生，花冠阔钟状，蓝色或蓝紫色。蒴果倒卵圆形，熟时顶部5瓣裂。种子多数，褐色。

性味归经：苦、辛，平。归肺、经胃。

功能主治：宣肺，祛痰，利咽，排脓。主治咳嗽痰多、咽喉肿痛、肺痈吐脓、胞满胁痛、痢疾腹痛、小便癃闭。

用法用量：内服煎汤，3 ~ 10克；或入丸、散。外用适量，烧灰研末敷。



生境：山地草坡、林缘，或有栽培。

科：桔梗科	种： <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf	药名：党参	别名：仙草根、叶子菜
-------	---	-------	------------

党参

药用部位：根。

植物特征：草质藤本。有白色乳汁，具浓臭。叶卵形。花单生于枝端，花冠阔钟状，黄绿色，内面有紫斑，先端5浅裂。蒴果短圆锥状。

性味归经：甘、微酸，平。归脾、肺经。

功能主治：补中益气，健脾益肺。用于脾肺虚弱、气短心悸、食少便溏、虚喘咳嗽、内热消渴。

用法用量：9 ~ 30克，水煎服，或入丸、散。

花冠阔钟状，黄绿色

蒴果短圆锥状

叶卵形

生境：山地灌木林下及草丛中。

科：桔梗科	种： <i>Codonopsis lanceolata</i> Benth. et Hook.	药名：羊乳	别名：四叶参
-------	---	-------	--------

羊乳

药用部位：根。

植物特征：多年生缠绕草本。全株富含白色乳液，具特殊腥臭气味。根粗壮肥大，纺锤形或近圆锥形，外皮粗糙，灰棕色至土黄色，单生或下部分歧。叶互生，着生在短侧枝顶端的叶常4片轮生，叶片广卵形。花多单生，稀成对生于侧枝顶端，花冠广钟形。蒴果扁圆锥形。

性味归经：甘、辛，平。归肝、脾、肺、大肠经。

功能主治：补益脾肺，解毒排脓。用于肺虚咳嗽、肺痈、肿毒、瘰癧、体虚少乳、白带等。

用法用量：25 ~ 75克（鲜品75 ~ 200克），水煎服。外用适量捣敷患处。

用法用量：25 ~ 75克（鲜品75 ~ 200克），水煎服。外用适量捣敷患处。

生境：山地林缘丛间、疏林下及河谷旁较湿处。

花单生

短侧枝顶端的叶4片轮生

花冠广钟状

科：桔梗科	种： <i>Adenophora trachelioides</i> Maxim.	药名：荠苎	别名：杏叶参
-------	---	-------	--------

荠苎

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。根肥大，长圆柱形或纺锤状圆柱形。基生叶心状肾形，茎生叶互生，有长柄，叶片心状广卵形或心状卵形。圆锥花序顶生，花冠鲜蓝或淡蓝紫色，广钟形，无毛，5浅裂。蒴果卵状圆锥形。种子黄棕色，两端黑色，长圆形，稍扁。

性味归经：甘，寒。归肺、脾经。

功能主治：清热，解毒，化痰。治燥咳、喉痛、消渴、疔疮肿毒。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服，或研末吞服、做丸。外用研末调敷或捣敷患处。



生境：林间草地、山坡及路旁。

科：桔梗科	种： <i>Adenophora polyantha</i> Nakai	药名：南沙参	别名：白参
-------	--------------------------------------	--------	-------

石沙参

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。根粗长，圆柱形，灰褐色。基生叶有长柄，叶片心状卵圆形或心状肾形，早枯；茎生叶互生，叶片质厚，稍有光泽，披针形、卵状披针形或长卵形至卵形，

稀线状披针形。花鲜蓝色，花冠钟形，花柱稍伸出花冠。蒴果卵状椭圆形。种子黄棕色，卵状椭圆形。

性味归经：甘，微寒。归肺、胃经。

功能主治：养阴清肺，化痰，益气。用于肺热燥咳、阴虚劳嗽、干咳痰黏、气阴不足、烦热口干。

用法用量：9 ~ 15克，水煎服。



生境：山沟丘陵地及山野较干燥的阳坡。

科：桔梗科

种： *Adenophora paniculata* Nannf.

药名：沙参

别名：长柱沙参

紫沙参

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。基生叶心形，不规则锯齿缘，早枯；茎生叶互生，通常无柄，卵状椭圆形、长圆状披针形、线状披针形或线形。花下垂，花冠筒状、筒状钟形或坛状钟形，蓝紫色或淡蓝紫色。蒴果卵形或卵状长圆形。种子椭圆形，棕黄色。

花冠筒状

性味归经：甘，微寒。归肺、胃经。

功能主治：养阴清肺，化痰，益气。用于肺热燥咳，阴虚劳嗽，干咳痰黏，气阴不足，烦热口干。

用法用量：9 ~ 15克，水煎服。

生境：草地林间。

科：桔梗科

种： *Adenophora divaricata* Franch. et Sav

药名：北沙参

别名：沙参

展枝沙参

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。根粗壮。基生叶早枯；茎生叶质较厚，轮生，无柄或柄极短，叶菱状卵形、椭圆形或狭卵状披针形，边缘具粗锐锯齿。花序圆锥状，花冠蓝色、蓝紫色或淡蓝色，钟形。蒴果扁倒圆锥形。

性味归经：甘、微苦，微寒。归肺、胃经。

功能主治：养阴清肺，益胃生津。用于肺热燥咳、劳嗽痰血、热病津伤口渴。

用法用量：4 ~ 9克，水煎服。

花冠淡蓝色

花冠钟形

生境：

山地草甸及林缘。

科：桔梗科	种： <i>Adenophora wawreana</i> Zahlbr.	药名：南沙参	别名：沙参
 多歧沙参 药用部位：根。 植物特征：多年生草本。茎直立，不分枝。基生叶心形，早枯；茎生叶互生，叶片广卵形、菱状卵形或狭卵形，稀为宽线形。圆锥花序，花冠蓝紫色，钟形。蒴果广椭圆形。种子长圆形。 性味归经：甘、微苦，微寒。归肺、胃经。 功能主治：养阴清肺，益胃生津。用于肺热燥咳、劳嗽痰血、热病津伤口渴。 用法用量：4 ~ 9克，水煎服。 生境：山地草甸及林缘。			

科：桔梗科	种： <i>Lobelia sessilifolia</i> Lamb.	药名：山梗菜	别名：大种半边莲
山梗菜 药用部位：根、叶或带花全草。 植物特征：多年生草本。全株无毛，根茎斜生，茎直立，叶互生，椭圆形至椭圆状披针形，边缘有细锯齿。花紫色，腋生，总状花序，萼钟形，5裂；萼管半球状梨形，有棱角；花冠唇形，倾向一边，下唇特大；花冠筒约1.5厘米，雄蕊5枚；花药聚生，子房上位，2室。蒴果球形，膜质，无毛，表面有细棱。 性味归经：辛，平。有小毒。归肺、大肠经。 功能主治：宣肺化痰，清热解毒，利尿消肿。用于支气管炎、肝硬化腹水、水肿；外用治毒蛇咬伤、蜂螫、痈肿疮疡。 用法用量：5 ~ 15克，水煎服。外用适量，鲜品捣烂敷患处。  生境：高山林下草地。			

科：桔梗科	种： <i>Wahlenbergia marginata</i> (Thunb.) A. DC.	药名：兰花参	别名：细叶沙参、金线吊葫芦
-------	--	--------	---------------

兰花参

药用部位：带根全草。

植物特征：多年生草本。直根较粗壮，侧根较多，淡黄色叶互生，倒披针形或线状披针形，边缘有疏生浅锯齿。花单生枝顶，淡蓝色。蒴果倒圆锥形，基部狭窄成果柄，成熟时草黄色，由顶端萼齿间开裂。种子多数，细小，长椭圆形，黑褐色，有光泽。



性味归经：甘、微苦，平。归脾、心经。

功能主治：补虚，解表。治虚损劳伤、咳血、鼻出血，自汗、盗汗，妇女白带、伤风咳嗽、胃痛、泻痢、刀伤。

用法用量：10 ~ 25克（鲜品50 ~ 100克），水煎服。外用适量捣烂敷。

生境：路边、石坎、沙地或石缝间。

科：菊科	种： <i>Eupatorium japonicum</i> Thunb.	药名：泽兰	别名：千金草
------	---------------------------------------	-------	--------

泽兰

药用部位：地上部分。

植物特征：多年生草本。茎被细毛。叶卵圆、椭圆或宽披针形，边缘有深浅大小不等的裂齿，两面有毛和腺点或至少背面有腺点，有叶柄。每一头状花序有管状花5朵；总苞片椭圆形，干膜质，顶端钝。瘦果有毛和腺点；冠毛与花冠等长。

性味归经：辛，平。归脾、胃、肺经。

功能主治：芳香化湿，醒脾开胃，发表解暑。用于湿浊中阻、脘痞呕恶、口中甜腻、口臭、多涎。

用法用量：6 ~ 10克，水煎服。



生境：山坡草地。

科：菊科	种： <i>Eupatorium lindleyanum</i> DC.	药名：白鼓钉	别名：尖佩兰
------	--------------------------------------	--------	--------

白鼓钉

药用部位：地上部分。

植物特征：草本。茎直立，绿色或紫红色。叶纸质，茎中部的3全裂；茎上部的叶有时互生，通常不裂，披针形。头状花序，花淡红色。瘦果纺锤形。

性味归经：辛，平。归脾、胃、肺经。

功能主治：芳香化湿，醒脾开胃，发表解暑。用于湿浊中阻、脘痞呕恶、口中甜腻、口臭、多涎。

用法用量：6 ~ 10克（鲜品15 ~ 30克）。水煎服。

生境：林缘、荒野或灌丛中。

茎上部叶披针形



科：菊科	种： <i>Kalimeris integrifolia</i> Turcz.	药名：马兰	别名：野粉团花
------	---	-------	---------

全缘马兰

药用部位：地上部分全草。

植物特征：多年生宿根性草本。茎直立，紫红色或青绿色。叶倒披针形，互生，叶色深绿，全缘。瘦果，倒卵形。

性味归经：甘、平，微寒。归肺、肝经。

功能主治：散热止血，抗菌消炎。适用于吐血、鼻出血，急性肝炎，咽喉、扁桃体炎，腮腺炎和乳腺炎等化脓性炎症。

用法用量：30 ~ 120克，水煎服。

生境：田野路旁。



科：菊科	种： <i>Doellingeria scaber</i> (Thunb.) Nees	药名：东风菜	别名：仙白草、土白前
------	---	--------	------------

东风菜

药用部位：根茎及全草。

植物特征：草本。根茎粗短，棕褐色。叶互生；具翅；叶片心形，网脉明显。头状花序排列成圆锥伞房状，花冠筒状。瘦果倒卵圆形或椭圆形。

性味归经：辛、甘，微寒。归肝、肾、肺经。

功能主治：清热解毒，明目，利咽。治风热感冒、头痛目眩、目赤肿痛、咽喉红肿、急性肾火、肺病吐血、跌打损伤、痈肿疮疖、蛇咬伤。

用法用量：15 ~ 30克，水煎服。外用适量，鲜全草捣敷患处。

生境：山地林缘及溪谷旁草丛中。

头状花序排列成伞房状

叶网脉明显

舌片白色



科：菊科	种： <i>Aster tataricus</i> L.	药名：紫菀	别名：驴耳朵菜、软紫菀
------	------------------------------	-------	-------------

紫菀

药用部位：根和根茎。

植物特征：多年生草本。茎直立，上部疏生短毛。基生叶丛生，长椭圆形，基部渐狭成翼状柄，边缘具锯齿，花期枯萎；茎生叶互生，卵形或长椭圆形。头状花序排成伞房状，舌状花蓝紫色，筒状花黄色。瘦果有短毛。

性味归经：辛、苦，温。归肺经。

功能主治：润肺下气，消痰止咳。用于痰多喘咳、新久咳嗽、劳嗽咳血。

用法用量：5 ~ 9克，水煎服。



生境：阴坡、草地、河边。

科：菊科	种： <i>Anaphalis hancockii</i> Maxim	药名：五月霜	别名：灵香蒿、零陵香、铃铃香
------	-------------------------------------	--------	----------------

铃铃香青

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。根状茎细长，稍木质。茎直立，稍细。莲座状叶及茎下部叶匙状或条状长圆形；中部及上部叶条形或条状披针形。头状花序9 ~ 15个密集成复伞房状；总苞宽钟形，总苞片外层卵圆形，红褐色或黑褐色；雌株头状花序有多层雌花。瘦果长圆形。

性味归经：苦、微辛，凉。归膀胱经。

功能主治：清热，燥湿，杀虫。主治子宫炎、滴虫性阴道炎。

用法用量：6 ~ 12克，水煎服。



生境：海拔2000 ~ 3700米的亚高山顶及山坡草地。

科：菊科	种： <i>Gnaphalium affine</i> D. Don	药名：鼠耳草	别名：寒食菜、佛耳草
------	------------------------------------	--------	------------

鼠耳草

药用部位：全草。

植物特征：二年生草本。全株密被白绵毛。茎直立。叶互生，基生叶花后调落，下部和中部叶匙形或倒披针形。头状花序多数，排成伞房状；总苞球状钟形，总苞片金黄色，干膜质；花黄色，边缘雌花花冠丝状，中央两性花管状。瘦果长椭圆形。

性味归经：甘、平。归肺经。

功能主治：祛痰，止咳，平喘，祛风湿。用于咳嗽、痰喘、风湿痹痛。

用法用量：10 ~ 15克，水煎服。



生境：山坡、路旁、田边。

科：菊科	种： <i>Inula Britannica</i> L.	药名：旋复花	别名：小黄花、野菊花
------	-------------------------------	--------	------------

旋复花

药用部位：花。

植物特征：多年生草本。叶互生，椭圆形、椭圆状披针形或窄长椭圆形，花顶生，呈伞房状排列，舌状花1层，黄色，雌性；管状花两性，位于花序的中央。瘦果长椭圆形，被白色硬毛，冠毛白色。

性味归经：咸，温。归肺、肝、胃经。

功能主治：消痰，下气，软坚，行水。治胸中痰结、胁下胀满、咳喘、呃逆、唾如胶漆、心下痞鞭、噎气不除、大腹水肿。

用法用量：7 ~ 15克，水煎服（包煎或滤去毛），或入丸、散。外用煎水洗，研末干撒或调敷。



生境：山坡、路旁、田边或水旁湿地。

科：菊科

种： *Inula helenium* L.

药名：土木香

别名：青木香、祁木香

土木香

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。根茎块状而有分歧。全株密被短柔毛。基生叶大形无柄，半抱茎，长椭圆形，基部心形。头状花序腋生，花黄色，排成伞房花序，边缘为舌状雌花，中心管状花两性，瘦果，冠毛浅灰白色。

性味归经：辛、苦，温。归肝、脾经。

功能主治：健脾和胃，调气解郁，止痛安胎。用于胸胁、脘腹胀痛，呕吐泻痢，胸胁挫伤，岔气作痛，胎动不安。

用法用量：3 ~ 9克。多入丸、散。

生境：水边荒地、河滩、湿润草地。

科：菊科

种： *Carpesium abrotanoides* L.

药名：天名精

别名：玉门精、挖耳草

天名精

药用部位：根及茎叶。

植物特征：多年生草本。有臭味。茎直立，上部多分枝，有细软毛。茎下部叶互生，稍有柄，叶片广椭圆形或长椭圆形。管状花，黄色。瘦果长，顶端有线形短喙，无冠毛。

性味归经：辛，寒。归肝、肺经。

功能主治：祛痰，清热，破血，止血，解毒，杀虫。治乳蛾、喉痹、疟疾、急性肝炎、急慢惊风、虫积、血瘕、鼻出血、血淋、疗肿疮毒、皮肤痒疹。

用法用量：15 ~ 25克，水煎服，捣汁或入丸、散。外用捣敷或煎水熏洗。

生境：山野草丛中。

管状花黄色

叶片广椭圆形

叶互生

科：菊科	种： <i>Xanthium mongolicum</i> Kitag.	药名：苍耳子	别名：刺儿棵、疔疮草、粘粘葵
------	--------------------------------------	--------	----------------

蒙古苍耳

药用部位：带总苞的果实。

植物特征：草本。茎粗糙，有短毛。叶互生，三角状卵形，边缘有缺刻或3 ~ 5浅裂，有不规则粗锯齿，两面有粗毛。头状花序顶生或腋生，雌雄同株，雄花序在上，球形，花冠筒状，5齿裂；雌花序在下。果实卵圆形，外面有钩刺和短毛。

性味归经：辛、温。归肺、肝、肾经。

功能主治：散风湿，通鼻窍。用于风寒头痛、鼻渊流涕、风疹瘙痒。

用法用量：7 ~ 15克，水煎服或入丸、散。

使用注意：血虚之头痛、痹痛忌服。

果实有钩刺

叶缘有浅裂

生境：荒地、山坡等干燥向阳处。

科：菊科	种： <i>Bidens tripartita</i> L.	药名：狼把草	别名：豆渣菜、郎耶菜
------	--------------------------------	--------	------------

狼把草

药用部位：地上部分全草。

植物特征：一年生草本。茎直立，基部略匍匐，近地面节上长生根，无毛。叶对生，中部及下部的叶长椭圆形，通常3 ~ 5回羽状深裂。花黄色，头状花序顶生或腋生。瘦果倒卵状楔形，扁平，瘦果上生向后的刺毛，冠毛呈芒状，通常2枚。


性味归经：苦、甘，平。归心、肺、大肠经。


功能主治：清热解毒，养阴敛汗。用于感冒、扁桃体炎、咽喉炎、肠炎、痢疾、肝炎、泌尿系感染、肺结核盗汗、闭经；外用治疗肿、湿疹、皮癣。

用法用量：25 ~ 50克，水煎服。外用适量，鲜草捣烂敷，鲜草绞汁搽患处。

花黄色

生境：水沟或水田边。

科：菊科	种： <i>Bidens bipinnata</i> L.	药名：鬼针草	别名：婆婆针
 花黄色 鬼针草 药用部位：地上部分全草。 植物特征：一年生草本。茎直立，下部略带淡紫色，上部通常方柱形。中下部叶对生，叶片通常2回羽状深裂。头状花序，舌状花黄色，通常1 ~ 4朵；管状花黄色，两性。瘦果线形，有短毛，有3 ~ 4枚棱脊在顶端延伸成芒刺。 性味归经：苦，平。归肺、胃、大肠、胆经。 功能主治：清热，解毒，散淤，消肿。用于疟疾、腹泻、痢疾、肝炎、急性肾炎、胃炎、噎膈、肠痈、咽喉肿痛、跌打损伤、蛇虫咬伤。 用法用量：15 ~ 30克（鲜品30 ~ 60克），水煎服或捣汁内服。外用捣敷或煎水熏洗。  头状花序			
生境：路旁、荒野、林缘、沟边。			

科：菊科	种： <i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	药名：辣子草	别名：兔儿草、铜锤草
 花顶生或腋生 白色舌状花 叶基生三出脉 辣子草 药用部位：地上部分全草。 植物特征：一年生草本。茎圆形，有细条纹，略被毛，节膨大。单叶对生，草质，卵圆形或披针状卵圆形至披针形，边缘有浅圆齿，基生三出脉，叶脉在上面凹下，下面凸起。头状花序小，顶生或腋生，有长柄，外围有少数白色舌状花，盘花黄色。瘦果有角，顶端有鳞片。 性味归经：淡，平。归肝、胃经。 功能主治：清热解毒、利湿退黄、凉血止血。主治扁桃体炎、咽喉炎、急性黄疸型肝炎、外伤出血。 用法用量：50 ~ 100克，水煎服。外用适量研末。 			
生境：庭园、荒地或山坡。			

科：菊科	种： <i>Achillea alpina</i> L.	药名：高山蓍	别名：羽衣草、蚰蜒草、锯齿草
------	------------------------------	--------	----------------

高山蓍



药用部位：果实。

植物特征：多年生草本。具短根状茎。叶互生；无柄；叶片长线状披针形，栉齿状羽状深裂

或浅裂，裂片线形。头状花序多数，舌状花雌性，白色，花冠长圆形，先端3浅裂；中心管状花，两性，白色，花药黄色，伸出花冠外面。瘦果扁平，宽倒披针形，有淡色边肋。

性味归经：酸、苦，平。归肝经。

功能主治：益气，润泽肌肤，明目聪慧。主治气虚体弱、视物昏花。

用法用量：5 ~ 10克，水煎服或入丸、散。



生境：高山草地林下。

科：菊科	种： <i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat.	药名：菊花	别名：黄花、帝女花
------	---	-------	-----------

菊花

药用部位：花。

植物特征：多年生草本植物。茎色嫩绿或褐色，除悬崖菊外多为直立分枝，基部半木质化。单叶互生，卵圆至长圆形，边缘有缺刻及锯齿。头状花序顶生或腋生，一朵或数朵簇生。舌状花为雌花，筒状花为两性花。舌状花色彩丰富。

性味归经：甘、苦，微寒。归肺、肝经。

功能主治：散风清热，平肝明目。用于风热感冒、头痛眩晕、目赤肿痛、眼目昏花。

用法用量：5 ~ 9克，水煎服或泡茶饮，也可入丸、散。



舌状花



花蕾



生境：常见栽培。

科：菊科	种： <i>Chrysanthemum seticuspe</i> (Maxim.) Hand.-Mazz.	药名：野菊	别名：山菊花、甘菊花
------	--	-------	------------

甘野菊

药用部位：花。

植物特征：多年生草本。茎基部常匍匐，上部多分枝。叶互生，卵状三角形或卵状椭圆形，羽状分裂，裂片边缘有锯齿，叶柄下有明显的假托叶。头状花序排成聚伞状，舌状花小，黄色，雌性；中央为管状花，先端5裂，两性。

性味归经：苦、辛，微寒。归肝、肺经。

功能主治：清热解毒。用于疮痈肿、目赤肿痛、头痛眩晕。

用法用量：5 ~ 10克。水煎服或泡茶饮，也可入丸、散。



生境：路旁、山坡、原野。

科：菊科	种： <i>Artemisia capillaries</i> Thunb.	药名：茵陈	别名：臭蒿
------	--	-------	-------

茵陈蒿

药用部位：地上部分全草。

植物特征：多年生草本。茎直立，木质化，表面有纵条纹，多分枝。营养枝上的叶，叶片2 ~ 3回羽状裂或掌状裂，密被白色绢毛；花枝上的叶无柄，羽状全裂，裂片呈线形或毛管状，基部抱茎，绿色，无毛。头状花序多数，花杂性，淡紫色，均为管状花。瘦果长圆形，无毛。

性味归经：苦、辛，凉。归肝、脾、膀胱经。

功能主治：清热利湿。治湿热黄疸，小便不利，风痒疮疥。配栀子、大黄治阳黄；配附子、干姜治阴黄。

用法用量：15 ~ 25克，水煎服。外用煎水洗。

使用注意：非因湿热引起的发黄忌服。



生境：山坡、河岸、砂砾地。

科：菊科	种： <i>Artemisia eriopoda</i> Bunge	药名：南牡蒿	别名：菊蒿
------	------------------------------------	--------	-------

南牡蒿

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。主根明显，粗短，有侧根；根状茎稍粗短，肥厚。叶片通常羽状深裂，裂片宽倒卵形，先端又掌状分裂，有时匙形而边有齿或浅裂。头状花序小，多数，雌花花冠狭长状，花柱伸出；两性花不孕育。瘦果小，长圆形。

性味归经：苦、微甘，温。归肝经。

功能主治：祛风除湿，解毒。用于风湿关节痛、头痛、浮肿、毒蛇咬伤。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服。外用适量捣敷患处。

生境：荒野、山坡、路边及河岸边。



科：菊科	种： <i>Artemisia apiacea</i> Hance	药名：青蒿	别名：臭青蒿、香丝草、酒饼草
------	-----------------------------------	-------	----------------

青蒿

药用部位：全草。

植物特征：一年生或二年生草本。全体平滑无毛。茎圆柱形，表面有细纵槽，下部稍木质化，上部叶腋间有分枝。叶互生，2回羽状全裂，全缘，两面平滑无毛，青绿色。头状花序排列成总状圆锥花序，花绿黄色，花冠管状。瘦果矩圆形至椭圆形，微小，褐色。

性味归经：苦、微辛，寒。归肝、胆经。

功能主治：清热，解暑，除蒸，截疟。主治暑热、暑湿、湿温、阴虚发热、疟疾、黄疸。

用法用量：6 ~ 15克，水煎服，治疟疾可用20 ~ 40克，不宜久煎；鲜品用量加倍，水浸绞汁服用，或入丸、散。外用适量，研末调敷；或鲜品捣敷；或煎水。

生境：旷野、山坡、路边、河岸等。





科：菊科	种： <i>Artemisia lavandulaefolia</i> DC.	药名：艾	别名：艾草
野艾蒿 药用部位：全草。 植物特征：草本。茎下部叶在开花时枯萎；中部叶不规则互生，具短柄，叶片羽状深裂；上部叶无柄，顶端叶全缘，披针形或条状披针形。头状花序，花红色、淡黄色或淡褐色。 性味归经：苦、辛，温。归脾、  肝、肾经。 功能主治：理气血，逐寒湿，止血，安胎。治心腹冷痛、吐衄、下血、月经不调、胎动不安、痈疡。 用法用量：5 ~ 15克，水煎服，或入丸、散或捣汁。外用捣碎作炷或制成艾条熏灸，捣敷、煎水熏洗或炒热温熨。			
生境：路旁荒野、草地。			

科：菊科	种： <i>Tussliago. Farfara</i> L.	药名：款冬花	别名：九九花
款冬 药用部位：花蕾。 植物特征：草本。基生叶广心形或卵形，小叶互生，叶片长椭圆形至三角形。头状花序顶生，舌状花鲜黄色，单性。瘦果长椭圆形，具纵棱，冠毛淡黄色。  舌状花鲜黄色 性味归经：辛，温。归肺经。 功能主治：润肺下气，化痰止嗽。治咳逆喘息、喉痹。 用法用量：2 ~ 15克，水煎服，熬膏或入丸、散。 药材			
生境：河边、沙地。			

科：菊科	种： <i>Syneilesis aconitifolia</i> (Bunge) Maxim.	药名：兔儿伞	别名：雷骨散、雨伞菜、一把伞
兔儿伞 药用部位：根或全草。 植物特征：草本。根状茎匍匐。茎叶互生，叶片圆盾形，掌状深裂。花淡红色。瘦果圆柱形。 性味归经：辛，微温。归肝、肾经。 功能主治：祛风湿，舒筋活血，止痛。用于腰腿疼痛、跌打损伤。 用法用量：10 ~ 25克，水煎服或泡酒。   掌状深裂 叶片圆盾形			
生境：山坡、荒地、林缘、路旁。			

科：菊科	种： <i>Atractylodes chinensis</i> (DC.) koidz	药名：苍术	别名：赤术、青术
------	--	-------	----------

北苍术

药用部位：根茎。

植物特征：多年生草本。根状茎肥大呈结节状。茎不分枝或上部稍分枝。叶革质，无柄，倒卵形或长卵形，不裂或3 ~ 5回羽状浅裂，边缘有不连续的刺状牙齿，上部叶披针形或狭长椭圆形。头状花序顶生，花筒状，白色。瘦果密生银白色柔毛。

性味归经：辛、苦，温。归脾、胃、肝经。

功能主治：燥湿健脾，祛风散寒，明目。用于脘腹胀满、泄泻水肿、脚气痿痹、风湿痹痛、风寒感冒、夜盲。

用法用量：3 ~ 9克，水煎服或入丸、散。



生境：山坡、林下及山坡草地。

科：菊科	种： <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz	药名：白术	别名：于术、冬术
------	---	-------	----------

白术

药用部位：根茎。

植物特征：多年生草本。茎直立。叶互生，茎下部叶3裂或羽状5深裂，裂片椭圆形至卵状披针形，顶端裂片最大，边缘有刺状齿，叶柄长；茎上部叶分裂或不分裂，叶柄渐短。头状花序顶生，全为管状花，花冠紫色。瘦果被黄白色绒毛，冠毛羽状。

性味归经：苦、甘，温。归脾、胃经。

功能主治：健脾益气，燥湿利水，止汗，安胎。用于脾虚食少、腹胀泄泻、痰饮眩晕、水肿、自汗、胎动不安。

用法用量：6 ~ 12克，水煎服或入丸、散。



生境：常见栽培。

科：菊科

种： *Arctium lappa* L.

药名：牛蒡子

别名：鼠粘子、大力子

牛蒡

药用部位：果实。

植物特征：二年生草本。基生叶丛生，大形，有长柄；茎生叶广卵形或心形，边缘微波状或有细齿，下面密被白短柔毛。头状花序具花多数，排成伞房状，花淡红色，全为管状。瘦果椭圆形，具棱，灰褐色，冠毛短刚毛状。

性味归经：辛、苦，寒。归肺、胃经。

功能主治：疏散风热，宣肺透疹，解毒利咽。用于风热感冒、咳嗽痰多、麻疹、风疹、咽喉肿痛、疔疖丹毒、痈肿疮毒。

用法用量：5 ~ 15克。水煎服。

生境：沟谷林边、荒山草地中，有栽培。



科：菊科

种： *Ligularia intermedia* Nakai

药名：光紫菀

别名：橐吾

狭苞橐吾

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。基生叶卵状圆形或肾形，边缘具三角状尖齿，两面无毛；茎生叶具柄，基部呈鞘状抱茎；叶片同基生叶，渐向上渐小。头状花序排列成长总状花序，边花舌状，雌性，黄色；中央花7 ~ 12，花冠管状，先端5裂，裂片长圆状披针形，反曲。瘦果长圆柱形，稍扁，污褐色。

性味归经：苦、辛，温。归肺经。

功能主治：宣肺利气，化痰止咳，活血止痛。治风寒感冒、咳嗽痰多、肺病咳吐脓血、慢性哮喘、跌打损伤、腰腿痛。

用法用量：3 ~ 10克，水煎服，或研末冲服。

生境：山坡、林缘、草甸、沟边、山谷溪流旁。



科：菊科	种： <i>Cephalanoplos segetum</i> (Bunge) Kitam	药名：小蓟	别名：刺儿菜
------	---	-------	--------

小蓟

药用部位：地上部分全草。

植物特征：多年生草本。具匍匐根茎。茎直立，有纵槽，幼茎被白色蛛丝状毛。叶互生，椭圆形或长椭圆状披针形，两面均被蛛丝状绵毛。头状花序顶生，雌雄异株；总苞钟状，花管状，淡紫色，瘦果椭圆形或长卵形，具纵棱，冠毛羽状。

性味归经：甘、苦，凉。归心、肝经。

功能主治：凉血止血，祛瘀消肿。
用于鼻出血、吐血、尿血、便血、崩漏下血、外伤出血、痈肿疮毒。

用法用量：4.5 ~ 9克，水煎服。
外用鲜品适量，捣烂敷患处。



生境：田野 路旁。

科：菊科	种： <i>Cephalanoplos setosum</i> (Willd.) Kitam.	药名：刺菜	别名：大蓟
------	---	-------	-------

大刺菜

药用部位：地上部分全草。

植物特征：多年生草本。茎直立，上部具分枝。叶矩圆形，前端钝，有刺尖，边缘有缺刻状齿或羽状浅裂，有细刺，叶面绿色，有疏蛛丝状毛或无毛，叶背上具密毛。头状花序，多集生在枝端，花冠紫红色，全是筒状花。瘦果黄白色至浅棕色，长圆形；冠毛羽状。

性味归经：甘，凉。归肝、脾经。

功能主治：凉血，止血，祛瘀，消痈肿。主治吐血、衄血、尿血、血淋、血崩、带下、肠风、肠痈、痈疡肿毒、疔疮。

用法用量：10 ~ 30克，水煎服，外用适量捣敷。



生境：田野路旁。

科：菊科

种： *Gerbera piloselloides* (L.) Cass

药名：毛大丁草

别名：兔耳风、小一枝箭

毛大丁草

药用部位：全草。

植物特征：草本。根肥厚，有绵毛。叶基生，矩圆形至卵形，幼时上面被毛，而老时常变秃净，下面密被绵毛。头状花序顶生，花杂性，边缘舌状花，雌性，白色，2唇形；中央花两性，花冠上部也为2唇形，外唇3裂，内唇2深裂；雄蕊5，药合生。

性味归经：微苦，平。归肝、肺经。

功能主治：清热解毒，止咳化痰。治痢疾，小儿疳积；外用治跌打损伤，毒蛇咬伤。

用法用量：25 ~ 40克，水煎服。外用适量，鲜品捣烂敷患处。

生境：林下草地。

科：菊科

种： *Dolomiaea souliei* (Franch.) Shih

药名：川木香

别名：川香

川木香

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。几无茎。根粗壮，圆柱形。叶丛生，呈莲座状，卵状披针形、矩圆状披针形或椭圆形，羽状中裂，或不分裂，裂片边缘具不规则齿裂，两面被毛。头状花序数个集生枝顶，全为管状花。瘦果扁平，有棱，冠毛芒状。

性味归经：苦，寒。归心、肺、胆、大肠经。

功能主治：行气止痛，和胃消胀，止泻。用于腹胀肠鸣、食欲不振、腹痛、痢疾里急后重。

用法用量：3 ~ 9克，水煎服。外用适量煎水洗。

使用注意：中寒气虚者忌用。

管状花

头状花序
集生枝顶

叶羽状中裂

叶丛生，
呈莲座状

生境：海拔3000米以上的高山草地。

科：菊科	种： <i>Rhaponticum uniflorum</i> (L.) DC.	药名：漏芦	别名：禹州漏芦、狼头花
------	--	-------	-------------

祁州漏芦



管状花

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。根肥厚，木质，上部附多年残余的叶柄。茎直立，不分枝，被绵毛或短柔毛。基生叶与茎下部叶羽状深裂至浅裂。管状花花冠淡紫色，下部线形，上部稍扩张成圆筒形，裂片狭长。瘦果，倒圆锥形，棕褐色。

性味归经：苦，寒。归胃经。

功能主治：清热解毒，消痈，下乳，舒筋通脉。用于乳痈肿痛、痈疽发背、瘰癧疮毒。

用法用量：5 ~ 9克，水煎服。

使用注意：孕妇慎用。



花冠淡紫色



药材

生境：干山坡、向阳地、草地。

科：菊科	种： <i>Carthamus tinctorius</i> L.	药名：红花	别名：草红、刺红花
------	-----------------------------------	-------	-----------



管状花初开时黄色

红花

药用部位：花。

植物特征：一年生草本。叶长椭圆形，先端尖，无柄，基部抱茎，边缘羽状齿裂，齿端有尖刺，两面无毛。头状花序顶生，排成伞房状，全为管状花，初开时黄色，后转橙红色。瘦果椭圆形，无冠毛，或鳞片状。

性味归经：辛，微温。归肝、心经。

功能主治：活血祛瘀，通经。用于血滞经闭、痛经，产后腹痛、恶露不下、症瘕、跌打损伤、瘀血作痛。

用法用量：3 ~ 9克，水煎服。

使用注意：孕妇及月经过多者慎用。

叶先端尖

齿端有尖刺

生境：常见栽培。

科：菊科	种： <i>Scorzonera glabra</i> Rupr.	药名：鸦葱	别名：谷罗葱、兔儿奶
------	-----------------------------------	-------	------------

鸦葱

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。根粗，直立。茎单生或数个丛生，直立或外倾。基生叶多数，椭圆状披针形或长圆状披针形；茎生叶苞片状，卵状三角形或披针形。头状花序单生于茎顶，舌状花黄色，干时淡紫红色。瘦果，冠毛淡黄褐色，羽毛状。

性味归经：苦，寒。归胃、肺经。

功能主治：清热解毒，活血消肿。外用治疗疮、痈疽、毒蛇咬伤、蚊虫叮咬、乳腺炎。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服。外用鲜品适量捣烂敷患处，或捣汁擦患处。



生境：山坡草地中。

科：菊科	种： <i>Scorzonera sinensis</i> Lipsch. et krasch	药名：桃叶鸦葱	别名：老虎嘴
------	---	---------	--------

桃叶鸦葱

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。根粗壮，垂直，颈部密被纤维状残叶，黑褐色。基生叶披针形、长圆状披针形或广披针形，边缘波状皱曲，两面无毛，具白粉，灰绿色；茎生叶小，鳞片状，披针形至卵形。头状花序生于茎顶，舌状花。瘦果圆柱形。

性味归经：辛、凉。归肺、肝经。

功能主治：清热解毒、解毒疗疮。用于外感风热、疗毒恶疮、乳痈。

用法用量：9 ~ 15克，水煎服。



生境：山坡、丘陵地及灌丛间。

科：菊科	种： <i>Taraxacum officinale</i> L.	药名：蒲公英	别名：婆婆丁
------	-----------------------------------	--------	--------

蒲公英

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。含白色乳汁。根深长，单一或分枝，外皮黄棕色。叶根生，排成莲座状，狭倒披针形，大头羽裂或羽裂，裂片三角形，全缘或有数齿。花茎比叶短或等长，结果时伸长，上部密被白色蛛丝状毛。头状花序单一，顶生，舌状花鲜黄色，两性。瘦果倒披针形，土黄色或黄棕色。

性味归经：苦、甘，寒。归肝、胃经。

功能主治：清热解毒，消肿散结。主治上呼吸道感染、眼结膜炎、流行性腮腺炎、乳腺炎、乳痈肿痛、胃炎、痢疾、肝炎、胆囊炎、急性阑尾炎、泌尿系感染、盆腔炎、痈疖疔疮、咽炎、急性扁桃体炎。

用法用量：15 ~ 50克（大剂量100克），水煎服，或捣汁、入散剂。外用捣敷患处。

生境：中、低海拔地区的山坡草地、路边、田野、河滩。

科：菊科	种： <i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai	药名：山苦荬	别名：苦菜、兔儿菜
------	---	--------	-----------

山苦荬

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。全体无毛，有乳汁。基生叶莲座状，条状披针形、倒披针形或条形。头状花序多数，排列成稀疏的伞房状，舌状花黄色、淡黄色、白色或变淡紫色。瘦果红棕色，狭披针形，稍扁。

性味归经：苦，凉。归肺，肝经。

功能主治：清热解毒、凉血、活血排脓。主治阑尾炎、肠炎、痢疾、疮疖肿痛等症。

用法用量：10 ~ 15克，水煎服。外用捣敷或煎水洗。

生境：山坡、草原的路边，农田或荒地上。

科：菊科	种： <i>Ixeris denticulate</i> (Houtt.) Stebb	药名：苦荬菜	别名：苦菜
------	---	--------	-------

苦荬菜



药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。有乳汁，全株光滑无毛。茎直立，紫红色。茎生叶丛生，卵形或披针形；茎生叶互生，卵状披针形。头状花序排列成伞房状，小花全为舌状花，黄色，花柱2裂，黄色。瘦果纺锤形，稍扁平，黑褐色。

性味归经：苦，凉。归心、肺经。

功能主治：清热解毒、散淤、止血。治肺痈、乳痈、血淋、疖肿、跌打损伤。

用法用量：10 ~ 15克，水煎服。外用捣敷患处。

生境：田野路旁。

科：菊科	种： <i>Sonchus oleraceus</i> L.	药名：苦菜	别名：苦苣、游冬
------	--------------------------------	-------	----------

苦苣菜



药用部位：全草。

植物特征：一、二年生草本。有纺锤状根。叶片柔软无毛，长椭圆状广倒披针形，深羽裂或提琴状羽裂。头状花序，舌状花黄色。瘦果倒卵状椭圆形，成熟后红褐色，每面有3纵肋，肋间有粗糙细横纹，有白色细软冠毛。

性味归经：苦，寒。归心、脾、胃、大肠经。

功能主治：清热，凉血，解毒。可治痢疾、黄疸、血淋、痔疮、疔肿、蛇咬等症。

用法用量：10 ~ 15克，水煎服。外用捣敷患处。

生境：山野田地路旁。

科：菊科	种： <i>Picris Japonica</i> Thunb.	药名：毛连菜	别名：羊下巴、牛踏鼻、毛柴胡、毛牛耳大黄
------	----------------------------------	--------	----------------------



毛连菜

药用部位：花。

植物特征：二年生草本。全体具刚毛。基生叶和茎下部叶倒披针形；茎中部叶披针形，无柄；茎上部叶线状披针形。头状花序，有长梗，排列成伞房状，总苞钟形，绿色，舌状花黄色，花冠顶端平截。瘦果，狭纺锤形，棕红色。

性味归经：苦、咸，微温。归肺经。

功能主治：理肺止咳，化痰平喘，宽胸。治咳嗽痰多、哮喘、暖气、胸腹闷胀。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服。

生境：林下路旁 草地中。

科：菊科	种： <i>Gynuracrepidoides</i> Benth	药名：三七草	别名：革命菜、野苘蒿
------	-----------------------------------	--------	------------

三七草

药用部位：茎叶。

植物特征：多年生直立草本。宿根肉质肥大。茎带肉质，嫩时紫红色，成长后多分枝，表面光滑，具细线棱。基生叶多数，有锯齿或作羽状分裂；茎生叶互生，形大，羽状分裂，裂片卵形至披针形，边缘浅裂或具疏锯齿。头状花序，排列成伞房状，花冠筒状。瘦果线形，细小，褐色。

性味归经：甘，平。归肝经。

功能主治：活血，止血，解毒。治跌打损伤、鼻出血、咳血、吐血、乳痈、无名肿毒、毒虫螫伤。

用法用量：20 ~ 50克，水煎服或捣汁。外用捣敷患处。



生境：山野或荒地草丛中。

单子叶植物

MONOCOTYLEDONEAE

科：香蒲科	种： <i>Typha orientalis</i> Presl	药名：蒲黄	别名：蜡烛、蒲棒
-------	----------------------------------	-------	----------

东方香蒲

药用部位：花粉。

植物特征：草本。叶线形，基部鞘状，抱茎，具白色膜质边缘。穗状花序圆锥状，雄花序与雌花序彼此连接，雄花序在上，较细，雄花无花被，雄蕊2~4，花粉粒单生，雌花序在下。小坚果。

性味归经：甘，平。归肝、心包经。

功能主治：止血，化淤，通淋。用于吐血、鼻出血、咯血、崩漏、外伤出血、经闭、痛经、脘腹刺痛、跌打肿痛、血淋湿痛。

用法用量：5~15克，水煎服（包煎）。

生境：池沼、湖泊、河边、水稻田及水湿地。



科：泽泻科	种： <i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	药名：慈姑	别名：茨菰、燕尾草、白地栗、酥卵
-------	--------------------------------------	-------	------------------



慈姑

药用部位：块茎。

植物特征：多年生挺水植物。地下根茎先端形成球茎，球茎表面附薄膜质鳞片，端部有较长的顶芽。叶片基生，出水成截形，叶片成箭头状，全缘。

花单生，小花白色。

性味归经：甘，寒。归肾、膀胱经。

功能主治：利小便，清湿热。用于小便不利、水肿胀满、痰饮眩晕、热淋涩痛、高血脂。

用法用量：6~9克，水煎服，或入丸、散。

生境：沼泽、浅水池沼或稻田内。



科：泽泻科	种： <i>Sagittaria trifolia</i> L.	药名：野慈姑	别名：燕尾草
-------	----------------------------------	--------	--------

野慈姑

药用部位：块茎和全草。

植物特征：多年生水生草本。直立，具须根。叶片窄狭，呈剪刀形，顶端的裂片较耳裂片为短，先端均长尖，绿色。总状花序，小花轮生，花瓣白色，基部间或有紫色斑点。果实斜倒卵形，扁平，背部腹面均具薄翅。

性味归经：甘、微苦、微辛，微寒。归肝、肺、脾、膀胱经。

功能主治：活血凉血，止咳通淋，散结解毒。主治产后血闷、胎衣不下、带下、崩漏、鼻出血、呕血、咳嗽痰血、淋浊、疮肿、目赤肿痛、角膜白斑、瘰癧、睾丸炎、骨膜炎、毒蛇咬伤。

用法用量：15 ~ 30克，水煎服或绞汁。外用适量捣敷，或磨汁沉淀后点眼。

叶片剪刀形



生境：池沼及稻田中。

科：水鳖科	种： <i>Vallisneria natans</i> (Lour.) Hara	药名：苦草	别名：蔺萍
-------	---	-------	-------

苦草

药用部位：全草。

植物特征：多年生无茎沉水草本。有匍匐枝。叶基生，线形，无柄。雌雄异株，雄花小，多数，生于叶腋；雌花单生，佛焰苞管状，先端3裂，有棕褐色条纹，有长柄，丝状，伸到水面，受粉后，螺旋状卷曲，把子房拉回水中，花被片6，两轮排列，内轮常退化，外轮带红粉色。果圆柱形，种子多数。



性味归经：苦，寒。归肝、肺经。

功能主治：理气和血。治恶露、白带。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服。

生境：池沼中。

科：禾本科	种： <i>Phragmites communis</i> Trin	药名：芦根	别名：葦子
-------	------------------------------------	-------	-------



芦葦

药用部位：根状茎。

植物特征：多年生高大草本。地下茎粗壮，横走，节间中空，节上有芽。茎直立，中空。叶2列，互生，叶片扁平，边缘粗糙。穗状花序排列成大型圆锥花序，顶生，微下垂。颖果椭圆形，与内稃分离。

性味归经：甘，寒。归肺、胃、膀胱经。

功能主治：清热生津，除烦止呕，利尿，透疹。治疗热病烦渴、胃热呕吐、肺热咳嗽、肺痈吐脓、热淋、麻疹，解河豚鱼毒。

用法用量：15 ~ 30克（鲜品60 ~ 120克），水煎服或鲜品捣汁服用。外用适量捣敷。

使用注意：脾胃虚寒者慎服。

穗状花序排列成圆锥花序

节上有芽

药材

生境：河流、池沼岸边浅水中。

科：禾本科	种： <i>Miscanthus sacchariflorus</i> (Maxim) Benth et Hook f	药名：荻	别名：野葦子
-------	---	------	--------



荻

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。节上有长柔毛。叶鞘老时在基部常破碎成纤维状，叶片扁平，主脉明显突出于背面，并向基部渐粗大而质硬，背面及边缘粗糙。圆锥花序，分枝短缩密集，基部有时较疏或间断；花穗紫色。

性味归经：甘，凉。归肝经。

功能主治：清热活血。用于妇女干血癆、潮热、产妇失血口渴、牙疼等症。

用法用量：9 ~ 15克，水煎服。

生境：路旁、山坡、草地。

科：禾本科	种： <i>Zizania caduciflora</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.	药名：茭白、 菰根、菰实	别名：菰
-------	--	-----------------	------

茭白

药用部位：茭白、根、果实。


植物特征：多年生挺水草本。根状茎。秆直立，粗壮，主茎和分蘖枝进入生殖生长后，基部如有茭白黑粉菌寄生，则不能正常生长，形成椭圆形或近圆形的肉质茎，称“茭白”。叶片扁平，长披针形。圆锥花序多分枝，上升或展开。颖果圆柱形，称“菰米”。

性味归经：① 茭白：甘，凉。② 菰根、菰实：甘，寒。归肾、肺经。

功能主治：① 茭白：清热除烦，止渴，通乳，利大小便。用于热病烦渴、酒精中毒、二便不利、乳汁不通。② 菰根：清热解毒。用于消渴、烫伤。③ 菰实：清热除烦，生津止渴。用于心烦、口渴、大便不通、小便不利。

用法用量：茭白25 ~ 50克，根100 ~ 150克，菰实15 ~ 25克，水煎服。

生境：水边。



科：禾本科	种： <i>Cynodon dactylon</i> L.	药名：铁线草	别名：马根子草、铺地草
-------	-------------------------------	--------	-------------

狗牙根

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。具有根状茎和匍匐枝，须根细而坚韧。匍匐茎平铺地面或埋入土中，光滑坚硬，节处向下生根。叶片平展、披针形，前端渐尖，边缘有细齿，叶色浓绿。穗状花序3 ~ 6枚呈指状排列于茎顶，小穗排列于穗轴一侧，有时略带紫色。

性味归经：苦、微甘，平。归肝经。

功能主治：祛风，活络，解热，止血，生肌。治风湿痿痹拘挛、半身不遂、劳伤吐血、跌打、刀伤、疔疮。

用法用量：25 ~ 50克，水煎服。外用适量捣敷患处。



生境：旷地、溪边和田野间。

科：禾本科	种： <i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino	药名：苎草	别名：蓼竹、马耳草
-------	--	-------	-----------

苎草



药用部位：全草。

植物特征：一年生草本。秆细弱，无毛，多节，常分枝。叶舌膜质，边缘具纤毛，叶片卵状披针形。总状花序细弱，呈指状排列或簇生于茎顶；有柄小穗退化，仅剩短柄；无柄小穗长卵状披针形，灰绿色或带紫色。颖果长圆形，与稃体几等长。

性味归经：苦，平。归肺经。

功能主治：止咳定喘，杀虫解毒。治哮喘、咳嗽、蛔虫病。

用法用量：10 ~ 20克，水煎服。外用煎水洗或捣敷患处。

生境：山坡草地和阴湿处。

科：禾本科	种： <i>Sorghum vulgare</i> Pers.	药名：高粱米	别名：蜀黍、芦稷
-------	---------------------------------	--------	----------

高粱



药用部位：果实。

植物特征：一年生栽培作物。叶鞘无毛或被白粉；叶舌硬纸质，先端圆，边缘有纤毛；叶片狭长披针形。圆锥花序有轮生、互生或对生的分枝；无柄小穗卵状椭圆形，穗轴节间及小穗柄为线形，从裂齿间伸出芒，或全缘而无芒。颖果倒卵形，成熟后露出颖外。

性味归经：甘、涩，温。归脾胃经。

功能主治：健脾燥湿，涩肠止泻。主治腹痛腹泻、胃痉挛。

用法用量：50克，水煎服，或煮粥食用。



生境：常见栽培。

科：禾本科	种： <i>Coix lacrymajobi</i> L. var. <i>mayuen</i> (Roman)	药名：薏苡仁	别名：薏米、草珠
 叶片长披针形 薏苡 药用部位：种子。 植物特征：一年生或多年生草本。茎直立。叶互生，呈纵列排列，叶片长披针形，中脉明显。总状花序，上部为雄花穗，下部为雌花穗，包藏在骨质总苞中。颖果成熟时，外面的总苞坚硬，呈椭圆形。种皮红色或淡黄色，种仁卵形，背面为椭圆形，腹面中央有沟，内部胚和胚乳为白色。 性味归经：甘、淡，微寒。归脾、肺、肾经。 功能主治：利湿健脾，舒筋除痹，清热排脓。主治水腫、脚氣、小便淋瀝、濕溫病、泄瀉帶下、風濕痺痛、筋脈拘攣、肺癰、腸癰、扁平疣。 用法用量：10 ~ 30克，水煎服，或入丸、散，浸酒，煮粥。  雄花穗 颖果			
生境：屋旁、荒野、河边、溪涧或阴湿山谷中。			

科：禾本科	种： <i>Zea mays</i> L.	药名：玉米须	别名：包谷、玉蜀黍
玉米 药用部位：玉米须。 植物特征：一年生草本。秆粗壮，不分枝，基部各节生支柱根。叶阔长，条状披针形，边缘呈波浪状。花序单生，雄花序顶生，雌花序腋生；雄小穗成对生于各节，雌小穗成对，排列在海绵质的穗轴之上，苞片多数。 性味归经：甘，平。归肝、肾、膀胱经。 功能主治：利尿，泄热，平肝，利胆。治肾炎水肿、脚气、黄疸肝炎、高血压、胆囊炎、胆结石、糖尿病、吐血鼻出血、鼻渊、乳痈。 用法用量：50 ~ 100克，水煎服或烧存性研末。外用烧烟吸入。  雌花 雄花 叶缘波浪状 苞片			
生境：常见栽培。			

科：禾本科	种： <i>Triticum aestivum</i> L.	药名：浮小麦	别名：麦子
-------	--------------------------------	--------	-------

小麦

药用部位：果实。


植物特征：一年生草本。叶舌膜质，叶片平展，条状披针形。穗状花序圆柱形，直立，穗轴每节着生1枚小穗。外稃扁圆形，顶端无芒或具芒；内稃与外稃近等长，具2脊。颖果卵圆形或矩圆形，顶端具短毛，腹具纵沟，易与稃片分离。

性味归经：甘，凉。归心、脾、肾经。

功能主治：养心除烦，健脾益肾，除热止渴。主治脏躁、烦热、消渴、泄痢、痈肿、外伤出血及烫伤等。

用法用量：30 ~ 60克，水煎服。

生境：常见栽培。



叶条状披针形

颖果

科：禾本科	种： <i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	药名：牛筋草	别名：牛筋草
-------	--	--------	--------

蟋蟀草

药用部位：全草。


植物特征：一年生草本。叶片条形，叶舌短。穗状花序指状排列在秆端；穗轴稍宽，小穗成双行密生在穗轴的一侧，有小花3 ~ 6朵；颖和稃无芒，第一颖片较第二颖片短，第一外稃有3脉，具脊，脊上粗糙，有小纤毛。颖果卵形，棕色至黑色，具明显的波状皱纹。

性味归经：甘、淡，平。归肝、肾、大肠、膀胱经。

功能主治：清热解毒，祛风利湿，散瘀止血。用于防治流行性乙型脑炎、流行性脑脊髓膜炎、风湿性关节炎、黄疸型肝炎、小儿消化不良、肠炎、痢疾，尿道炎；外用治跌打损伤、外伤出血、狗咬伤。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服。外用适量捣敷。

生境：荒芜之地及道路旁。



小穗

完整植株

叶片条形

科：禾本科	种： <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	药名：马唐	别名：抓地龙、抓地草
-------	--	-------	------------

马唐


药用部位：全草。

植物特征：一年生草本。全体被毛，常伏卧于地面。茎秆基部紫色，光滑无毛。丛生，节上多长不定根。上部倾斜直立。叶片线状披针形，先端渐尖，边缘粗糙，常生细软毛。茎秆顶生细瘦总状花序3 ~ 10个，上部互生或指状排列，下部近轮生。小穗长椭圆形，成对生于穗轴一侧。颖果椭圆形。

性味归经：甘，寒。
归肝，脾经。

功能主治：明目润肺。
治目暗不明，肺热咳嗽。

用法用量：20 ~ 30克，
水煎服。



生境：田园草地。

科：禾本科	种： <i>Echinochloa colonum</i> (L.) Link.	药名：光头稗子	别名：芒稷
-------	--	---------	-------

光头稗子

药用部位：全草。

植物特征：一年生草本。叶片扁平，线形。圆锥花序狭窄，小穗卵圆形，具小硬毛，无芒，较规则地成四行排列于穗轴的一侧；第1颖三角形，具3脉，第2颖顶端具小尖头；第1小花常中性，其外稃具7脉，内稃膜质，脊上被短纤毛。

性味归经：微苦，平。归肝、肾经。

功能主治：利水消肿，止血。主治水腫、腹水、咳血。

用法用量：30 ~ 120克（大剂量可用至180克），水煎服。



生境：田园草地。

科：禾本科	种： <i>Phyllostachys propinqua</i> Mc Clure	药名：竹叶	别名：早竹、雷竹
-------	--	-------	----------

早园竹

药用部位：叶

植物特征：草本。秆高7 ~ 11米，节间短而均匀，新秆节带紫色，密被白粉，基部节间常具淡绿黄色的纵条纹。箨鞘褐绿色或淡黑褐色，初具白粉，密被褐斑；箨耳及鞘口遂毛不发育；箨舌先端拱凸，具短须毛，中上部箨两侧明显下延；箨叶长矛形至带形，反转，皱褶。

性味归经：甘、淡，寒。归心、肺、胆、胃经。

功能主治：清热除烦，生津利尿。治热病烦渴、小儿惊癇、咳逆吐衄、面赤、小便短赤、口糜舌疮。

用法用量：6 ~ 15克。水煎服。

生境：常见栽培。

科：莎草科	种： <i>Scirpus fluviatilis</i> (Torr.)	药名：荆三棱	别名：京三棱、草三棱
-------	---------------------------------------	--------	------------

荆三棱

药用部位：块茎。

植物特征：多年生草本。根状茎横走，通常单一，间或有分枝，常膨大，末端具块茎，黑褐色，两头尖，质地轻泡。秆高大粗壮，锐三棱形，直立，光滑。叶互生，窄条形，全缘。复穗状花序，多数花穗于茎顶聚成无梗伞形花丛，花序梗不等长，小穗长圆形，颖长椭圆形。瘦果三角倒卵形，褐色。

性味归经：辛、苦，平。归肝、脾经。

功能主治：破血行气，消积止痛。用于症瘕痞块、瘀血经闭、食积胀痛。

用法用量：4 ~ 9克，水煎服。

生境：沼泽水中。



科：莎草科	种： <i>Eleocharis valleculosa</i> Ohwi f. <i>setosa</i> (Ohwi) Kitagawa	药名：针蔺	别名：具刚毛荸荠
-------	--	-------	----------

刚毛荸荠

药用部位：全草。

植物特征：多年生挺水草本。具细长匍匐根状茎。其顶端生扁球形的球茎，即为荸荠。秆圆柱状，有多数横隔，干后表面呈节状。无叶片，基部有2～3个管状叶鞘，1个花穗着生茎顶，似毛笔头，淡绿色。

性味归经：甘、寒。归肝、胃、肺经。

功能主治：清热，化痰，消积。治温病消渴、黄疸、热淋、痞积、目赤、咽喉肿痛、赘疣。

用法用量：10～15克，水煎服。



秆圆柱状

生境：浅水池沼中。

科：莎草科	种： <i>Cyperus rotundus</i> L.	药名：香附子	别名：莎草
-------	-------------------------------	--------	-------

香附子

药用部位：块茎。

植物特征：多年生草本。有匍匐根状茎细长，部分肥厚成纺锤形有时数个相连。茎直立，三棱形。叶丛生于茎基部，叶片窄线形先端尖，全缘，具平行脉。花序复穗状，小穗宽线形，略扁平，颖2列，排列紧密，卵形至长圆卵形，膜质，两侧紫红色，有数脉；每颖着生1花。小坚果长圆倒卵形。

性味归经：辛、微苦、甘，平。归肝、三焦经。

功能主治：理气解郁，调经止痛。用于肝郁气滞，胸、胁、脘腹胀痛，消化不良，月经不调，经闭痛经，寒疝腹痛，乳房胀痛。

用法用量：6～9克，水煎服。外用适量，研末撒、调敷或作饼热熨。



花序复穗状

茎三棱

药材

生境：荒地、路边、沟边或田间向阳处。

科：莎草科	种： <i>Carex siderostica</i> Hance	药名：宽叶苔草	别名：崖棕
-------	-----------------------------------	---------	-------

宽叶苔草

药用部位：根及根茎。

植物特征：草本。具长根状茎。秆侧生。叶矩圆披针形，下面被短柔毛，基部具褐色叶鞘。小穗5~8，圆柱形，苞片佛焰苞状，绿色，雌花鳞卵状披针形。果囊椭圆形，黄绿色。小坚果椭圆形。

性味归经：甘、辛，温。归肝经。

功能主治：补血、养血。主治妇女血症、五劳七伤。

用法用量：6~15克，水煎服或焙干研末温酒调服。



生境：林下潮湿处。

科：天南星科	种： <i>Anorphophallus sinensis</i> Belval	药名：菖菼	别名：花杆南星
--------	--	-------	---------

蛇头草

药用部位：块茎。

植物特征：多年生草本。块茎扁圆形，先花后叶，小叶2叉分歧，裂片再羽状分裂，叶柄有紫色条纹。佛焰苞漏斗状，外面绿色，里面黑紫色，肉穗花序2倍长于佛焰苞。浆果红色。

性味归经：辛，寒，有毒。归心。脾经。

功能主治：消肿散结，解毒止痛。用于肿瘤、颈淋巴结结核；外用治痈疖肿毒、毒蛇咬伤。

用法用量：15~23克（大剂量可以用至50克），水煎服（须煎3小时后方能服用）。外用适量，捣烂敷患处。

使用注意：本品有毒，内服谨慎。



生境：林下草地，常见栽培。

科：天南星科	种： <i>Typhonium giganteum</i> Engl.	药名：独角莲	别名：犁头尖、剪刀草
--------	-------------------------------------	--------	------------

独角莲

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。块茎卵圆形或卵状椭圆形，外被黑褐色小鳞片。叶根生，戟状箭形，大小不等。肉穗花序，顶端延长成紫色棒状附属物，不超出佛焰苞；佛焰苞紫色。浆果红色。

性味归经：辛、甘，大温。归胃、肝经。

功能主治：解毒散结。治淋巴瘤、食管癌、皮肤癌、乳腺癌、骨膜肉瘤等肿瘤。

用法用量：外用适量捣敷患处。

使用注意：本品大毒，一般不内服。



肉穗花序

叶根生



叶戟状箭形

生境：山野阴湿处。

科：天南星科	种： <i>Pinellia tetnata</i> (Thb.) Breit.	药名：半夏	别名：生夏
--------	--	-------	-------

半夏

药用部位：块茎。

植物特征：多年生草本。块茎近球形。叶基生，一年生者为单叶，卵状心形，2 ~ 3年者为3小叶的复叶，小叶卵状椭圆形，稀披针形，中间一片较大，全缘。花单性同株，肉穗花序，肉穗花序下部为雌花，贴生于佛焰苞，上部为雄花。浆果卵圆形，成熟时红色。


性味归经：辛，温，有毒。归脾、胃、肺经。

功能主治：燥湿化痰。用于痰多咳喘、痰饮眩悸、风痰眩晕、痰厥头痛。

用法用量：5 ~ 10克，水煎服。
外用生品适量，研末以酒或醋调敷。

使用注意：生半夏毒大，内服宜慎。

药材



复叶具3小叶



佛焰苞

块茎近球形

生境：山坡、溪边阴湿的草丛中或林下。

科：天南星科	种： <i>Pinelliape datisecta</i> Schott	药名：半夏	别名：独脚莲
--------	---------------------------------------	-------	--------

掌叶半夏

药用部位：块茎。

植物特征：多年生草本。块茎近球形，类似半夏，但较大。叶片掌状分裂。肉穗花序顶生，佛焰苞淡绿色，下部筒状，长圆形，花单性，无花被，雌雄同株。浆果卵圆形，绿色，内含种子1粒。



性味归经：辛，温，有毒。归脾、胃、肺经。

功能主治：燥湿化痰。用于痰多咳喘、痰饮眩悸、风痰眩晕、痰厥头痛、毒蛇咬伤。

用法用量：5 ~ 10克，水煎服或研末吞服。外用适量捣敷或研末调敷。

使用注意：本品毒性较大，内服宜慎。

生境：山坡、溪边阴湿的草丛中或林下。



科: 天南星科	种: <i>Arisaema amurense</i> Maxim.	药名: 天南星	别名: 山苞米
---------	------------------------------------	---------	---------

东北南星

药用部位：块茎。

植物特征：多年生草本。块茎近球形，须根从茎基周围呈放射状生出。叶鸟趾状全裂；裂片一般5枚，倒卵形或广倒卵形，全缘。肉穗花序低于叶；佛焰苞较大，绿色或带紫红色，花序轴顶端附属物棍棒状。浆果鲜红色。

性味归经：苦、辛，温，有毒。归肺、肝、脾经。

功能主治：驱风定惊、化痰散结。治中风、口眼歪斜、半身不遂、癫痫、破伤风；生用外治痈肿。

用法用量：炮制后用3～9克，研末吞服。外用生品适量，研末以醋酒调敷患处。

使用注意：毒性较大，内服谨慎。

生境：林下潮湿处。

叶裂片一般5枚。

叶鸟趾状全裂

科：天南星科	种： <i>Arisaema erubescens</i> (Wall.) Schott.	药名：天南星	别名：一把伞南星
--------	---	--------	----------



天南星

药用部位：块茎。

植物特征：多年生草本。块茎扁球形。叶片呈放射状分裂，裂片披针形至椭圆形，长渐尖，具线形长尾。佛焰苞绿色，有白色条纹，或为淡紫色，肉穗花序的附属器棒状，圆柱形，顶端钝。浆果。

性味归经：苦、辛，温，有毒。归肺、肝、脾经。

功能主治：驱风定惊、化痰散结。治中风，口眼歪斜、癫痫、破伤风；生用外治痈肿。

用法用量：炮制后用3 ~ 9克，研末吞服。外用生品适量，研末以醋酒调敷。

使用注意：内服宜慎。

生境：林下潮湿处。

科：天南星科	种： <i>Pistia stratiotes</i> L.	药名：大藻	别名：母猪莲、水浮莲
--------	--------------------------------	-------	------------

大藻

药用部位：叶。

植物特征：多年生浮水草本。主茎短缩而叶呈莲座状，从叶腋间向四周分出匍匐茎，茎顶端发出新植株，有白色成束的须根。叶簇生，叶片倒卵状楔形，顶端钝圆而呈微波状，两面都有白色细毛。花腋生，佛焰苞白色，背面生毛。浆果。

性味归经：辛，凉。归肾经。

功能主治：祛风发汗，利尿解毒。用于感冒、水肿、小便不利、风湿痛、皮肤瘙痒、荨麻疹、麻疹不透；外用治汗斑、湿疹。

用法用量：15 ~ 25克，水煎服。外用适量，鲜品捣汁涂或煎水洗患处。

使用注意：孕妇忌服。

生境：静水池沼中。



科：浮萍科	种： <i>Lemna minor</i> L.	药名：浮萍	别名：萍
-------	--------------------------	-------	------

浮萍

药用部位：全草。

植物特征：多年生漂浮草本。叶状茎扁平，倒卵形或椭圆形，先端圆，上面绿色，有光泽，自中央下垂10余条纤维状须根，中心有显明的维管束一条，束端有根帽。佛焰苞短小，唇形。花序由2个雄花及1个雌花组成，白色或淡绿色。

叶上面绿色，有光泽

性味归经：辛，寒。归肺经。

功能主治：发汗，祛风，行水，清热，解毒。治时行热痢、斑疹不透、风热痛疹、皮肤瘙痒、水肿、经闭、疮癣、丹毒、烫伤。

用法用量：5 ~ 10克（鲜品25 ~ 50克），水煎服或捣汁，入丸、散。外用煎水熏洗，研末撒或调敷。

生境：静水池沼水面。

科：浮萍科	种： <i>Spirodela polyrrhiza</i> (L.) Schleid	药名：紫萍	别名：水萍、水花、萍子草
-------	--	-------	--------------

紫萍

药用部位：全草。

植物特征：多年生漂浮草本。叶状茎扁平，倒卵形或椭圆形，先端圆，上面绿色，有光泽，下面紫红色，常3 ~ 4片相连，自中央下垂10余条纤维状须根，中心有显明的维管束一条，束端有根帽。佛焰苞短小，唇形。花序由2个雄花及1个雌花组成，白色或淡绿色。

性味归经：辛，寒。归肺经。

功能主治：宣散风热，透疹，利尿。用于麻疹不透、风疹瘙痒、水肿尿少。

用法用量：5 ~ 10克（鲜品25 ~ 50克），水煎服，捣汁或入丸、散。外用煎水熏洗，研末撒或调敷。

叶上面绿色，有光泽

生境：静水池沼水面。

科：谷精草科	种： <i>Eriocaulon buergerianum</i> Koern.	药名：谷精草	别名：文星草、流星草
--------	---	--------	------------

谷精草

药用部位：带花茎的花。

植物特征：一年生草本。叶簇生，线状披针形。花茎多数，簇生，鞘部筒状；头状花序半球形，总苞片倒卵形，苞片膜质，楔形，于背面的上部及边缘密生白色棍状短毛；花单性，生于苞片腋内。蒴果3裂。

性味归经：辛、甘，平。归肝、肺经。

功能主治：疏散风热，明目，退翳。用于风热目赤、肿痛羞明、眼生翳膜、风热头痛。

用法用量：4 ~ 9克，水煎服。



叶簇生



药材



头状花序
半球形

生境：水稻田或池沼边潮湿处。

科：雨久花科	种： <i>Monochoria vaginalis</i> (Burm. f.) Presl ex Kunth	药名：鸭舌草	别名：肥猪草、水玉簪
--------	---	--------	------------

鸭舌草

药用部位：全草。

植物特征：多年生水生草本。根茎短，近于直立。叶簇生或单生，卵状至卵状披针形。总状花序从叶鞘抽出，生花3 ~ 6朵，蓝色带红色。蒴果长卵形室背开裂，种子多数。

性味归经：甘，凉。归肝、大肠、膀胱经。

功能主治：清热解毒。用于肠炎、痢疾、咽喉肿痛、牙龈脓肿；外用治虫蛇咬伤、疮疖。

用法用量：25 ~ 50克，水煎服。外用捣烂敷患处。



叶簇生
或单生

叶卵状

生境：潮湿地区或水稻田中。

科：雨久花科	种： <i>Monochoria korsakowii</i> Regel et Maack	药名：雨久花	别名：浮蔷、蓝花菜
--------	---	--------	-----------



雨久花

药用部位：全草。

植物特征：湿生或水生草本。茎直立。叶片广心形或卵状心形，先端渐尖，基部心形，基生叶具长柄，茎生叶叶柄渐短，基部扩大成鞘，抱茎。总状花序再聚成圆锥花序，花蓝色，花被离生。蒴果卵形。

性味归经：甘，凉。归肺经。

功能主治：清热解毒。用于高热咳喘、小儿丹毒。

用法用量：5 ~ 10克。水煎服。外用适量捣敷患处。



生境：池塘、湖沼靠岸的浅水处。

科：雨久花科	种： <i>Eichhornia crassipes</i> Solms	药名：水浮莲	别名：水葫芦
--------	--------------------------------------	--------	--------

凤眼莲

药用部位：全草。

植物特征：多年生浮水草本。须根发达且悬垂水中。单叶丛生于短缩茎的基部，叶卵圆形，叶面光滑；叶柄中下部有膨胀如葫芦状的气囊，基部具削状苞片。花茎单生，穗状花序，花紫蓝色，中央有鲜黄色的斑点。

性味归经：辛、凉。归肺经。

功能主治：清热解毒、祛风除湿。治热疮、关节炎、风湿痛。

用法用量：25 ~ 50克，水煎服。外用适量捣敷患处。



生境：静水池沼中。

科：百部科	种： <i>Stemona sessilifolia</i> (Miq.) Miq	药名：百部	别名：山百根
-------	---	-------	--------

百部

药用部位：块根。

植物特征：多年生草本。茎直立，不分枝，有纵纹。叶轮生，卵形、卵状椭圆形至卵状披针形；叶脉通常5条，中间3条特别明显；有短柄或几无柄。花腋生，多数生于近茎下部呈鳞片状的苞腋间；花梗细长，直立或斜向上。

性味归经：甘、苦，微温。归肺经。

功能主治：润肺，下气，止咳，杀虫。用于新久咳嗽、肺癆咳嗽、百日咳；外用于头虱、体虱、蛲虫病、阴痒。蜜百部润肺止咳，用于阴虚劳嗽。

用法用量：3 ~ 9克，水煎服。外用适量水煎洗或酒浸。



生境：山地林下或竹林下。

科：百部科	种： <i>Tofieldia coccinea</i> Richards.	药名：百部	别名：山百部
-------	--	-------	--------

直立百部

药用部位：块根。

植物特征：多年生草本。茎直立，不分枝。叶轮生，卵形或椭圆形，主脉3 ~ 5，叶柄短或近无柄。花小，多生于茎下部鳞状叶腋间，有细长花梗，直立或向上斜生；花淡绿色。蒴果扁卵形。

性味归经：甘、苦，微温。归肺经。

功能主治：润肺，下气，止咳，杀虫。用于新久咳嗽、肺癆咳嗽、百日咳；外用于头虱、体虱、蛲虫病、阴痒。蜜百部润肺止咳，用于阴虚劳嗽。

用法用量：3 ~ 9克，水煎服。外用适量水煎洗或酒浸。



生境：林中。

科：百合科	种： <i>Veratrum mengtzeanum</i> Loes. f.	药名：小棕包	别名：蒙自黎芦
-------	---	--------	---------

黎芦



药用部位：全草。

植物特征：草本。根状茎粗短，其上生多数须根，细长，肉质。茎直立，上部密生白毛。基生叶密集，长带形；茎生叶互生，无柄。圆锥花序顶生，多分枝，花轴生疏柔毛，花白色至淡黄绿色。蒴果卵状三角形，种子多数。

性味归经：辛，寒，有毒。归肝经。

功能主治：活血散瘀，止血镇痛，催吐利水。用于跌打损伤、骨折、水肿；外用治外伤出血。

用法用量：0.25 ~ 0.5克，研末，酒送服。外用适量，鲜品捣烂敷或干品研粉敷患处。

使用注意：毒性较大，内服需谨慎。



茎上部密生白毛



圆锥花序
药材

生境：山野林下。

科：百合科	种： <i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bunge	药名：知母	别名：蒜瓣子草、连母
-------	---	-------	------------

知母

药用部位：根茎。

植物特征：多年生草本。叶基生，线形。花茎散生鳞片状小苞片；花2 ~ 6朵，簇散生地花序轴上，花被片6，黄色或紫堇色。蒴果长卵形，具6纵棱。

性味归经：苦，寒。归肺、胃、肾经。

功能主治：滋阴降火，润燥滑肠。治烦热消渴、骨蒸劳热、肺热咳嗽、大便燥结、小便不利。

用法用量：10 ~ 25克，水煎服或入丸、散。

使用注意：脾胃虚寒，大便溏泄者忌服。



叶线形

药材



生境：山地、干燥丘陵或草原地带。

科：百合科 种： *Hemerocallis middendorffii* Trautv. et May. 药名：萱草根 别名：一日花

大花萱草

药用部位：根茎。

植物特征：多年生草本。肉质根茎较短。叶基生，叶片线形。花茎高出叶片，上方有分枝，小花2 ~ 4朵，有芳香，花大，具短梗和大型三角状苞片。花冠漏斗状至钟状，裂片外弯。蒴果圆柱形。

性味归经：甘，凉。归膀胱经。

功能主治：利尿消肿。用于小便不利、淋症、水肿、黄疸等症。

用法用量：10 ~ 15克，水煎服。外用适量捣敷。

生境：常见 栽培。

科：百合科 种： *Hosta plantaginea* Aschers. 药名：玉簪花 别名：白玉簪、小芭蕉

玉簪

药用部位：花。

植物特征：多年生草本。具粗根茎。叶根生，成丛；叶片卵形至心脏卵形，绿色，有光泽，主脉明显。花葶从叶中间抽出，顶端具总状花序。花白色，夜间开花，芳香，向上生长。蒴果窄长。种子黑色，光泽，边缘有翼。

性味归经：甘，凉，有毒。归肺、膀胱经。

功能主治：治咽喉肿痛、小便不通、疮毒、烧伤。

用法用量：4 ~ 5克，水煎服。外用适量捣敷患处。

使用注意：有毒，内服谨慎。

生境：阴湿地区，常见栽培。

科：百合科	种： <i>Aloe baradensis</i> Mill.	药名：芦荟	别名：库拉索芦荟、油葱
-------	---------------------------------	-------	-------------

芦荟

药用部位：全草。

植物特征：草本。茎极短。叶簇生于茎顶，直立或近于直立，肥厚多汁，狭披针形，粉绿色，边缘有刺状小齿。花茎单生或稍分枝，总状花序，花黄色或有赤色斑点。蒴果三角形。

性味归经：苦，寒。归肝、心、脾经。

功能主治：清热，通便，杀虫。治热结便秘、妇女经闭、小儿惊痫、疳热虫积、癣疮、痔瘕、萎缩性鼻炎、瘰癧。

用法用量：2.5 ~ 7.5克，入丸、散。外用适量捣碎调敷。

使用注意：孕妇忌服。

生境：常见栽培。



科：百合科	种： <i>Tulipa edulis</i> (Miq.) Baker	药名：老鸦瓣	别名：山慈菇
-------	--------------------------------------	--------	--------

老鸦瓣

药用部位：鳞茎。

植物特征：多年生纤弱草本。具鳞茎草本，鳞茎卵形，外层鳞茎皮灰棕色，纸质，里面生绒毛。叶1对，条形；花葶单一或分叉成2，从一对叶中生出，有2枚对生或3枚轮生的苞片，苞片条形，长2 ~ 3厘米。花单生，花被片6，矩圆状披针形，白色，有紫脉纹；雄蕊6，向下渐扩大，无毛；子房长椭圆形，顶端渐狭。蒴果近球形。

性味归经：甘、微辛，寒。归肝、胃经。

功能主治：清热解毒，消痈散结。用于实热性的疮疖肿毒、瘰癧结核、食道癌及淋巴肿瘤等。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服。外用适量。

生境：阳光充足的山坡或杂草丛中。



科：百合科	种： <i>Tulipa gesneriana</i> L.	药名：郁金香	别名：洋荷花、旱荷花
-------	--------------------------------	--------	------------

郁金香

药用部位：根。

植物特征：多年生草本。鳞茎扁圆锥形或扁卵圆形。叶长椭圆状披针形或卵状披针形。花单生，直立，花瓣6片，倒卵形，鲜黄色或紫红色，具黄色条纹和斑点。蒴果3室，室背开裂，种子多数，扁平。

性味归经：苦，平，无毒。归心、肝经。

功能主治：清热除烦。主治心烦不宁、失眠症。

用法用量：1.5 ~ 3克，研末为散。

使用注意：鳞茎有毒，不可内服。

叶长椭圆状披针形



生境：常见栽培。

科：百合科	种： <i>Lilium brownie</i> F. E. Brown var. <i>viridulum</i>	药名：百合	别名：六瓣花
-------	--	-------	--------

兰州百合

药用部位：鳞茎。

植物特征：多年生草本。无皮鳞茎扁球形，乳白色。茎直立，地下茎节有茎生根，地上茎刚直矮壮、绿色光滑。叶散生，多数，披针形。花顶生数朵，喇叭形，平展，花被先端稍向外反卷，乳白色，花被筒深处淡绿色。蒴果。

性味归经：甘，微寒。归心、肺经。

功能主治：养阴润肺，清心安神。用于阴虚久咳、痰中带血、虚烦惊悸、失眠多梦、精神恍惚。

用法用量：6 ~ 12克，内服煎汤或入丸、散。



花被先端向外反转



生境：常见栽培。

科：百合科	种： <i>Lilium concolor</i> Salisb. var. <i>pulchellum</i> (Fisch.) Regel	药名：有斑百合	别名：渥丹
-------	---	---------	-------



花有褐色斑点

有斑百合

药用部位：鳞茎。

植物特征：多年生草本。鳞茎卵状球形，白色，鳞茎上方的茎上簇生很多不定根。茎直立。叶互生，条形或条状披针形，两面均无毛，叶脉3 ~ 7条。花单生或数朵呈总状花序，花直立，开展，深红色，有褐色斑点。果矩圆形。

性味归经：甘，微寒。归心、肺经。

功能主治：养阴润肺，清心安神。用于阴虚久咳、痰中带血、虚烦惊悸、失眠多梦、精神恍惚。

用法用量：6 ~ 12克，水煎服或入丸、散。

生境：山地草甸、山沟及林缘。

科：百合科	种： <i>Lilium lancifolium</i> Thunb.	药名：百合	别名：斑点百合
-------	-------------------------------------	-------	---------

卷丹

药用部位：鳞茎。

植物特征：多年生草本。茎带紫色，有疏或密的白色绵毛。叶互生，披针形或线状披针形，叶腋内常有珠芽。花序总状，花橘红色，内面密生紫黑色斑点，开放后向外反卷；花药紫色。蒴果长圆形至倒卵形。

性味归经：甘，微寒。归心、肺经。

功能主治：养阴润肺，清心安神。用于阴虚久咳、痰中带血、虚烦惊悸、失眠多梦、精神恍惚。

用法用量：6 ~ 12克，水煎服或入丸、散。



花橘红色，内面密生黑色斑点

花蕾

叶互生

生境：林缘路旁及山坡草地。

科：百合科	种： <i>Lilium pumilum</i> DC.	药名：细叶百合
-------	------------------------------	---------



山丹

药用部位：鳞茎。

植物特征：多年生草本。鳞茎广椭圆形。茎细，圆柱形，绿色。茎上生叶50 ~ 80，细小纤弱，狭长如松叶。花单生于茎顶，或在茎顶叶腋间各生1花，成总状花序状，花被片6，红色，向外反卷。蒴果椭圆形。

性味归经：甘，微寒。归心、肺经。

功能主治：养阴润肺，清心安神。用于阴虚久咳、痰中带血、虚烦惊悸、失眠多梦、精神恍惚。

用法用量：6 ~ 12克，水煎服或入丸、散。



花被片向外反卷

生境：山坡林下及山地岩石间。

科：百合科	种： <i>Cardiocrinum giganteum</i> (Wall.) Makino	药名：水百合	别名：荞麦叶贝母
-------	---	--------	----------

大百合

药用部位：鳞茎。

植物特征：多年生草本。鳞茎由基生叶的叶柄基部膨大后组成，花序长出后随即凋萎，鳞茎四周长出小鳞茎，具纤维质的鳞茎坡，无鳞茎瓣，小鳞茎卵形。叶基生和茎生，长圆状心形或卵状心形。花序总状，花狭喇叭形，白色，具紫色条纹。蒴果长圆形。种子多数、扁平，红棕色。

性味归经：苦、微甘，寒。归肺经。

功能主治：凉血消肿。治鼻渊、中耳炎。

用法用量：15 ~ 25克，水煎服。外用捣敷或捣汁滴耳。



花瓣具紫色条纹

花狭喇叭状



生境：较阴湿的山谷中、水沟旁或树林中。

科：百合科	种： <i>Fritillaria cirrhosa</i> D. Don	药名：川贝	别名：贝母
-------	---------------------------------------	-------	-------

川贝母

药用部位：鳞茎。

植物特征：多年生草本。鳞茎圆锥形或近球形。茎直立。叶通常下端对生，上端3叶轮生，少为互生，叶片线形。花单生于茎顶，少有2朵，花被片6，黄绿色。蒴果六角矩形。种子薄而扁平，半圆形，黄色。

性味归经：苦、甘，微寒。归肺、心经。

功能主治：清热润肺，化痰止咳。用于肺热燥咳，干咳少痰，阴虚劳嗽。

用法用量：3 ~ 9克，研粉冲服，每次1 ~ 2克。



生境：高山草地或湿润的灌木丛中。

科：百合科	种： <i>Scilla sinensis</i> (Lour.) Merr.	药名：绵枣	别名：地枣儿
-------	---	-------	--------

绵枣

药用部位：鳞茎或带根全草。


植物特征：多年生草本。鳞茎卵圆形，具短的直生根状茎。叶基生，条形。花葶直立，总状花序的花在开放前密集，开放后变疏离，花粉红色至紫红色；花被片6。蒴果3棱状倒卵形，种子黑色。

性味归经：甘、苦，寒，有小毒。归心、肝经。

功能主治：强心利尿，消肿止痛，解毒。用于跌打损伤、腰腿疼痛、筋骨痛、牙痛、心脏病水肿；外用治痈疽、乳腺炎、毒蛇咬伤。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服。外用适量捣烂敷患处。

使用注意：孕妇忌服。



生境：山坡草地。

科：百合科	种： <i>Allium macrostemon</i> Bge	药名：小根蒜	别名：薤白
-------	----------------------------------	--------	-------

小根蒜

药用部位：鳞茎。

植物特征：多年生草本。鳞茎近球形，外被白色膜质鳞皮。叶基生，叶片线形，先端渐尖。伞形花序密而多花，近球形，顶生，花被片6，长圆状披针形，淡紫粉红色或淡紫色。果为蒴果。

性味归经：辛、苦，温。归肺经。

功能主治：理气，宽胸，通阳，散结。治胸痹心痛彻背、脘痞不舒、干呕、泻痢后重、疮疖。

用法用量：7.5 ~ 15克（鲜品50 ~ 100克），水煎服或入丸、散。外用捣敷或捣汁涂。



生境：耕地杂草中及山地较干燥处。

科：百合科	种： <i>Allium victorialis</i> L.	药名：薤葱	别名：大叶葱
-------	---------------------------------	-------	--------

薤葱

药用部位：鳞茎。

植物特征：多年生草本。鳞茎长椭圆形，鳞茎皮成丝网状。叶具长柄，长卵形或长椭圆形，全缘，质软而平滑，稍带粉白色；平行脉。花小，绿白色乃至淡紫色，簇生于茎顶。蒴果，室背开裂，种子黑色。

性味归经：辛，微温。归肺经。

功能主治：辛散温通，芳香辟秽。治风寒感冒、呕恶胀满之症。

用法用量：9 ~ 15克，水煎服。外用研末调涂患处。



生境：山野林荫、草甸。

科：百合科	种： <i>Allium cepa</i> L.	药名：洋葱	别名：圆葱、胡葱
-------	--------------------------	-------	----------

多花，密集



鳞茎球形，
外皮红褐色



洋葱

药用部位：鳞茎。

植物特征：二年生草本。鳞茎球形，粗大，外皮红褐色或黄白色。伞形花序，球形，多花，密集，花被片6，开展，绿色。蒴果球形。

性味归经：甘、微辛，温。归肝、脾、胃、肺经。

功能主治：润肠，理气和胃，健脾进食，发散风寒，温中通阳，消食，提神健体，散淤解毒的功效。主治外感风寒无汗、鼻塞、食积纳呆、宿食不消、高血压、高血脂、痢疾等症。

用法用量：15 ~ 50克，水煎服。



生境：常见栽培。

科：百合科	种： <i>Convallaria majalis</i> L.	药名：铃兰	别名：鹿铃、小芦铃
-------	----------------------------------	-------	-----------

铃兰

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。有多数须根。叶通常2枚，叶片椭圆形或广披针形，基部狭窄而呈鞘状，总状花序偏向一侧，花被乳白色，广钟形，下垂，有芳香，状似铃。浆果球形，熟时红色。

性味归经：苦，温，有毒。归心经。

功能主治：强心，利尿。用于充血性心力衰竭、心房纤颤，由高血压病及肾炎引起的左心衰竭。

用法用量：0.3克，每日不超过1.0克，水冲服。

使用注意：有毒，内服不可过量。

叶通常二枚



花被乳白色，广钟形

生境：林下草地。

科：百合科	种：Smilacina japonica A. Gray	药名：鹿药	别名：偏头七、山糜子、磨盘七
-------	------------------------------	-------	----------------

鹿药

药用部位：根及根茎。

植物特征：多年生草本。根茎横走，多少圆柱状，有时具膨大结节。茎中部以上具粗伏毛。叶互生，叶片纸质，卵状椭圆形、椭圆形或长圆形，两面疏被粗毛或近无毛。圆锥花序具粗短毛，花单生，花被片6，白色。浆果近球形，熟时红色。

性味归经：甘、苦，温。归肝、肾经。

功能主治：祛风止痛，活血消肿。用于风湿骨痛、神经性头痛；外用治乳腺炎、痈疖肿毒、跌打损伤。

用法用量：10 ~ 15克，水煎服。
外用适量捣烂敷患处。



生境：林下湿润处。

科：百合科	种：Smilacina dahurica Turz ex Fisch. Et Meyer	药名：兴安鹿药	别名：鹿根
-------	--	---------	-------

兴安鹿药

药用部位：根及根茎。

植物特征：多年生草本。根状茎粗匍匐状。茎直立，单一，下部近无毛，上部有短毛。叶长圆形或狭长圆形，纸质，无柄，表面鲜绿色，光滑，背面密生粗毛。花通常2 ~ 4朵簇生，极少单生，花冠白色，花被片6。浆果球形，熟时红色或紫红色。

性味归经：甘、苦，温。归肝、肾经。

功能主治：祛风除湿、活血调经。治风湿疼痛、肾气不足、月经不调。

用法用量：15 ~ 30克，水煎服。



生境：林下草地。

科：百合科	种： <i>Polygonatum macropodium</i> Turcz.	药名：多花黄精	别名：黄精
-------	--	---------	-------

热河黄精

药用部位：根状茎。

植物特征：多年生草本。根状茎肥厚，通常连珠状或结节成块。叶互生，无柄，呈椭圆形，叶脉3 ~ 5。花腋生，2至多花，伞形花序，花被筒状，绿白色。浆果球形，黑色。

性味归经：甘，平。归肺、脾、肾经。

功能主治：补脾，润肺生津。用于脾胃虚弱、肺虚燥咳、内热消渴。

用法用量：10 ~ 30克，水煎服。



叶互生，无毛

花被筒状，绿白色

生境：林下。

科：百合科	种： <i>Polygonatum humile</i> (Mill.) Druce	药名：玉竹	别名：二苞玉竹
-------	--	-------	---------

小玉竹

药用部位：根茎。

植物特征：多年生草本。茎单一，直立。叶互生，叶片长椭圆形，全缘，近无叶柄。花1 ~ 4朵，腋生，花被绿白色，合生成筒状。浆果球形，成熟时蓝黑色，有毒不可食。种子卵圆形，黄褐色。

性味归经：甘、平。归肺、胃经。

功能主治：养阴，润燥，除烦，止渴。治热病阴伤、咳嗽烦渴、虚劳发热、消谷易饥、小便频数。

用法用量：6 ~ 12克，水煎服。



浆果球形

生境：林下草地。

科：百合科	种： <i>Polygonatum sibiricum</i> Red	药名：黄精	别名：鸡头参
-------	-------------------------------------	-------	--------

黄精



药用部位：根茎。

植物特征：多年生草本。根茎横生，肥大肉质，黄白色，略呈扁圆形。有数个茎痕，茎痕处较粗大，生少数须根。叶无柄，叶片线状披针形至线形，上面绿色，下面淡绿色。花腋生，下垂，花被筒状，白色。浆果球形，成熟时黑色。

性味归经：甘，平。归肺、脾、肾经。

功能主治：滋肾润肺，补脾益气。用于阴虚肺燥、干咳少痰，及肺肾阴虚的劳嗽久咳。

用法用量：10 ~ 30克，水煎服。



生境：林下草地。

科：百合科	种： <i>Paris verticillata</i> M.-Bieb.	药名：重楼	别名：蚤休
-------	---------------------------------------	-------	-------

北重楼



药用部位：全草。

植物特征：多年生直立草本。根状茎细长。茎单一。叶轮生茎顶，披针形、狭矩圆形、倒披针形或倒卵状披针形，全缘。花梗单一，顶生一花，外轮花被片绿色，叶状，内轮花被片条形。蒴果浆果状，不开裂，种子多数。

性味归经：苦、寒，有小毒。归肝、肺、胃经。

功能主治：清热解毒，散瘀消肿。用于高热抽搐、咽喉肿痛；外用治痈疔肿毒、毒蛇咬伤。

用法用量：5 ~ 10克，研末吞服。外用适量捣敷患处。

生境：林下阴湿草地。

科：百合科	种： <i>Trillium tschonoskii</i> Maxim	药名：延龄草	别名：头顶一颗珠
-------	--------------------------------------	--------	----------

延龄草


药用部位：根状茎。

植物特征：多年生草本。根状茎粗短。叶纸质，3片，轮生于茎顶端，近菱形、卵状菱形或圆菱形，具3主脉，近无柄。花两性，单生于叶轮中央；花被片6，卵状披针形或近椭圆形，两轮排列，外轮绿色，内轮白色，稀淡紫色。浆果球形，紫黑色。

性味归经：甘，温，有小毒。归心、肝、肺经。

功能主治：镇静止痛，止血，解毒。用于眩晕头痛、高血压病、神经衰弱、跌打损伤、腰腿疼痛、月经不调、崩漏；外用治疗疮。

用法用量：2.5 ~ 15克，水煎服。外用适量，鲜品捣烂敷患处。



生境：海拔1000 ~ 3200米的林下、山谷阴湿处。

科：百合科	种： <i>Asparagus schoberioides</i> kunth.	药名：玉带天门冬	别名：雉隐天冬
-------	--	----------	---------

龙须菜

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。根状茎粗短。茎直立。叶窄条镰刀状，簇生。花腋生，钟状，黄绿色。浆果深红色，具1 ~ 2粒种子。

性味归经：甘，寒。归肺经。

功能主治：滋阴止血。治肺络灼伤之咯血。

用法用量：15 ~ 30克，水煎服。



生境：林下潮湿处。

科：百合科	种： <i>Asparagus trichophyllus</i> Bunge	药名：曲枝天门冬	别名：天冬
-------	---	----------	-------

曲枝天门冬

药用部位：块根。

植物特征：直立草本。根稍肉质。叶鳞片状，基部具刺状距或距不明显，极少为硬刺，分枝上的鳞片叶的距不明显。花每2朵腋生，单性，雌雄异株，绿黄色或稍带紫色。浆果球形，成熟时红色，具3 ~ 5颗种子。

性味归经：甘、苦，凉。归肝经。

功能主治：祛风除湿。可治风湿性腿痛、局部性浮肿；外用治瘙痒性、渗出性皮肤病、各种疮疖红肿。

用法用量：10 ~ 20克，水煎服或熬膏，入丸、散。



生境：阴湿的山野林边、山坡草丛或丘陵地带灌木丛中。

科：百合科	种： <i>Liriope platyphylla</i> Wang et Tang	药名：麦冬	别名：阔叶麦冬
-------	--	-------	---------



麦冬

药用部位：块根。

植物特征：多年生草本。根多分枝，常局部膨大成纺锤形或圆矩形小块根。叶丛生，革质，具9 ~ 11条脉。总状花序具多数花，3 ~ 8朵簇生于苞片腋内，花被片矩圆形或矩圆状披针形，紫色。种子球形，初期绿色，成熟后变黑紫色。

性味归经：甘、微苦，凉。归心、胃、肺经。

功能主治：养阴润肺、清心除烦、益胃生津。治肺燥干咳、吐血、咯血、肺痿、肺癰、虚劳烦热、消渴。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服。



生境：山地林下，或山谷潮湿处。

科：百合科	种： <i>Aletris spicata</i> (Thunb.) Franch	药名：粉条菜	别名：蛆芽草
-------	---	--------	--------

粉条儿菜



药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。具多条肉质根。叶条形。花疏生，排列成总状花序，花被短筒状，白色带淡

红或粉红色。蒴果卵形，包藏于宿存的花被内。

性味归经：甘，平。归心、肺、大肠经。

功能主治：润肺止咳，养心安神，消积驱蛔。用于支气管炎、百日咳、神经功能症、小儿疳积、蛔虫病、腮腺炎。

用法用量：15 ~ 50克，水煎服。



生境：海拔800 ~ 2000米的山坡草丛中。

科：百合科	种： <i>Smilax riparia</i> DC.	药名：牛尾菜	别名：金刚豆藤、草菝葜
-------	------------------------------	--------	-------------

牛尾菜

药用部位：根及根状茎。

植物特征：攀缘状草质藤本。具纵沟，无毛。根茎具多数细长须根。叶互生，卵状披针形至披针状长椭圆形，上面光泽，下面淡粉色；叶柄基部具线状卷须1对。花单性，雌雄异株，伞形花序腋生，花淡黄绿色。浆果成熟时紫黑色。

性味归经：甘、苦，平。归肝、肺经。

功能主治：祛风活络，祛痰止咳。用于风湿性关节炎、筋骨疼痛、跌打损伤、腰肌劳损、支气管炎、肺结核咳嗽咯血。

用法用量：25 ~ 50克，水煎或泡酒服。



花淡黄绿色

叶卵状披针形

细长须根



叶互生

生境：山坡林下。

科：百合科	种： <i>Smilax sieboldii</i> Miq.	药名：菝葜	别名：金刚藤
-------	---------------------------------	-------	--------

华东菝葜

药用部位：根及根状茎。

植物特征：落叶攀缘藤状灌木。茎细长坚硬，有疏生倒向皮刺，具地下块茎，分枝较少。单叶互生，叶柄有卷须，花期叶幼小，革质或纸质，有光泽，卵圆形或椭圆形。花单性，雌雄异株，排成腋生伞形花序，花黄绿色。浆果球形，成熟时黑色。

性味归经：甘、酸，平。归肝、肺、肾经。

功能主治：驱风利湿，解毒散淤。用于关节疼痛、肌肉麻木、泄泻、痢疾、水肿、淋病、疔疮、肿毒、痔疮。

用法用量：15 ~ 30克，水煎服。



生境：低海拔山坡、路旁、林缘，疏林下、溪边草丛等山坡林下和荒山草地。

科：石蒜科	种： <i>Lycoris aurea</i> (L'Her.) Herb	药名：黄花石蒜	别名：铁色箭
-------	---------------------------------------	---------	--------

忽地笑

药用部位：根状茎。

植物特征：多年生草本。鳞茎肥大，近球形。叶基生，质厚，宽条形。伞形花序具5 ~ 10朵花。花黄色或橙色。蒴果每室有种子数枚。

性味归经：辛，温，有毒。归肾、肝经。

功能主治：消肿，杀虫。外用治淋巴结核，疔疮疖肿，风湿关节痛，蛇咬伤，水肿，灭蛆、灭鼠。

用法用量：外用适量捣敷患处。



生境：山地草丛中。

科：石蒜科	种： <i>Lycoris radiate</i> (L. Herit.) Herb	药名：石蒜	别名：老鸦蒜、蟑螂花、一枝箭
石蒜 药用部位：鳞茎。 植物特征：多年生草本。地下鳞膜肥厚，广椭圆形，外被紫红色薄膜。叶线形，5~6片，冬季抽出，夏季枯萎。伞形花序顶生，花鲜红色或具白色边缘，花被片6，花后不结实。 性味归经：辛、甘，温，有毒。归肝、肾经。 功能主治：消肿，杀虫。外用治淋巴结核、疔疮疖肿、风湿关节痛、蛇咬伤、水肿、灭蛆、灭鼠。 用法用量：外用适量捣烂敷患处。 使用注意：本品有毒，内服谨慎。  花鲜红色 地下茎广椭圆形 生境：常见栽培。			

科：石蒜科	种： <i>Narcissus tazetta</i> var. <i>chinensis</i> Roem.	药名：水仙	别名：玉玲珑、金盏银台
水仙 药用部位：鳞茎。 植物特征：多年生草本。叶基生，扁平直立，质厚，先端钝，全缘，上面粉绿色。花4~8朵，排列成伞形花序，花香，花被高脚碟形，裂片倒卵形，白色，副花冠浅杯状，淡黄色。蒴果胞背开裂，由绿色转至棕色。 性味归经：苦、辛，寒，有小毒。归肝、肺经。 功能主治：清热解毒，散结消肿。用于腮腺炎、痈疖疔毒初起红肿热痛。 用法用量：15~20克，水煎服。外用适量鲜品捣烂敷患处。 使用注意：有毒，内服谨慎。  花被白色 副花冠淡黄色 鳞茎 生境：常见栽培。			

科：薯蓣科

种：*Dioscorea nipponica* Makino

药名：穿山龙

别名：穿龙薯蓣、地龙骨

穿山龙

药用部位：根状茎。

植物特征：缠绕草质藤本。根茎横走，断面黄色。茎左旋，无毛。叶互生，掌状心形，变化较大，边缘作不等大的三角状浅裂、中裂或深裂，全缘。花单性异株，穗状花序腋生；雄花无柄，花被6裂，雄蕊6；雌花常单生，花被6裂。蒴果倒卵状椭圆形。

性味归经：甘、苦，温。归肝、肺经。

功能主治：舒筋活血，止咳化痰，祛风止痛。用于腰腿疼痛、筋骨麻木、跌打损伤、闪腰、咳嗽喘息、气管炎。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服。

生境：山坡林边、灌木林下及沟边。



科：薯蓣科

种：*Dioscorea zingiberensis* C. H. Wright

药名：姜黄

别名：火头根

盾叶薯蓣

药用部位：根状茎。


植物特征：草质缠绕藤本。茎左旋，在分枝或叶柄的基部有时具短刺。单叶互生，盾形，边缘浅波状。花雌雄异株或同株；雄花序穗状，雄花2 ~ 3朵簇生；雌花序总状穗状。蒴果。

性味归经：甘、苦，凉。

功能主治：解毒消肿。用于痈疖早期未破溃、皮肤急性化脓性感染、软组织损伤、蜂螫虫咬。

用法用量：外用适量，捣烂敷患处。

生境：林下草地。



科：薯蓣科	种： <i>Dioscorea japonica</i> L.	药名：野山药	别名：日本薯蓣
-------	---------------------------------	--------	---------

野薯蓣

药用部位：根状茎。

植物特征：多年生草本。块茎卵圆形，外皮黑褐色。叶互生，叶宽卵圆形，部分叶片基部突出，呈戟形。雄花序穗状下垂，数个丛生叶腋；雌花序与雄花序相似。蒴果下弯，有3翅，翅长圆形，种子褐色。

性味归经：甘，平。归肺、脾、肾经。

功能主治：健脾，厚肠胃，补肺，益肾。治脾虚泄泻、久痢、虚劳咳嗽、遗精带下、小便频数、消渴、子宫脱垂。

用法用量：15 ~ 25克，水煎服。外用适量，捣烂或磨汁敷患处。

生境：河谷杂木林边缘。



科：鸛尾科	种： <i>Crocus sativus</i> L.	药名：番红花	别名：西红花、藏红花
-------	-----------------------------	--------	------------

番红花

药用部位：柱头。

植物特征：多年生草本。鳞茎扁球形。自鳞茎生出2 ~ 14株丛，每丛有叶2 ~ 13片，基部为3 ~ 5片广阔鳞片乌黑叶线形，边缘反卷，具细毛。花顶生，花被片6，倒卵圆形，淡紫色，花筒细管状，花药基部箭形，花柱细长，黄色，柱头3，膨大呈漏斗状，伸出花被筒外而下垂，深红色。蒴果长圆形。

性味归经：甘，平。归心、肝经。

功能主治：活血化淤，凉血解毒，解郁安神。用于经闭症瘕、产后淤阻、温毒发斑、忧郁痞闷、惊悸发狂。

用法用量：1 ~ 3克，冲泡或浸酒炖。

生境：北方见栽培。



科：鸢尾科	种： <i>Iris pallasii</i> Fisch. var. <i>chinensis</i> Fisch.	药名：马蔺	别名：马莲、马兰花
-------	---	-------	-----------

马蔺

药用部位：全草。

植物特征：多年生宿根草本。根茎粗壮，须根细长而坚韧。叶基生，狭线形，无明显中脉，基部具纤维状老叶鞘，叶下部带紫色，质地较硬。花浅蓝色至蓝紫色。蒴果长椭圆状柱形。

性味归经：酸、咸，凉。归肺、肝经。

功能主治：清热解毒，通淋。治喉痹、痈疽、淋病。马蔺根可清热解毒、治喉痹、痈疽、风湿痹痛。

用法用量：10 ~ 15克，水煎服。



生境：山野草原、田野路旁。

科：鸢尾科	种： <i>Iris dichotoma</i> Pall	药名：野鸢尾	别名：白花射干
-------	-------------------------------	--------	---------

野鸢尾

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。根状茎细，横生。茎分枝，枝成双。叶剑形，嵌迭状。花3 ~ 5朵一簇，白色，有少数紫褐色或红紫色斑点，外转花被具白色斑块。蒴果狭长圆形。种子暗褐色。

性味归经：苦，寒，有小毒。归肺、肝经。

功能主治：清热解毒。治咽喉肿痛、肝炎、胃痛、乳腺炎、牙龈肿痛。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服或捣汁。外用切片贴痛处。



生境：丘陵坡上。

科：美人蕉科	种： <i>Canna generalis</i> L.	药名：美人蕉	别名：大花美人蕉、红艳蕉、兰蕉、昙华
--------	------------------------------	--------	--------------------

美人蕉



药用部位：根茎、花。

植物特征：多年生宿根草本花卉。根茎肥大，地上茎肉质，不分枝。叶互生，宽大，长椭圆状披针形。总状花序自茎顶抽出，花瓣直伸，具四枚瓣化雄蕊。花色有乳白、鲜黄、橙黄、橘红、粉红、大红、

紫红、复色斑点等50多个品种。

性味归经：涩，寒。归心、肝经。

功能主治：清热利湿，安神降压。主治疮疡肿毒、子宫出血、白带过多、急性黄疸型肝炎。

用法用量：20 ~ 50克，捣汁服用。

生境：常见栽培。



科：兰科	种： <i>Platanthera chlorantha</i> Cust. ex Rchb	药名：二叶舌唇兰	别名：土白芨
------	--	----------	--------

二叶舌唇兰

药用部位：块茎。

植物特征：多年生草本。块茎卵状纺锤形，肉质，上部收狭细圆柱形，细长。基部大叶片椭圆形或倒披针状椭圆形。总状花序，花较大，绿白色、浅黄或白色；花粉团椭圆形，具细长的柄和近圆形的粘盘。蒴果球形，种子细小。

性味归经：苦，平。归肝、肺经。

功能主治：补肺生肌，化淤止血。用于肺癆咳血、吐血、鼻出血；外用治创伤、痈肿、水火烫伤。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服。

生境：林下草地。



科：兰科

种： *Bletilla striata* (Thunb.) Reiehb. f.

药名：白芨粉

别名：连及草、甘根

白芨

药用部位：块茎。

植物特征：多年生草本。假鳞茎块根状，白色，肥厚，有指状分歧。茎粗壮，直立。叶披针形或广披针形，先端渐尖。总状花序顶生，花大，紫红色，花瓣3，唇瓣倒卵长圆形。蒴果圆柱状，种子细小如尘埃。

花紫红色

总状花序顶生

药材

性味归经：苦、甘、涩，微寒。归肺、肝、胃经。

功能主治：收敛止血，消肿生肌。用于肺胃出血、外伤出血、痈肿、溃癌、手足皲裂。

用法用量：6 ~ 15克，水煎服，或1.5 ~ 3克，研末吞服。外用适量捣敷。

叶披针形

生境：山谷林下阴湿处，常见栽培。

科：兰科

种： *Gastrodia elata* Bl.

药名：天麻

别名：赤箭、木浦

天麻

药用部位：块茎。

植物特征：多年生腐生草本。无绿叶，地下块茎肥厚，长椭圆形、卵状长椭圆形或哑铃形，肉质，常平卧。茎直立，下部疏生数枚膜质鞘。总状花序顶生，花橙红、淡黄、蓝绿或黄白色。蒴果直立，倒卵状椭圆形，种子细小，多数。

性味归经：甘，平。归肝经。

功能主治：平肝息风止痉。用于头痛眩晕、肢体麻木、小儿惊风、癫痫抽搐、破伤风。

用法用量：3 ~ 9克，水煎服或入丸、散。

块茎

生境：阔叶林或针阔混交林的林缘或林间空地上，与蜜环菌[*Armillariella mellea* (Vahl. ex Franch.) Karst.]共生。

科：兰科	种： <i>Spiranthes australis</i> (R. Brown.) Lindl.	药名：绶草	别名：盘龙参
------	---	-------	--------

绶草


药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。肉质根。叶条状披针形或条形。花序顶生，具多数密生的小花，似穗状、呈螺旋状排列，花白色或淡红色、像小龙盘在柱上，花被为淡粉红色，唇瓣囊状，内有腺毛。蒴果。

性味归经：甘、淡，平。归肝、肺、肾经。

功能主治：益阴清热，润肺止咳。治病后虚弱、阴虚内热、咳嗽吐血、头晕、腰酸、遗精、淋浊带下、疮疡痈肿。

用法用量：鲜品25 ~ 50克，水煎服。外用适量捣敷患处。



生境：海拔400 ~ 3200米的山坡林下或草地。

科：兰科	种： <i>Gymnadenia conopsea</i> R. Brown	药名：手掌参	别名：佛手参
------	--	--------	--------

手参

药用部位：块根。

植物特征：多年生草本。块茎通常2枚，一枚肥厚，一枚干瘦，黄白色，椭圆形，下部4 ~ 6掌状分裂。茎生叶互生，叶片长披针形。穗状花序顶生，花多而密集，花瓣斜卵形，唇瓣阔倒卵形。蒴果长圆形，种子淡棕色，极多而细小。

性味归经：甘、微苦，凉。归肝、肾、肺经。

功能主治：补肾益精，理气止痛。治病后体弱、神经衰弱、咳嗽、阳痿、久泻、白带、跌打损伤、淤血肿痛。

用法用量：5 ~ 15克，水煎服，也可作散剂或泡酒内服。



生境：草甸、山坡、林间草地、河谷及灌丛间。

科：兰科	种： <i>Dendrobium nobile</i> Lindl	药名：石斛	别名：林兰、金钗花
------	-----------------------------------	-------	-----------

石斛

药用部位：茎。

植物特征：多年生附生草本。茎丛生，直立，稍扁，基部收窄而圆，具槽纹，多节。叶近革质，矩圆形。总状花序生于上部节上，花大，下垂，白色，先端带淡红色或淡紫色，唇瓣卵圆形，边缘微波状，基部有深紫色斑块，两侧有紫色条纹。蒴果。

性味归经：甘，微寒。归胃、肾、肺经。

功能主治：益胃生津，滋阴清热。用于阴伤津亏、口干烦渴、食少干呕、病后虚热、目暗不明。

用法用量：6 ~ 15克（鲜品加倍），水煎服（宜久煎），或熬膏，入丸、散。

使用注意：脾胃虚寒者忌服。



生境：海拔480 ~ 1700米的林中树干上或岩石上，常见栽培。

科：兰科	种： <i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Brown	药名：角盘兰	别名：人头七、人参果
------	---	--------	------------

角盘兰

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。块根球状或卵状。叶互生，通常2枚，生于茎下部，稀有3枚；叶片椭圆状披针形，全缘，平行脉。穗状花序顶生，花黄绿色，唇瓣无距，3裂。蒴果长圆形。

性味归经：甘，温。归肾、胃、膀胱经。

功能主治：滋阴补肾，养胃，调经。用于神经衰弱、头晕失眠、烦躁口渴、食欲不振、须发早白、月经不调。

用法用量：15 ~ 20克，水煎或泡酒服。

生境：山坡草地林下。



笔画索引

一画

一日花 267
一串红 60
一把伞 237
一把伞南星 260
一枝箭 282

二画

丁香皮 177
七叶树 146
七叶胆 217
七星草 21
七瓣莲 173
九九花 237
九盖草 204
九眼独活 169
二月兰 109
二叶舌唇兰 286
二色补血草 175
二歧银莲花 92
二苞玉竹 276
人丹草 194
人头七 289
人参 163
人参果 122, 289
八月炸 97
八步紧 105
八角乌 152
八角茴 102
八宝 111
刀豆三七 104

三画

三七草 246
三叉草 15
三叉骨 99
三叶公母草 128
三叶木通 97
三叶豆 129
三叶拿绳 97
三尖杉 29
三角风 20
三角草 107
三铃子 133
三颗针 100
于术 238
千里香 195
千屈菜 159

千金子 142
千金草 227
卫矛 146
叉子圆柏 28
叉歧繁缕 71
土人参 195
土八角 102
土三七 111, 112
土大黄 57, 58, 60
土元胡 105
土木香 231
土木贼 13
土贝母 216
土瓜 220
土田七 164
土白芨 286
土白前 228
土当归 163
土香薷 194
土桔梗 74
土银花 213
土麻黄 13
土黄芩 92
土黄连 82, 105
土槿皮 26
土樗子 141
大力子 239
大贝母 216
大车前 211
大叶毛狼 83
大叶龙胆 178
大叶苎麻 46
大叶铁线莲 96
大叶黄杨 145
大叶景天 111
大叶葱 273
大白菜 106
大百合 271
大红袍 138
大花飞燕草 89
大花美人蕉 286
大花剪秋罗 73
大花萱草 267
大芸 208
大刺菜 240
大种半边莲 226
大种鹅儿肠 75
大浮萍 23
大绿 149

大麻 44
大黄 59
大戟 143
大蓝 107
大蓟 240
大蓼子 52
大藻 260
女娄 76
子午莲 78
小一枝箭 241
小山桃儿七 82
小乌头 84
小天仙子 198
小太子参 69
小巴豆 142
小无心菜 69
小车前 211
小丛红景天 110
小叶山楂 115
小叶白蜡 176
小叶朴 40
小叶杨 34
小叶贯众 18
小叶骨牌草 21
小叶薄荷 194
小玉竹 276
小尖刀 20
小灰菜 62
小血转 215
小芦铃 274
小芭蕉 267
小花杜鹃 171
小花草玉梅 93
小芹菜 170
小辛 49
小鸡树 36
小麦 253
小虎掌草 91
小贯众 19
小青草 210
小茴 166
小茴香 166
小荆 188
小荨麻 45
小香 166
小根蒜 273
小益母草 190
小蓼蓉 198
小悬钩子 119

小旋花 185
小黄花 230
小棕包 265
小萱草 266
小蓟 240
小檗 99
山大烟 104, 198
山女娄菜 74
山丹 271
山木通 95
山白果 80
山白菜 202
山地瓜 150
山当归 203
山百根 264
山百部 264
山米壳 104
山芝麻 161, 192
山杏 123
山杨 34
山芥菜 62
山花椒 102
山豆藤 100
山麦胡 193
山刺玫 117
山枣 148
山苞米 259
山苦葵 244
山金匏 220
山柏 29
山茱萸 170
山茴香 167
山茶根 190
山蚂蚱 76
山香菜 170
山核桃 36
山根龙 62
山烟根子 182
山高粱 55
山梗菜 226
山菊花 235
山崧菠 62
山菠菜 58
山萝卜 216
山萸肉 170
山银柴胡 69
山黄连 105
山葡萄 149
山葫芦 149

山慈菇 268
山楂 115
山楂叶悬钩子 119
山蓼 61, 95
山辣椒 90, 91
山糜子 275
川木香 241
川贝 272
川贝母 272
川独活 169
川香 241
川续断 215
川椒 138
广布野豌豆 133
飞天蜈蚣 150
飞来鹤 182
马兰 228
马兰花 285
马甲子 147
马甲子根 147
马先蒿 205
马耳朵 209
马耳还阳 209
马耳草 251
马尾连 85
马尾莲 86
马尾黄连 85, 86
马辛 50
马唐 254
马根子草 250
马狼杆 135
马狼柴 135
马莲 285
马兜铃 50
马蔺 285
马蹄细辛 50
马蹄香 50

四画

中宁枸杞 197
中华山蓼 61
中华凤丫蕨 17
中华卷柏 12
中华秋海棠 156
中国粗榧 29
中岩蕨 19
丹皮 80
丹参 193

- 乌头 88
 乌苏里瓦韦 21
 乌梅子 102
 乌脚芒 16
 乌菱 160
 乌蓼 52
 云归 168
 五月霜 229
 五加 162
 五加皮 162
 五叶参 217
 五朵云 144
 五君树 80
 五味子 102
 五脉山黧豆 136
 五铃花 85
 井边茜 15
 井栏边草 15
 元宝树 36
 元胡 105
 公母草 13
 六瓣花 269
 凤尾七 110
 凤尾草 15
 凤尾蕨 15
 凤眼莲 263
 升麻 83
 双珠母 118
 反枝苋 65
 反顾马先蒿 205
 天仙子 198
 天冬 279
 天生子 43
 天名精 231
 天师栗 146
 天花粉 220
 天豆 90
 天南星 259, 260
 天星草 172
 天麻 287
 天葵 84
 天蓼 52
 太子参 70
 太白黄连 82
 孔麻 152
 手参 288
 手掌参 288
 支柱蓼 53
 文先果 43
 文星草 262
 无心草 12
 无心菜 68
 无花果 43
 无梗五加 162
 日本小檗 99
 日本续断 216
 日本菟丝子 184
 日本薄荷 194
 日本薯蓣 284
 月见草 161
 木天蓼 154
 木天蓼子 154
 木半夏 158
 木瓜 116
 木芍药 80
 木油果 159
 木梨 115
 木浦 287
 木笔花 101
 木贼 12
 木贼草 12
 木贼麻黄 31
 木通 51, 97
 木通马兜铃 51
 木蓝 128
 止血草 18
 止痢草 194
 毛大丁草 241
 毛牛耳大黄 246
 毛风藤 200
 毛地黄 202
 毛芹菜 90
 毛连菜 246
 毛姑朵花 94
 毛建草 196
 毛茛 90
 毛香 51
 毛柴胡 246
 毛粟 38
 毛棘豆 134
 水仙 282
 水玉簪 262
 水瓜 218
 水田芥 108
 水百合 271
 水红花子 52
 水花 261
 水芹花 78
 水金凤 147
 水柳 159
 水树 26
 水浮莲 260, 263
 水菱 160
 水萍 261
 水萝卜 203
 水麻柳 36
 水晶凉粉 197
 水粟包 79
 水葫芦 263
 水蓼 54
 水蔓菁 204
 火头根 283
 火烧草 113
 火麻仁 44
 火麻草 46, 47
 火焰草 113
 牛皮草 20
 牛皮消 182
 牛耳草 209
 牛至 194
 牛舌头 57
 牛舌草 211
 牛尾菜 280
 牛角椒 201
 牛迭肚 119
 牛金花 105
 牛扁 87
 牛筋草 253
 牛蒡 239
 牛蒡子 239
 牛踏鼻 246
 牛繁缕 70
 王瓜 217, 220
 瓦韦 21
 瓦宝塔 110
 瓦松 110
 贝加尔唐松草 86
 贝母 272
 车前子 211
 长叶柳杉 28
 长生草 169
 长果升麻 82
 长柱沙参 225
 长药景天 111
 长管活血丹 192
 长嘴老鹤草 137
 风菱 160
 风寒草 174
 丝瓜络 218
 仙人谷 67
 仙白草 228
 仙灵脾 99
 仙草根 223
 兰州百合 269
 兰花参 227
 兰蕉 286
 冬术 238
 冬瓜 219
 冬瓜皮 219
 冬青卫矛 145
 冬葵 151
 冬葵子 151
 凹头苋 66
 包谷 252
 北马兜铃 50
 北乌头 87
 北五加皮 181
 北五味子 102
 北瓜 222
 北沙参 225
 北芪 131
 北苍术 238
 北豆根 100
 北堇花 158
 北重楼 277
 北柴胡 164
 北桑寄生 48
 北寄生 48, 49
 北黄花菜 266
 半夏 258, 259
 叶子菜 223
 叶用甜菜 62
 四大天王 34
 四大金刚 34
 四月子 158
 四片瓦 34
 四叶对 34
 四叶参 223, 70
 四叶细辛 34
 四叶草 22
 四叶菜 70
 四叶葶 22
 四块瓦 34
 四棱杆蒿 191
 四棱锋 146
 头顶一颗珠 278
 奶浆果 43
 奶浆草 142, 144
 奶疳草 142
 宁夏枸杞 197
 对叉草 89
 尼泊尔酸模 57
 平车前 211
 平杨柳 36
 平榛 38
 幼肺三七 93
 打碗花 185
 母猪莲 260
 汉防己 100
 玄参 203
 玉门精 231
 玉竹 276
 玉米 252
 玉米须 252
 玉带天门冬 278
 玉玲珑 282
 玉蜀黍 252
 玉簪 267
 玉簪花 267
 瓜木 160
 瓜木根 160
 瓜蒌 220
 瓜蒌皮 220
 甘松 215
 甘草 135
 甘根 287
 甘菊花 235
 甘野菊 235
 甘遂 143
 甘露子 195
 生夏 258
 田字草 22
 田皂角 126
 田旋花 185
 白马尾 182
 白丑 186
 白毛藤 200
 白牛膝 75
 白头翁 121, 94
 白术 238
 白玉簪 267
 白皮 219
 白石薯 48
 白地栗 247
 白芍 81
 白芨 287
 白芨粉 287
 白杨树皮 34
 白花珍珠草 172
 白花夏枯 190
 白花射干 285
 白花菜 106
 白芷 168
 白苋 65

五画

- 东方草莓 121
 东方香蒲 247
 东方蓼 52
 东风菜 228
 东北延胡索 105
 东北红豆杉 30
 东北南星 259
 东防风 165
 丝瓜 218

白附子 87
白刺 138
白刺果 138
白参 224
白屈菜 105
白苞筋骨草 189
白英 200
白苣 168
白茨 138
白首乌 182, 183
白桦 37
白透骨消 192
白猪子果 48
白麻 152, 46
白榆 39
白蒺藜 137
白锦条 160
白鼓钉 228
白蔹 150
白鲜 139
白鲜皮 139
白薇 182
白朮 139
石韦 20
石生悬钩子 119
石生蝇子草 74
石龙芮 90
石防风 170
石沙参 224
石花子 209
石茶 20
石苣荬 48
石香薷 196
石斛 289
石蒜 282
石蜈蚣 18
石薯 48
艾 237
艾草 237
节节草 13
节骨草 12
辽藁本 166
鸟绒树 125
龙爪豆 136
龙须菜 278
龙眼根 83
龙葵 199

六画

伤寒草 18
光头稗子 254
光紫菀 239
全缘马兰 228

全缘贯众 19
关木通 51
关白附 87
关防风 165
关附子 87
兴安鹿药 275
冰凌花 91
列当 208
刘寄奴 206
刚毛葶苈 256
华中五味子 102
华东菝葜 281
华东覆盆子 120
华北八宝 112
华北大黄 60
华北乌头 88
华北景天 112
华北落叶松 26
华北楼斗菜 85
华北覆盆子 120
华丽景天 111
合欢 125
合欢皮 125
合萌 126
吊菜子 200
团羽铁线蕨 16
地丁 105, 131, 155
地丁草 105
地乌 92
地毛球 161
地龙骨 283
地网子 12
地麦 64
地松 72
地枣儿 272
地肤 64
地肤子 64
地柏 12
地柏叶 18
地柏枝 12
地牯牛草 195
地蚤 193
地蚕 195
地黄 202
地椒 195
地槿 90
地榆 117
地槐 127
地锦 150
地锦草 142
地锦藤 150
多花菜豆 136

多花黄精 276
多歧沙参 226
如意菜 14
寻骨风 51
尖叶杜鹃 172
尖佩兰 228
延龄草 278
异叶假繁缕 70
异色繁缕 72
异花太子参 69
异花假繁缕 69
当归 168
当药 179
当道 211
扫帚苗 64
扫帚菜 64
早竹 255
早园竹 255
曲枝天门冬 279
有柄石韦 20
有斑百合 270
朴树皮 40
江柳 35
灯心草蚤缀 69
灯笼草 199
灯笼棵 190
灰绿藜 62
百合 269, 270
百里香 195
百部 264
祁木香 231
祁州漏芦 242
竹叶 255
竹叶细辛 183
竹叶柴胡 164
米口袋 131
米瓦罐 75
米壳 103
米参 70
米蒿 109
红丁香 177
红三七 53
红升麻 113
红毛七 98
红毛三七 98
红丝草 142
红叶 145
红叶小檗 99
红皮松 27
红石根 186
红杉 26
红花 242
红花菜豆 136

红花锦鸡儿 134
红豆杉 30
红钉耙藤 95
红姑娘 199
红松 27
红果子 115
红直当药 179
红直当獐牙菜 179
红柳子 180
红茴香 102
红药 81
红根 193
红根菜 63
红浮萍 23
红艳蕉 286
红铃子 102
红萍 23
红铧头草 155
红麻 180
红萱 266
红黑二丸 156
红蓼 52
红蜡花 91
红藿毛草 47
羊儿草 72
羊下巴 246
羊奶条 181
羊角蒿 207
羊乳 223
羊桃 154
羊蹄 57
羊蹄草 58
羽衣草 234
老仓谷 67
老公花 94
老君须 182
老来少 66
老枪谷 67
老虎脚爪草 90
老虎嘴 243
老鸦蒜 282
老鸦瓣 268
老鹳草 137
肉苁蓉 208
芍药 81
芒稷 254
芝麻七 205
血山草 112
血见愁 142
血见愁 175
血生根 193
血参 193

血箭草 117
西风谷 65
西瓜 218
西瓜翠衣 218
西当归 168
西红花 284
西伯利亚杏 123
西枸杞 197
西洋菜 108
过山龙 129
过沟龙 44
过路黄 174
问荆 13
防己藤 100
防风 165
阴行草 206

七画

两叶豆苗 133
余容 81
佛手参 288
佛甲草 113
佛耳草 230
冷水丹 50
君迁子 175
园叶山蓼 61
尾穗苋 67
库拉索芦荟 268
忍冬 213
忘忧草 266
抓地龙 254
抓地草 254
拒冬 142
旱三七 112
旱麦瓶草 76
旱金莲 81
旱柳 35
旱荷花 269
杏叶参 224
杜松 29
杜松子 29
杜衡 50
杠板归 55
杠柳 181
杨家坪柴胡 165
沙地柏 28
沙参 225, 226
沟酸浆 205
没骨花 81
灵香蒿 229
灵通 135
牡丹 80
牡丹皮 80

- 牡丹藤 96
 牡荆 188
 疔疮草 232
 皂角 126
 皂荚 126
 秃子花 104
 秃疮花 104
 芡实 78
 芦苇 249
 芦荟 268
 芦根 249
 芦稷 251
 菱角 160
 花生 132
 花生叶 132
 花杆南星 257
 花椒 138
 芹叶铁线莲 96
 葎子 249
 苋 66
 苋菜 65, 66
 苍术 238
 苍耳子 232
 苎麻根 46
 补血草 175
 补骨脂 130
 角盘兰 289
 角蒿 207
 谷罗葱 243
 谷精草 262
 豆寄生 184
 豆渣菜 232
 豆瓣菜 108
 赤术 238
 赤朴 101
 赤参 193
 赤柏松 30
 赤雹 217
 赤箭 287
 辛夷 101
 迎山红 172
 迎红杜鹃 172
 还亮草 89
 还魂草 89
 远志 141
 连及草 287
 连母 265
 连香树 80
 连香树果 80
 连翘 176
 针雀 100
 针蔺 256
 阿芙蓉 103
- 附子 87, 88
 附支 97
 附地菜 187
 驴耳朵菜 229
 鸡爪连 89
 鸡头米 78
 鸡头参 277
 鸡头苞 78
 鸡头莲 78
 鸡肠草 187, 212
 鸡骨升麻 98
 鸡骨头花 178
 鸡眼草 130
 鸡麻 118
 鸡腿堇菜 155
 鸡腿菜 155
 麦子 253
 麦冬 279
 麦瓶草 75
- ### 八画
- 京三棱 255
 京大戟 143
 侧金盏花 91
 兔儿奶 243
 兔儿伞 237
 兔儿草 233
 兔儿菜 244
 兔耳风 241
 具刚毛荸荠 256
 净瓶 75
 刺儿菜 240
 刺儿棵 232
 刺五加 162
 刺红花 242
 刺李 114
 刺拐棒 162
 刺果甘草 135
 刺果茶藨子 114
 刺玫果 117
 刺柏 29
 刺梨 114
 刺莲藕 78
 刺梦 166
 刺菜 240
 刺蓼 54
 单穗升麻 83
 卷丹 270
 卷耳 71
 国老 135
 国槐 127
 垂序商陆 67
 夜关门 128
- 夜合树 125
 夜来香 161
 委陵菜 121
 宝树 28
 宝塔菜 195
 岩青兰 196
 岩浮萍 16
 岷当归 168
 忝菜 62
 忽布 43
 忽地笑 281
 拉拉秧 44
 拉拉菀 185
 拉拉蔓 44
 拉拉藤 212, 44
 拐枣 148
 拐枣七 104
 昙华 286
 杭子稍 129
 松叶草 212
 松节 27
 松藻 79
 板蓝根 107
 枸棘 42
 枕头草 107
 林兰 289
 林地铁线莲 95
 林荫银莲花 92
 果瓜 219
 果松 27
 枣皮 170
 枫杨 36
 枫杨叶 36
 枫柳 36
 欧李 124
 河北大黄 60
 河白草 55
 河岸银莲花 93
 河柳 35
 河朔堇花 158
 油松 27
 油葱 268
 法国菠菜 68
 波叶大黄 59
 泽兰 227
 泽漆 144
 泽蓼 54
 爬山虎 150
 爬墙虎 150
 狗牙根 250
 狗甘草 135
 狗尾巴花 52
 狗断肠 94
- 狗筋蔓 75
 直立百部 264
 知母 265
 笏仔 147
 线芥 191
 线麻子 44
 细叉梅花草 114
 细叶小檗 100
 细叶百合 271
 细叶红景天 111
 细叶沙参 227
 细叶远志 141
 细叶铁线莲 96
 细叶婆婆纳 204
 细叶落豆秧 133
 细叶藁本 167
 细辛 49
 细辛幌子 98
 细草 49
 绍菜 106
 罗布麻 180
 肥田草 133
 肥肉草 47
 肥猪草 262
 肾叶山蓼 61
 肾叶唐松草 85
 苘麻 152
 苦丁 105
 苦丁香 219
 苦大黄 59
 苦木 141
 苦瓜 221
 苦皮树 141
 苦杏仁 123
 苦苣 245
 苦苣菜 245
 苦识 127
 苦参 127
 苦枥 176
 苦泽 143
 苦胆木 141
 苦草 248
 苦荞麦 56
 苦荚菜 245
 苦蕒 197
 苦菜 244, 245
 苦菜根 222
 葶 22
 茄 200
 茄子 200
 茄根 200
 虎尾铁角蕨 18
 虎麻 113
- 败酱 214
 败酱草 214
 贯众 17, 19
 轮叶过路黄 174
 轮叶排草 174
 软枣子 102, 153
 软枣猕猴桃 153
 软骨石薯 48
 软紫菀 229
 郁李 123
 郁李仁 123, 124
 郁金香 269
 郎耶菜 232
 金牛草 16
 金丝草 16
 金瓜 222
 金刚豆藤 280
 金刚藤 281
 金灯藤 184
 金针 266
 金针菜叶 266
 金鸡脚 20
 金松 26
 金线吊葫芦 227
 金线草 60
 金苦荞 56
 金钗花 289
 金鱼藻 79
 金星草 21
 金茶匙 20
 金钟茵陈 206
 金梨 154
 金盏银台 282
 金莲花 81
 金钱松 26
 金梅草 81
 金猫儿 113
 金银花 213
 金雀儿 134
 金瓢羹 20
 闹羊花 201
 雨久花 263
 雨伞菜 237
 青木香 231
 青术 238
 青龙衣 36
 青枣 153
 青桐 153
 青麻 152
 青蒿 236
 鱼灯苏 89
 鱼串草 128
 鱼疗草 90

九画

剑叶凤尾蕨 15
 南山楂 115
 南五味子 102
 南方红豆杉 30
 南瓜 222
 南瓜子 222
 南沙参 224, 226
 南牡蒿 236
 南葶苈子 109
 厚朴 101
 姜黄 283
 威灵仙 95
 宣木瓜 116
 将离 81
 帝女花 234
 急解索 54
 扁竹蓼 52
 挖耳草 231
 斫合子 181
 星秀草 72
 枰柳 36
 枳 139
 枳壳 139
 枳实 139
 枳椇子 148
 枳椇 148
 枸杞 197
 枸橘 139
 枸橼 140
 柘实 42
 柘树 42
 柘桑 42
 柳叶 35
 柳杉 28
 柳杉皮 28
 柳树 35
 柳寄生 49
 柳蓼 54
 树麻黄 31
 歪头菜 133
 段报春 173
 洋地黄 202
 洋金花 201
 洋荷花 269
 洋葱 274
 洛阳花 80
 点地梅 172
 烂心草 190
 独一味 193
 独叶草 20, 49
 独角莲 258

独活 169
 独脚莲 259
 独滑 169
 独摇草 169
 狭叶红景天 111
 狭叶荨麻 45
 狭苞橐吾 239
 珊瑚苣苔 209
 珍珠草 72
 盾叶薯蓣 283
 禹州漏芦 242
 种田泡 120
 穿山龙 283
 穿心莲 86
 穿龙薯蓣 283
 穿肠草 44
 穿破石 42
 窃衣 166
 类叶牡丹 98
 绒花树 125
 结香 156
 绞股蓝 217
 美人蕉 286
 美豆 47
 美洲凌霄 207
 美洲商陆 67
 美草 135
 胡苍耳 135
 胡连 203
 胡枝子 129
 胡枝条 129
 胡桃 35
 胡桃肉 35
 胡桃楸 36
 胡黄连 203
 胡森堇菜 155
 胡葱 274
 茗葱 273
 茨菰 247
 茭白 250
 茴茴蒜 91
 茴香 166
 茴香苗 166
 茵陈 235
 茵陈蒿 235
 茶叶花 180
 茶叶树 177
 荆三棱 255
 荆条 188
 荆芥 191
 荆芥穗 191
 荆桃 124
 草三棱 255

草乌 87
 草贝 216
 草本女娄 96
 草本威灵仙 204
 草玉梅 92
 草石蚕 195
 草龙珠 149
 草红 242
 草豆 133
 草珠 252
 草菝葜 280
 草麻黄 31
 草瑞香 157
 草藤 133
 荚果蕨 18
 荚果蕨贯众 18
 荞麦叶贝母 271
 芥苳 224
 芥菜 107
 苎草 251
 荳蔻 52
 药瓜皮 220
 药用蜀葵 152
 药枣 170
 蚤休 277
 蚤缀 68
 贴梗海棠 116
 费菜 112
 重泽 143
 重楼 277
 钙果 124
 面根藤 185
 革命菜 246
 食用櫟木 163
 香丝草 236
 香丝菜 166
 香加皮 181
 香瓜 219
 香苏 102
 香附子 256
 香炉草 75
 香菇 196
 香荆芥 191
 香草 196
 香圆 140
 香橼 140
 香薷 196
 香薷 63
 鬼目 57
 鬼针草 233
 鬼虱 187
 鬼箭 146
 鬼箭羽 146

鸦葱 243
 十画
 圆叶牵牛 186
 圆葱 274
 党参 223
 冥楂 116
 凉瓜 221
 凌霄 207
 凌霄花 207
 壶卢 221
 夏无踪 84
 西瓜 218
 夏至草 190
 家榆 39
 宽叶苔草 257
 宽叶荨麻 45
 展枝沙参 225
 峨眉参 164
 峨眉贯众 17
 徐长卿 183
 拳蓼 53
 柴胡 164
 栗 38
 栗子 38
 栗肉 38
 核桃 35
 核桃仁 35
 核桃楸 36
 桃叶鸦葱 243
 桑白皮 41
 桑枝 41
 桑寄生 48, 49
 桑葚 41
 桔梗 222
 桦木皮 37
 桦皮树 37
 桦树 37
 梧桐 153
 梧桐子 153
 泰山何首乌 183
 流苏瓦松 110
 流苏树 177
 流星草 262
 浙玄参 203
 浮小麦 253
 浮萍 261
 浮薷 263
 海州常山 189
 海松子 27
 烈朴 101
 烟管花 50
 热河黄精 276

热河藁本 166
 狼头花 242
 狼尾巴花 204
 狼把草 232
 狼毒 157
 珠芽蓼 55
 皱叶酸模 58
 皱皮木瓜 116
 皱果苋 65
 盐蓬 64
 破子衣 166
 破故纸 130
 离草 81
 秦归 168
 秦皮 176
 秦艽 178
 秧李 123
 笔头草 13
 笔杆草 13
 粉丹皮 80
 粉条儿菜 280
 粉条菜 280
 粉草 135
 素馨 103
 翅果油 159
 翅果油树 159
 翅柄铁线蕨 16
 翅碱蓬 64
 胭脂花 173
 胶菜 106
 臭李子 125
 臭牡丹 188
 臭枫根 188
 臭青蒿 236
 臭梧桐 189, 206
 臭菜 106
 臭椿 140
 臭蒿 235
 臭橘 139
 荷 77
 荷包豆 136
 荷叶 77
 荷青花 104
 荻 249
 莎草 256
 莓子 119
 莢苣菜 62
 莢苣 198
 莲 77
 莲心 77
 莺桃 124
 袜子菜 48
 诸葛菜 109

- 起泡菜 90
透茎冷水花 47
透骨草 94, 133, 210
通经草 16
通草 97
酒花 43
酒饼草 236
酒壶花 202
铁丝草 98
铁扫帚 128
铁色箭 281
铁杆七 17
铁线草 250
铁脚鸡 15
铁筷子 82
铁篱笆 147
铃兰 274
铃铃香 229
铃铃香青 229
预知子 97
高山乌头 88
高山蓍 234
高乌头 86
高粱 251
高粱米 251
鸭舌草 262
鸭脚板 90, 91
鸭脚草 20
- ### 十一画
- 假贝母 216
假苏 191
假酸浆 197
偏头七 275
剪刀草 258
剪秋罗 73
勒马回 104
匏瓜 221
商陆 67
啤酒花 43
堇菜 155
婆婆丁 244
婆婆针 233
婪尾春 81
寄生子 49
密蒙花 178
崖棕 257
崩松 29
常山 192
常黄连 98
廊茵 54
悬钩子 119
- 掐不齐 130
排香草 191
接骨木 214
接骨草 215
接续草 13
断肠草 96, 105
旋复花 230
曼陀罗 201
杪楞树 146
梅花瓶 75
梓白皮 206
梓树 206
梭楞子 146
淡味当药 179
淫羊藿 99
牻牛儿苗 137
犁头尖 258
犁食 81
猕猴桃 154
猕猴桃梨 154
猪殃殃 212
猪鬃七 16
猫儿卵 150
猫儿眼草 144
猫耳朵 209
猫舌草 54
甜瓜 219
甜地丁 131
甜草 135
甜根子 135
甜格宿宿草 189
盘叶忍冬 213
盘龙参 288
粗榧 29
粗榧子 29
粘人裙 210
粘粘草 166
粘粘葵 232
续骨树 214
续断 215, 216
续随子 142
绵毛马兜铃 51
绵枣 272
绶草 288
绿苋 66
脱力草 74
菴竹 251
菊叶香藜 63
菊花 234
菊蒿 236
菰蓝 107
菝葜 281
菟丝子 184
- 蒺藜 63
蒺藜菜 63
蒺藜 63
菰 250
菰实 250
菰根 250
菱角 160
萍 261
萍子草 261
萍蓬子 79
萍蓬草 79
萝藦 181
萝藦子 181
蚰蜒草 234
蛆芽草 280
蛇不钻 54
蛇头草 257
蛇倒退 55
野丁香 177
野万年青 210
野大烟 104
野大黄 57
野山药 284
野升麻 83
野艾蒿 237
野芝麻 193
野花生 129
野芹菜 90
野苇子 249
野苋菜 65, 66
野鸡膀子 18
野油菜 108
野油麻 193
野苧麻 152
野茄子 199
野鳶尾 285
野牵牛 185
野秋海棠 156
野苘蒿 246
野草莓 121
野荞麦 56
野桑 41
野桑椹 91
野粉团花 228
野菊 235
野菊花 230
野菜升麻 83
野菠菜 58
野麻 46
野葛 132
野葡萄 199
野葵 151
野慈姑 248
- 野蒙花 156
野漆 144
野漆树 144
野罌粟 104
野蓼 60
野櫻桃 158
野豌豆 133
野薄荷 194
野薯蕷 284
野藟香 191
铜丝草 16
铜锤草 233
银老梅 122
银花 213
银线草 34
银柴胡 71
银粉背蕨 16
银露梅 122
鹿子草 215
鹿安茶 171
鹿含草 171
鹿药 275
鹿根 275
鹿铃 274
鹿葱 266
鹿蹄草 171
麻子仁 44
麻仁 44
麻叶荨麻 46
麻布七 86
麻布芪 86
麻柳树 36
麻栎 39
麻桐树 160
麻黄 31
麻黄草 31
黄三七 82
黄凤仙 147
黄开口 174
黄木香 51
黄丝 184
黄瓜香 18, 117
黄瓜菜 62
黄米花 212
黄芩 190
黄芪 131
黄花 234
黄花乌头 87
黄花石蒜 281
黄花龙牙 214
黄花列当 208
黄花条 176
黄花铁线莲 94
- 黄花菜 266
黄连 84
黄饭花 178
黄金树 206
黄金茶 190
黄度梅 118
黄柏 139
黄栌 145
黄荆 188
黄堇花 158
黄须菜 64
黄莲 84
黄梅花 103
黄菠萝 139
黄精 276, 277
黄蓍菜 64
黄檗 139
黄藤子 184
- ### 十二画
- 喇叭花 186
喉咙草 172
寒瓜 218
寒食菜 230
御米 103
戟叶牛皮消 183
掌叶大黄 59
掌叶小檗 100
掌叶半夏 259
斑叶蓼 56
斑点百合 270
普通凤丫蕨 17
景天 111
景天三七 112
朝鲜乌头 88
朝鲜黄连 98
棉团铁线莲 95
棉花团 95
棋盘花 151, 152
棍茶 76
棒松 29
棒草 135
棒槌 163
棘皮桦 37
棣棠 118
榔榆 40
款冬 237
款冬花 237
渥丹 270
游冬 245
猴耳草 51
猴板栗 146
番红花 284

番杏 68
短毛金线草 60
短毛独活 169
短叶松 27
短尾铁线莲 95
短梗五加 162
硬毛棘豆 134
硬蒺藜 137
童参 70
策敦木 31
紫丹 186
紫玉兰 101
紫地丁 136
紫杉 30
紫沙参 225
紫花地丁 105, 131, 155
紫参 53
紫背金牛草 171
紫草 186
紫菀 229
紫萍 261
紫藻 23
紫霞楼斗 85
舒筋树 214
萱草根 267
篇蓄 52
落叶松皮 26
落花生 132
落苏 200
落帚 64
落翹 176
落新妇 113
律草 44
葛 132
葛枣 154
葛根 132
葛缕子 167
葛藤 132
蓼芝 42
葵菜 151
蛤蟆草 121
裂皮榆 40
酥卵 247
铺地草 250
锁阳 161
锁严子 161
锁眉草 13
锈铁棒 161
铎草 12
阔叶麦冬 279
雁来红 66
雄虎刺 147

鹅儿肠 70
鹅耳七 74
鹅肠菜 70
鹅绒委陵菜 122
鹅掌金星草 20
鹅掌草 92
黑丑 186
黑毛七 82
黑枣 175
黑牵夷 81
黑柴胡 165
黑桦 37
黑弹朴 40

十三画

慈姑 247
新蒙花 156
新疆圆柏 28
楔楂 115
榲桲 115
榆 39
榆树皮 39
榆钱 39
槐叶苹 23
槐花 127
槐树 127
槐蓝 128
溪洞碗蕨 14
满江红 23
照山白 171
瑞香狼毒 157
睡莲 78
睡菜 180
矮瓜 200
稠李 125
稠李叶 125
窟窿牙根 83
蒙古苍耳 232
蒙自黎芦 265
蒙桑 41
蒜瓣子草 265
茺蔚 257
蒲公英 244
蒲桃 149
蒲黄 247
蒲棒 247
蒺骨子 137
蒺藜 137
蓝花菜 263
蓝荆子 172
蓝靛 128
蓬子菜 212
虞蓼 54

蛾眉蕨 17
蜈蚣三七 92
蜈蚣柳 36
蜈蚣萍 23
蜈蚣旗 19
锦灯笼 199
锦荔枝 221
锯齿草 234
锯锯藤 212
雉隐天冬 278
零陵香 229
雷竹 255
雷骨散 237
雾灵景天 110
鼠耳草 71, 230
鼠李 149
鼠粘子 239
鼠麴草 230

十四画及以上

墙草 48
截叶铁扫帚 128
榛 38
榛子 38
漆姑草 72
漆树 144
漏芦 242
熊胆树 141
獐牙菜 179
獐耳细辛 93
碱蓬 64
算盘七 53
粽子菜 107
罌粟 103
翠云草 12
翠雀 89
膜荚黄芪 131
蓼萍 248
焯菜 108
蒿 54
蒿虞 54
蜀季花 151
蜀葵 151
蜀黍 251
蜜甘 135
蜜草 135
蜡烛 247
蜡梅 103
蜡梅花 103
蝇子草 74
蝇毒草 210
辣子 201
辣子草 233

辣米菜 108
辣角 201
辣椒 201
辣蓼草 54
酸叶 205
酸枣 148
酸枣仁 148
酸胖 138
酸浆 199
酸浆菜 61
酸溜溜 58
酸模 58
酸模叶蓼 56
鲜黄连 98
播娘蒿 109
槲寄生 49
栲 140
栲树子 140
樱桃 124
樱桃仁 124
樱桃叶 124
橡子 39
橡果 39
缬草 215
蕃荷菜 194
蕨 14
蕨菜 14
蕨麻 122
蝎子草 46, 47
蝙蝠葛 100
蝴蝶菊 89
醉心花 201
醉草 180
鹤虱 187
黎芦 265
橐吾 239
燕子树 36
燕尾草 247, 248
瓢瓜 221
磨盘七 275
糙苏 192
落草 135
惹米 252
惹苡 252
惹苡仁 252
薤白 273
蜆菜 180
爵床 210
爵梅 123
簇生卷耳 71
繁缕 72
藁本 166
藏红花 284

螫麻 45
螫麻子 45, 46
螺丝三七 53
蟋蟀草 253
蟑螂花 282
霜桑叶 41
癩瓜 221
癩葡萄 221
瞿麦 76
翻白草 121
翻白繁缕 72
藕节 77
覆盆子 119, 120
瓣蕊唐松草 85
藿香 191

拉丁名索引

A

Abutilon theophrasti Medic. 苘麻 152
Acanthopanax senticosus (Rupr. et Maxim.) Harms 刺五加 162
Acanthopanax sessiliflorus (Rupr. et Maxim.) Seem 无梗五加 162
Achillea alpina L. 高山蓍 234
Aconitum coreanum (Levl.) Rapaics 黄花乌头 87
Aconitum jeholense Nakai et Kitag. 华北乌头 88
Aconitum kusnezoffii Reichb. 北乌头 87
Aconitum monanthum Nakai 高山乌头 88
Aconitum sinomontanum Nakai 高乌头 86
Actinidia arguta (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Miq. 软枣猕猴桃 153
Actinidia chinensis Planch. 猕猴桃 154
Actinidia polygama (Sieb. Et Zucc.) Miq. 木天蓼 154
Adenophora divaricata Franch. et Sav 展枝沙参 225
Adenophora paniculata Nannf. 紫沙参 225
Adenophora polyantha Nakai 石沙参 224
Adenophora trachelioides Maxim. 荠苎 224
Adenophora wawreana Zahlbr. 多歧沙参 226
Adiantum capillus-junonis Rupr. 团羽铁线蕨 16
Adonis amurensis (Amur adonis) 侧金盏花 91
Aeschynomene indica L. 合萌 126
Aesculus chinensis Bunge 七叶树 146
Agastacherugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze. 藿香 191
Ailanthus altissima (Mill) Swingle 臭椿 140
Ajuga lupulina Maxim. 白苞筋骨草 189
Akebia quinata (Thunb.) Decne. 木通 97
Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. 三叶木通 97
Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms 瓜木 160
Albizia julibrissin Durazz. 合欢 125
Aletris spicata (Thunb.) Franch 粉条儿菜 280
Aleuritopteris argentea (Gmel.) Fee 银粉背蕨 16
Allium cepa L. 洋葱 274
Allium macrostemon Bge 小根蒜 273
Allium victorialis L. 薅葱 273
Aloe baradersis Mill. 芦荟 268
Althaea officinalis L. 药用蜀葵 152
Althaea rosea (L.) Cavan. 蜀葵 151
Amaranthus ascendens Loisel 凹头苋 66
Amaranthus caudatus L. 尾穗苋 67
Amaranthus retroflexus L. 反枝苋 65
Amaranthus tricolor L. 苋 66
Amaranthus viridis L. 皱果苋 65
Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv 山葡萄 149
Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino 白蔹 150

Anaphalis hancockii Maxim 铃铃香青 229
Androsace umbellate (Lour.) Merr. 点地梅 172
Anemarrhena asphodeloides Bunge 知母 265
Anemone dichotoma L. 草玉梅 92
Anemone flaccida Fr. Schmidt 林荫银莲花 92
Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC. var. *flore-minore* Maxim 小花草玉梅 93
Angelica dahurica Benth. et Hook 当归 168
Angelica sinensis (Oliv.) Diels 白芷 168
Anorphophallus sinensis Belval 蛇头草 257
Antenoron neofiliforme (Nakai) Hara 短毛金线草 60
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 峨参 164
Apocynum venetum L. 罗布麻 180
Aquilegia yabeana Kitag. 华北楼斗菜 85
Arachis hypogaea L. 落花生 132
Aralia cordata Thunb 土当归 163
Aralia fargesii Franch 独活 169
Arctium lappa L. 牛蒡 239
Arenaria juncea M.Bieb. 灯心草蚤缀 69
Arenaria serpyllifolia L. 蚤缀 68
Arisaema amurense Maxim. 东北南星 259
Arisaema erubescens (Wall.) Schott. 天南星 260
Aristolochia contorta Bunge. 北马兜铃 50
Aristolochia manshuriensis Kom. 木通马兜铃 51
Aristolochia mollissima Hance. 绵毛马兜铃 51
Artemisia apiacea Hance 青蒿 236
Artemisia capillaries Thunb. 茵陈蒿 235
Artemisia eriopoda Bunge 南牡蒿 236
Artemisia lavandulaefolia DC. 野艾蒿 237
Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino 苎草 251
Asarum forbesii Maxim. 杜衡 50
Asarum sieboldii Miq. 细辛 49
Asparagus schoberioides kunth. 龙须菜 278
Asparagus trichophyllus Bunge 曲枝天门冬 279
Asplenium incisum Thunb. 虎尾铁角蕨 18
Aster tataricus L. 紫菀 229
Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et Sav. 落新妇 113
Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge 膜荚黄芪 131
Atractylodes chinensis (DC.) koidz 北苍术 238
Atractylodes macrocephala Koidz 白术 238
Azolla imbricata (Roxb.) Nakai. 满江红 23

B

Begonia grandis Dry. subsp. *sinensis* (A. DC.) Irmsch. 中华秋海棠 156
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 冬瓜 219
Berberis poiretii Schneid. 细叶小檗 100
Berberis thunbergii DC. 日本小檗 99
Beta vulgaris L. var. *cicla* L. 莕菜 62
Betula dahurica Pall. 棘皮桦 37

Betula platyphylla Suk. 白桦 37
Bhodotypos scandens (Thunb.) Mak. 鸡麻 118
Bidens bipinnata L. 鬼针草 233
Bidens tripartita L. 狼把草 232
Bletilla striata (Thunb.) Reicheb. f. 白芨 287
Boea hygrometrica (Bunge) R. Brown 牛耳草 209
Boehmeria longispica Steud. 大叶苎麻 46
Bolbostemma paniculatum (Maxim.) Franquet 假贝母 216
Brassica pekinensis L. 大白菜 106
Buddleja officinalis Maxim. 密蒙花 178
Bupleurum chinense DC. 北柴胡 164
Bupleurum smithii Wolff. 黑柴胡 165

C

Calystegia hederacea Wall. 打碗花 185
Campsis radicans (L.) Seem. 凌霄 207
Cannabis sativa L. 大麻 44
Canna generalis L. 美人蕉 286
Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. 荠菜 107
Capsicum frutescens L. 辣椒 201
Caragana arborescens (Amm.) Lam 杭子梢 129
Caragana rosea Turcz. 红花锦鸡儿 134
Cardiocrinum giganteum (Wall.) Makino 大百合 271
Carex siderosticta Hance 宽叶苔草 257
Carpesium abrotanoides L. 天名精 231
Carthamus tinctorius L. 红花 242
Carum carvi L. f. *carvi* 葛缕子 167
Castanea mollissima Blume 栗 38
Catalpa ovata G. Don 梓树 206
Caulophyllum robustum Maxim. 类叶牡丹 98
Celtis bungeana Maxim. 小叶朴 40
Cephalanoplos segetum (Bunge) Kitam 小薊 240
Cephalanoplos setosum (Willd.) Kitam. 大刺菜 240
Cephalotaxus fortunei Hook 三尖杉 29
Cerastium caespitosum Gilib. 簇生卷耳 71
Ceratophyllum demersum L. 金鱼藻 79
Cercidiphyllum japonicum Sieb. Et Zucc. 连香树 80
Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne 木瓜 116
Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai 皱皮木瓜 116
Chelidonium majus L. 白屈菜 105
Chenopodium foetidum Schrad. 菊叶香藜 63
Chenopodium glaucum L. 灰绿藜 62
Chimonanthus praecox (L.) Link 蜡梅 103
Chionanthus retusa Lindl et Paxt 流苏树 177
Chloranthus japonicus Sieb 银线草 34
Chrysanthemum morifolium Ramat. 菊花 234
Chrysanthemum seticuspe (Maxim.) Hand.-Mazz. 甘野菊 235
Cimicifuga goetida L. 升麻 83
Cimicifuga simplex Wormsk. 单穗升麻 83
Cistanche deserticola Y. C. Ma 肉苁蓉 208
Citrullus lanatus L. 西瓜 218
Citrus medica L. 香橼 140
Clematis aethusifolia Turcz. var. *latisecta* Maxim 芹叶铁线莲 96

Clematis brevicaudata DC. 短尾铁线莲 95
Clematis heracleifolia DC. 大叶铁线莲 96
Clematis hexapetala Pall. 棉团铁线莲 95
Clematis intricate Bunge. 黄花铁线莲 94
Cleome gynandra L. 白花菜 106
Clerodendrum bungei Sterd 臭牡丹 188
Clerodendrum trichotomum Thunb. 海州常山 189
Codonopsis lanceolata Benth. et Hook. 羊乳 223
Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf 党参 223
Coix lacrymajobi L. var. *mayuen* (Roman) 薏苡 252
Common Carpesium Fruit 鹤虱 187
Coniogramme intermedia Hieron 普通凤丫蕨 17
Convallaria majalis L. 铃兰 274
Convolvulus arvensis L. 田旋花 185
Coptis chinensis Franch. 黄连 84
Corallo-discus cordatulus (Craib.) Burt. 珊瑚苣苔 209
Cornus officinalis Sieb. et Zucc. 山茱萸 170
Corydalis ambigua Cham. et Schlecht. var. *amurensis* Maxim. 东北延胡索 105
Corydalis bungeana Turcz. 地丁草 105
Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv. 榛 38
Cotinus coggyria Scop. 黄栌 145
Crataegus cuneata Sieb. Et Zucc. 山楂 115
Crocus sativus L. 番红花 284
Cryptomeria fortunei Hooibrenk ex Otto et Dietr. 柳杉 28
Cucubalus baccifer L. 狗筋蔓 75
Cucumis melo L. 香瓜 219
Cucurbita moschata (Duch.) poiret 南瓜 222
Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masam. 柘树 42
Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur. 构棘 42
Cuscuta chinensis Lam 菟丝子 184
Cuscuta japonica Choisy 金灯藤 184
Cydonia oblonga Mill 榲桲 115
Cynanchum atratum Bge. 白薇 182
Cynanchum auriculatum Royle ex Wight 牛皮消 182
Cynanchum bungei Decne 白首乌 183
Cynanchum paniculatum (Bge.) Kitag. 徐长卿 183
Cynodon dactylon L. 狗牙根 250
Cynomorium songaricum Rupr. 锁阳 161
Cyperus rotundus L. 香附子 256
Cyrtomium falcatum (L. f.) Presl 全缘贯众 19

D

Datura Stramonium Datura L. 曼陀罗 201
Delphinium anthriscifolium Hance 还亮草 89
Delphinium grandiflorum L. 翠雀 89
Dendrobium nobile Lindl 石斛 289
Dennstaedtia wilfordii (Moore) Christ 溪洞碗蕨 14
Descurainia Sophia (L.) Webb. ex Prantl 播娘蒿 109
Digitalis Purpurea L. 洋地黄 202
Dianthus superbus L. 瞿麦 76
Diarthron linifolium Turcz. 草瑞香 157
Dicranostigma leptopodum (Maxim.) Fedde. 秃疮花 104

Dictamnus dasycarpus Turcz. 白鲜 139
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 马唐 254
Dioscorea japonica L. 野薯蓣 284
Dioscorea nipponica Makino 穿山龙 283
Dioscorea zingiberensis C. H. Wright 盾叶薯蓣 283
Diospyros lotus L. 黑枣 175
Dipsacus asperoides C. Y. Cheng et T. M. Ai 续断 215
Dipsacus japonicus Miq. 日本续断 216
Doellingeria scaber (Thunb.) Nees 东风菜 228
Dolomiaea souliei (Franch.) Shih 川木香 241
Dracocephalum rupestre Hance 岩青兰 196

E

Echinochloa colonum (L.) Link. 光头稗子 254
Edgeworthia chrysantha Lindl. 结香 156
Eichhornia crassipes Solms 凤眼莲 263
Elaeagnus mollis Diels 翅果油树 159
Elaeagnus multiflora Thunb. 木半夏 158
Eleocharis valleculosa Ohwi f. *setosa* (Ohwi) Kitagawa
 刚毛荸荠 256
Eleusine indica (L.) Gaertn. 蟋蟀草 253
Ephedra equisetina Bge. 木贼麻黄 31
Ephedra sinica (Chinese joint fir) 草麻黄 31
Epimedium brevicornum Maxim. 淫羊藿 99
Equisetum ramosissimum Desf. 节节草 13
Equisetum arvense L. 问荆 13
Equisetum hiemale L. 木贼 12
Eriocaulon buergerianum Koern. 谷精草 262
Erodium stephanianum Willd. 牻牛儿苗 137
Euonymus alatus (Thunb.) Sieb. 卫矛 146
Euonymus japonicus Thunb. 冬青卫矛 145
Eupatorium japonicum Thunb. 泽兰 227
Eupatorium lindleyanum DC. 白鼓钉 228
Euphorbia helioscopia L. 泽漆 144
Euphorbia humifusa Willd. 地锦草 142
Euphorbia kansui T. N. Liou ex T. P. Wang 甘遂 143
Euphorbia lathyris L. 续随子 142
Euphorbia pekinensis Rupe. 大戟 143
Euryale ferox Salisb. 芡实 78

F

Fagopyrum cymosum (Trev.) Meisn. 苦荞麦 56
Ficus carica L. 无花果 43
Firmiana platanifolia (L. f.) Marsili 梧桐 153
Foeniculum Vulgare Mill 茴香 166
Forsythia suspense (Thunb.) Vahl 连翘 176
Fragaria orientalis Losina-Losinsk. 东方草莓 121
Fraxinus sogdiana Bunge. 小叶白蜡 176
Fritillaria cirrhosa D. Don 川贝母 272

G

Galinsoga parviflora Cav. 辣子草 233
Galium aparine L. var. *tenerum* (Gren. et Godr.) Reichb
 猪殃殃 212
Galium verum L. var. *asiaticum* Nakai 蓬子菜 212
Gastrodia elata Bl. 天麻 287

Gentianamacrophylla Pall. 秦艽 178
Gerbera piloselloides (L.) Cass 毛大丁草 241
Girardinia suborbiculata C. J. Chen 蝎子草 47
Glechoma biondiana (Diels) C. Y. Wu et C. Chen 白透骨
 消 192
Gleditsia sinensis Lam. 皂荚 126
Glycyrrhiza pallidiflora Maxim. 刺果甘草 135
Glycyrrhiza Uralensis Fisch. G. *Glabra* L. 甘草 135
Gnaphalium affine D. Don 鼠麴草 230
Gueldenstaedtia verna (Georgi) Boiss. 米口袋 131
Gymnadenia conopsea R. Brown 手参 288
Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Mak. 绞股蓝 217
Gynuracrepidoides Benth 三七草 246

H

Helleborus thibetanus Franch. 铁筷子 82
Hemerocallis Citrina Baroni 黄花菜 266
Hemerocallis lilioasphodelus L. 北黄花菜 266
Hemerocallis middendorffii Trautv. et May. 大花萱草
 267
Hemerocallis minor Mill. 小萱草 266
Hepatica nobilis var. *asiatica* 獐耳细辛 93
Heracleum moellendorffii Hance 短毛独活 169
Herba Humuli Scandentis 葎草 44
Herminium monorchis (L.) R. Brown 角盘兰 289
Hosta plantaginea Aschers. 玉簪 267
Hovenia acerba Lindl. 拐枣 148
Humulus lupulus L. 啤酒花 43
Hylomecon japonica (Thunb.) Prantl et Kundig 荷青花
 104
Hyoscyamus bohemicus F. W. Schmidt 小莨菪 198
Hyoscyamus niger L. 天仙子 198

I

Illicium henryi Diels. 红茴香 102
Impatiens noli-tangere L. 水金凤 147
Incarvillea younghusbandii Sprague 角蒿 207
Indigofera tinctoria L. 木蓝 128
Inula Britannica L. 旋复花 230
Inula helenium L. 土木香 231
Iris dichotoma Pall 野鸢尾 285
Iris pallasii Fisch. var. *chinensis* Fisch. 马蔺 285
Isatis indigotica Fortune. 菘蓝 107
Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai 山苦英 244
Ixeris denticulate (Houtt.) Stebb 苦英菜 245

J

Jeffersonia dubia (Maxim.) Benth. Et Hook. f 鲜黄连 98
Juglans mandshurica Maxim 胡桃楸 36
Juglans regia L. 胡桃 35
Juniperus formosana Hayata 刺柏 29
Juniperus rigida Sieb et Zucc 杜松 29

K

Kalimeris integrifolia Turcz. 全缘马兰 228
Kerria japonica (L.) DC. 棣棠 118

Kochia scoparia (L.) Schrad. 地肤 64
Kummerowia striata (Thunb.) Schindl. 鸡眼草 130

L

Lagenaria siceraria (Molina) Standl. var. *depressa* (Ser.) Hara 瓢瓜 221
Lagopsis supine (Steph.) IK.-Gal. ex knoor 夏至草 190
Lamioophlomis rotata (Benth.) Kudo. 独一味 193
Lamium barbatum Sieb. et Zucc. 野芝麻 193
Larix principis-rupprechtii Mayr 华北落叶松 26
Lathyrus quinquenervius (Miq.) Litv. ex Kom. et Alis. 五脉山黧豆 136
Lemna minor L. 浮萍 261
Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching 瓦韦 21
Lepisorus ussuriensis (Regel et Maack) Ching 乌苏里瓦韦 21
Lespedeza bicolor Turcz 胡枝子 129
Lespedeza cuneata (Dum-Cours.) G. Don 截叶铁扫帚 128
Ligularia intermedia Nakai 狭苞橐吾 239
Ligusticum jeholense Nakai et Kitag. 辽藁本 166
Ligusticum tenuissimum (Nakai) Kitaga. 细叶藁本 167
Lilium brownie F. E. Brown var. *viridulum* 兰州百合 269
Lilium concolor Salisb. var. *pulchellum* (Fisch.) Regel 有斑百合 270
Lilium lancifolium Thunb. 卷丹 270
Lilium pumilum DC. 山丹 271
Limonium bicolor (Bge.) o. Ktze 二色补血草 175
Liriope platyphylla Wang et Tang 麦冬 279
Lithospermum erythrorhizon Sieb. et Zucc. 紫草 186
Lobelia sessilifolia Lamb. 山梗菜 226
Lonicera japonica Thunb. 金银花 213
Lonicera tragophylla Hemsl 盘叶忍冬 213
Loranthus tanakae Franch. et Sav. 北桑寄生 48
Luffa cylindrical (L.) Roem. 丝瓜 218
Lunathyrium acrostichoides (Sw.) Ching 蛾眉蕨 17
Lychnis cognata Maxim. 剪秋罗 73
Lychnis fulgens Maxim. 大花剪秋罗 73
Lycium barbarum L. 宁夏枸杞 197
Lycoris aurea (L'Her.) Herb 忽地笑 281
Lycoris radiata (L. Herit.) Herb 石蒜 282
Lysimachia christinae Hance 过路黄 174
Lysimachia trientaloides Hemsl. 轮叶排草 174
Lythrum salicaria L. 千屈菜 159

M

Magnolia liliflora Desr. 辛夷 101
Magnolia officinalis Rehd. Et Wils. 厚朴 101
Malachium aquaticum (L.) Fries. 牛繁缕 70
Malva verticillata L. 野葵 151
Marsilea quadrifolia L. 苹 22
Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro 荚果蕨 18
Menispermum dauricum DC. 蝙蝠葛 100
Metaplexis japonica (Thunb.) Makino 萝藦 181
Mimulus tenellus Bunge 沟酸浆 205

Miscanthus sacchariflorus (Maxim) Benth et Hook f 荻 249
Mneyanthes trifoliata L. 睡菜 180
Momordica charantiap L. 苦瓜 221
Monarda citriodora Arij 野薄荷 194
Monochoria korsakowii Regel et Maack 雨久花 263
Monochoria vaginalis (Burm. f.) Presl ex Kunth 鸭舌草 262
Morus mongolica Schneid. 蒙桑 41
Mosla chinensis Maxim. 石香薷 196

N

Narcissus tazetta var. *chinensis* Roem. 水仙 282
Nasturtium officinale R. Br. 豆瓣菜 108
Nelumbo nucifera L. 莲 77
Nicandra physaoides (L.) Gaertn. 假酸浆 197
Nitraria tangutorum Bobr. 白刺 138
Nuphar pumilum (Timm.) DC. 萍蓬草 79
Nymphaea tetragona George. 睡莲 78

O

Oenothera biennis L. High 月见草 161
Origanum vulgare L. 牛至 194
Orobancha pycnostachya 黄花列当 208
Orostachys fimbriatus (Turcz.) Berg. 瓦松 110
Orychophragmus violaceus (L.) O. E. Schulz 二月兰 109
Oxyria digyna (L.) Hill 肾叶山蓼 61
Oxyria sinensis Hemsl. 中华山蓼 61
Oxytropis hirta Bunge 硬毛棘豆 134

P

Paeonia Lactiflora (P. albiflora) 芍药 81
Paeonia suffruticosa Sndr 牡丹 80
Paliurus ramosissimus (Lour.) Poir 马甲子 147
Panax ginseng C. A. Mey. 人参 163
Papaver nudicaule L. subsp. 野罂粟 104
Papaver somniferum L. 罂粟 103
Parietaria micrantha Ledeb. 墙草 48
Paris verticillata M.-Bieb. 北重楼 277
Parnassia oveophila Hance. 细叉梅花草 114
Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch. 爬山虎 150
Patrinia scabiosaefolia Fisch. 败酱 214
Pedicularis resupinala L. 反顾马先蒿 205
Periploca sepium Bunge. 杠柳 181
Peucedanum terebinthaceum (Fisch.) Fisch. ex Turcz. var. *terebinthaceum* 石防风 170
Pharbitis purpurea Voigt 圆叶牵牛 186
phaseolus coccineus L. P. multiflorus willd 红花菜豆 136
Phellodendron amurense Rupr. 黄檗 139
Phlomis umbrosa Turcz. 糙苏 192
Phragmites communis Trin 芦苇 249
Phryma leptostachya L. 透骨草 210
Phyllostachys propinqua Mc Clure 早园竹 255

Phymatopsis hastate (Thunb.) Kitag 金鸡脚 20
Physalis alkekengi L. var. *franehtii* (Mast.) Mak. 酸浆 199
Phytolacca Americana L. 垂序商陆 67
Picrasma quassioides (D. Don) Benn. 苦木 141
Picris Japonica Thunb. 毛连菜 246
Picrorhiza scrophulariiflora Pennell 胡黄连 203
Pilea mongolica Wedd. 透茎冷水花 47
Pinelliape datisecta Schott 掌叶半夏 259
Pinellia tetnata (Thb.) Breit. 半夏 258
Pinus koraiensis Sieb. et Zucc 红松 27
Pinus tabulaeformis Carr. 油松 27
Pistia stratiotes L. 大藻 260
Plantago depressa Willd. 平车前 211
Plantago major L. 大车前 211
Platanthera chlorantha Cust. ex Rchb 二叶舌唇兰 286
Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC. 桔梗 222
Polygala tenuifolia Willd. 远志 141
Polygonatum humile (Mill.) Druce 小玉竹 276
Polygonatum macropodium Turcz. 热河黄精 276
Polygonatum sibiricum Red 黄精 277
Polygonum aviculare L. 蒺藜 52
Polygonum Bistorta L. 拳蓼 53
Polygonum hydropiper L. 水蓼 54
Polygonum lapathifolium L. 酸模叶蓼 56
Polygonum orientale L. 红蓼 52
Polygonum perfoliatum L. 杠板归 55
Polygonum senticosum (Meisn.) Franch. et Sav. 刺蓼 54
Polygonum suffultum Maxim. 支柱蓼 53
Polygonum viviparum L. 珠芽蓼 55
Poncirus trifoliata (L.) Raf. 枸橘 139
Populus davidiana Dode 山杨 34
Potentilla anserine L. 鹅绒委陵菜 122
Potentilla chinensis Ser. 委陵菜 121
Potentilla glabra Lodd. 银露梅 122
Primula maximowiczii Regel 胭脂花 173
Prunus humilis Bunge 欧李 124
Prunus japonica Thunb 郁李 123
Prunus padus L. 稠李 125
Prunus pseudocerasus Lindl. 樱桃 124
Prunus sibirica L. 西伯利亚杏 123
Pseudolarix amabilis (Nelson) Rehd 金钱松 26
Pseudostellaria heterantha (Maxim.) Pax. 异花假繁缕 69
Pseudostellaria heterophylla (Miq) Pax ex Pax et Hoffm 异叶假繁缕 70
Psoralea corylifolia L. 补骨脂 130
Pteria multifida Poir 井栏边草 15
Pteridium aquilinum var. *latiusculum*. 蕨 14
Pteris ensiformis Burm. 剑叶凤尾蕨 15
Pterocarya stenoptera C. DC. 枫杨 36
Pueraria lobata (Willd.) Ohwi 野葛 132
Pulsatilla chinensis (Bunge) Regel. 白头翁 94
Pyrola rotundifolia ssp. *chinensis* 鹿蹄草 171
Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching 有柄石韦 20

Q

Quercus acutissima Carr 麻栎 39

R

Ranunculus chinensis Bunge 茴茴蒜 91
Ranunculus japonicus Thunb. 毛茛 90
Ranunculus sceleratus L. 石龙芮 90
Rehmannia glutinosa Libosch. 地黄 202
Rhamnus davulrica Pall 鼠李 149
Rhaponticum uniflorum (L.) DC. 祁州漏芦 242
Rheum franzenbachii Munt. 河北大黄 60
Rheum palmatum L. 大黄 59
Rheum undulatum L. 波叶大黄 59
Rhodiola dumulosa (Franch.) S. H. Fu 小丛红景天 110
Rhodiola kirilowii (Regel) Maxim 狭叶红景天 111
Rhododendron mucronulatum Turcz. 迎红杜鹃 172
Rhodoendron micranthum Turcz. 照山白 171
Ribes burejense Fr. Schmidt. 刺果茶藨子 114
Rorippa Montana (Wall.) Small 蔊菜 108
Rose davurica Pall. 山刺玫 117
Rostellularia procumbens (L.) Nees 爵床 210
Rubus chingii Hu 覆盆子 120
Rubus idaeus L. var. *borealisinensis* Yü et Lu 华北覆盆子 120
Rubus kanayamensis Levl. et Vant. 山楂叶悬钩子 119
Rubus saxatilis L. 石生悬钩子 119
Rumex acetosa L. 酸模 58
Rumex crispus L. 皱叶酸模 58
Rumex japonicus Houtt. 羊蹄 57
Rumex nepalensis Spreng. 尼泊尔酸模 57

S

Sabina vulgaris Ant. 沙地柏 28
Sagina japonica (Sweet) Ohwi 漆姑草 72
Sagittaria sagittifolia L. 慈姑 247
Sagittaria trifolia L. 野慈姑 248
Salix matsudana Koidz. 旱柳 35
Salvia miltiorrhiza Bge. 丹参 193
Salvinia natans (L.) All. 槐叶萍 23
Sambucus williamsii Hance. 接骨木 214
Sanguisorba officinalis L. 地榆 117
Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk. 防风 165
Saruma henryi Oliv 马蹄香 50
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. 北五味子 102
Schisandra sphenanthera Rehd. Et Wits. 华中五味子 102
Schizonepeta tenuifolia (Benth.) Briq. 荆芥 191
Scilla sinensis (Lour.) Merr. 绵枣 272
Scirpus fluviatilis (Torr.) 荆三棱 255
Scorzonera glabra Rupr. 鸦葱 243
Scorzonera sinensis Lipsch. et krasch 桃叶鸦葱 243
Scrophularia ningpoensis Hemsl. 玄参 203
Scutellariabaicalensis Georgi 黄芩 190
Sedum aizoon L. 景天三七 112
Sedum lineare Thunb. 佛甲草 113

Sedum spectabile Boreau 景天 111
Sedum tatarinowii Maxim 华北景天 112
Selaginella sinensis (Desv.) Spring 中华卷柏 12
Semiaguilegia adoxoides (DC.) Makino 天葵 84
Silene conoidea L. 麦瓶草 75
Silene fortunei Vis. 蝇子草 74
Silene jensseensis Willd. 旱麦瓶草 76
Silene tatarinowii Regel 石生蝇子草 74
Siphonostegia chinensis Benth. 阴行草 206
Smilacina dahurica Turz ex Fisch. Et Meyer 兴安鹿药 275
Smilacina japonica A. Gray 鹿药 275
Smilax riparia DC. 牛尾菜 280
Smilax sieboldii Miq. 华东菝葜 281
Solanum lyratum Thunb. 白英 200
Solanum melongena L. 茄 200
Solanum nigrum L. 龙葵 199
Sonchus oleraceus L. 苦苣菜 245
Sophora flavescens Ait. 苦参 127
Sophora japonica L. 槐树 127
Sorghum vulgare Pers. 高粱 251
Souliea vaginata (Maxim.) franch 长果升麻 82
Spinacia oleracea Mill. 菠菜 63
Spiranthes australis (R. Brown.) Lindl. 绶草 288
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid 紫萍 261
Stachys sieboldi Miq. 甘露子 195
Stellaria dichotoma L. 叉歧繁缕 71
Stellaria discolor Turcz. 异色繁缕 72
Stellera chamaejasma L. 瑞香狼毒 157
Stemona sessilifolia (Miq.) Miq 百部 264
Suaeda heteroptera Kitag. 翅碱蓬 64
Swertia diluta (Turcz.) Benth. et Hook. F. 当药 179
Swertia erythrosticta Maxim. 红直当药 179
Syneilesis aconitifolia (Bunge) Maxim. 兔儿伞 237
Syringa villosa Vahl. 红丁香 177

T

Taraxacum officinale L. 蒲公英 244
Taxus cuspidate sieb eb zucc 东北红豆杉 30
Taxus mairei S. Y. Hu 紫杉 30
Tetragonia expansa Murr 番杏 68
Thalictrum baicalense Turcz. 贝加尔唐松草 86
Thalictrum petaloideum L. 瓣蕊唐松草 85
Thladiantha dubia Bunge. 赤雹 217
Thymus mongolicus Ronn 百里香 195
Tofieldia coccinea Richards. 直立百部 264
Torilis japonica (Houtt.) DC. 窃衣 166
Toxicodendron succedaneum (L.) O. Kuntze 野漆树 144
Trapa bicornis Osbeck 菱角 160
Tribulus terrestris L. 蒺藜 137
Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim 王瓜 220
Trientalis europaea L. 七瓣莲 173
Trigonotis peduncularis (Trev.) Benth 附地菜 187
Trillium tschonoskii Maxim 延龄草 278
Triticum aestivum L. 小麦 253
Trichosanthes kirilowii Maxim. 瓜蒌 220

Trollius chinenses Maxim 金莲花 81
Tulipa edulis (Miq.) Baker 老鸦瓣 268
Tulipa gesneriana L. 郁金香 269
Tussliago. Farfara L. 款冬 237
Typha orientalis Presl 东方香蒲 247
Typhonium giganteum Engl. 独角莲 258

U

Ulmus parvifolia Jacq. 榔榆 40
Ulmus pumila L. 榆 39
Urtica angustifolia Fisch. 狭叶荨麻 45
Urtica cannabina L. 麻叶荨麻 46
Urtica laetevirens Maxim. 宽叶荨麻 45

V

Valeriana offeinalis L. 缬草 215
Vallisneria natans (Lour.) Hara 苦草 248
Veratrum mengtzeanum Loes. f. 黎芦 265
Veronica linariifolia Pall. ex Link. 细叶婆婆纳 204
Veronicastrum sibiricum (L.) Pennell 草本威灵仙 204
Vicia cracca L. 广布野豌豆 133
Vicia unijuga A. Brown 歪头菜 133
Viola acuminata Ledeb. 鸡腿堇菜 155
Viola yedoensis Makino 紫花地丁 155
Viscum coloratum (Kom.) Nakai 槲寄生 49
Vitex chinensis Mill. 荆条 188

W

Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC. 兰花参 227
Wikstroemia chamaedaphne Meisn. 河朔堇花 158
Woodsia intermedia Tagawa 中岩蕨 19

X

Xanthium mongolicum Kitag. 蒙古苍耳 232

Z

Zanthoxylum bungeanum Maxim. 花椒 138
Zea mays L. 玉米 252
Zizania caduciflora (Turcz.) Hand.-Mazz. 茭白 250
Ziziphus psinosa Hu 酸枣 148

鄧子勉 贈
PDG

参考文献

【1】上海科学出版社：《中药大辞典（上、下册）》，江苏新医学院编著。

【2】科学出版社：《中国植物志》各相关卷册，中国科学院植物研究所编著。

【3】科学出版社：《中国高等植物图鉴1~5册》，中国科学院植物研究所主编。

【4】人民卫生出版社：《全国中草药汇编（上、下册）》，全国中草药汇编编写组编著。

【5】科学出版社：《拉汉英种子植物名称》，1984，匡可仁编著。

部分图片作者名录

俄国庆/FOTOE: P177左上图, P236右下一图	图, P80左下图, P84右上一图, P87右下二图, P90右上图, P95右上二图, P97左上二图, P107左下图, P109左上图, P116左下图, P120左上图, P123右上二图, P128右下图, P139上二图、下二图, P143左下二图, P144右下二图, P148右下一图、左上一图, P149右下一图, P155左上二图, P160右下三图、右下二图, P168右上图, P176右下一图, P178左下二图, P183左下图, P184右上二图, P196右上二图, P203右下图, P206右上二图, P208左上图, P213左下一图, P215左下图, P217左上二图, P217右上图, P219右下三图, P220左上图, P234右下图, P236右下二图, P238右下二图, P240左上图, P242右上图, P244左上图, P246左下一图, P246左下二图, P246右下二图, P247右上一图, P249左上二图、右上一图, P252左上图、右下三图, P253右上二图、右下一图, P253左上一图, P255右下一图, P256右下二图, P258右上二图、左下图, P260右下二图, P261左上图, P262左上一图, P263左下图, P264右上二图, P265右下图、左上二图, P268右下一图, P272左上一图, P279右下二图、右下一图, P281右下图、左下一图, P287左上图, P288左上图, P289左上二图
桂鸿/FOTOE: P10图	杨兴斌/FOTOE: P35右下三图, P76左上图
蒋明/FOTOE: P141左下图, P258右下一图	张延林/FOTOE: P253右上一图
李军朝/FOTOE: P137右下二图	张永新/FOTOE: P252右上一图、右下四图, P270左下图
林月好/FOTOE: P247左下一图	
刘翔/FOTOE: P94右上图, P104中二图, P117左上图, P121右上二图, P123左上图, P125右上一图, P131左下图, P142左下图	
石晓燕/FOTOE: P269左下图	
覃江英/FOTOE: P130右下图	
王艺忠/FOTOE: P103左下图, P264左下图	
徐晔春/FOTOE: P14右下图, P35右下二图, P66右下一图, P73左上一图, P89右上图, P109右下二图, P125左下图, P126右上图, P146右上图, P154右上二图, P185左下图, P193中二图, P219右上图、左下图, P263左上图、右上图, P266中二图, P267右下图, P269右上图、右下三图、右下一图, P271左上图, P274右下二图、右上图, P278右上图, P279左下图, P280右下二图、右下三图, P284右下图, P285左上图、右上二图, P286左上图, P287右上二图, P288右下一图	
许旭芒/FOTOE: P12右下图, P13左上二图、左上三图、左上一图, P15左下图, P31左下二图, P42左下图, P44右下二图, P51左上二图、右下图, P52左上图, P78左上	